

Voltaren Aerosol

Diclofenaco Dietilamina 1.16%

3 Triple Acción

Para alivio del dolor muscular, cuello y espalda.
Alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el
proceso de recuperación.

Uso Tópico
Peso Neto
60 g (85 ml.)

gsk



Composición y Antinflamatorio

Composición: Cada 100 mL contienen: Diclofenaco dietilamina 0.954 g (1.16% p/p). Excipientes: Alcohol isopropílico, alcohol etílico, propilenglicol, perfume, butano. **Indicaciones:** Alivia dolor, inflamación e hinchazón en: •Lesiones musculares, tendones, ligamentos y articulaciones, debido a esguinces, distensiones, hematomas y dolor de espalda (lesiones deportivas). •Formas localizadas de reumatismo de tejidos blandos: Tendinitis, bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatías. •Artritis moderada de rodilla y dedos. **Vía de administración:** Tópica. Para uso exclusivo en la piel. **Dosis y Modo de Empleo:** No usar en menores de 12 años. Aplicar sobre el área afectada 3 o 4 veces al día. Rocíar de 3 a 6 segundos y frotar la piel. La cantidad por usar depende del tamaño del área afectada. Después de la aplicación, limpie sus manos con papel absorbente y luego lávelas, a menos que éstas sean el sitio por tratar. Tire el papel absorbente a la basura después de su uso. Espere hasta que Voltaren Aerosol se seque antes de ducharse, bañarse. No deseché ningún medicamento en el drenaje (por ejemplo, inodoro o lavamanos). Consulte a su médico o farmacéutico cómo desechará los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente. Si su condición no mejora en 7 días o si empeora, informe a su médico. No usar por más de 14 días en caso de lesiones musculares y articulares o tendinitis; o 21 días en caso de dolor artrítico sin consultar a su médico o farmacéutico. **Contraindicaciones:** No usar el producto si: •Es alérgico a diclofenaco u otros antiinflamatorios no esteroideos usados para tratar dolor, fiebre o inflamación, como ibuprofeno o aspirina, o cualquiera de los excipientes del producto. Si no está seguro consulte a su médico o farmacéutico. Los síntomas de una reacción alérgica a estos medicamentos pueden incluir: sibilancias o dificultad para respirar (asma); erupción en la piel; inflamación de cara o lengua y flujo nasal. •Está en los últimos 3 meses de embarazo. **Precauciones y Advertencias:** No usar en la piel con cortes, heridas abiertas, sarpullido o eczema. Suspenda su uso si se presentan erupciones en la piel luego de aplicarlo. No use más producto del indicado o por un periodo de tiempo más prolongado, a menos que su médico se lo indique. No usar en la boca. No ingerir. Evite aplicar en los ojos, si esto sucede, enjuáguese con agua y consulte con su médico o farmacéutico si la molestia persiste. Se puede usar con aparatos ortopédicos o vendajes usados para lesiones, pero no debe usarse con vendas herméticas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS. Contenido bajo presión:** No usar cerca del fuego. Evite exponer el producto a altas temperaturas y evite perforar el envase. **Interacciones:** Informe a su médico o farmacéutico antes de usar si está tomando o ha tomado recientemente cualquier medicamento con o sin receta médica. **Embarazo, Fertilidad y Lactancia:** •Si cree que puede estar o está embarazada o en periodo de lactancia o quiere tener un bebé, consulte con su médico antes de usar el producto. •No usar en los últimos 3 meses de embarazo pues podría dañar al feto o causar problemas en el parto. **Reacciones Adversas:** Al usarlo puede experimentar erupciones en la piel; urticaria; dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación de cara, labios, lengua o garganta; picazón o enrojecimiento de la piel. La piel puede ser más sensible a la luz solar (sol o cabina de bronceado) y puede presentar quemaduras con picazón, hinchazón y ampollas. **Sobredosis:** Si ingiere este medicamento consulte a su médico inmediatamente.

Conservar a temperatura no mayor a 30 °C. No contiene CFC.
Fabricado por: Envasamento Tecnologia de Aerosols LTDA. Av. Alberto Braggio Byington 2870, Osasco São Paulo – Brasil. Para: PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Titular del Registro Sanitario: Servicios Emetplex S.A., Quito – Ecuador. **Registro Sanitario:** 25.406-10-03. Venta libre. Marcas de propiedad o licenciadas por GSK ©2022 GSK o licenciantes.

Lote N°: / Manuf.: / Exp.:

 ECU: 022994751

 ECU: ec.consumo@gsk.com

 www.gsk.com
www.voltaren.com.ec



7

A10000.001.000213

