

Voltaren

Emulgel

Diclofenaco Dietilamina 1,16% Gel

3 Triple Acción

Alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera el proceso de recuperación.

Para alivio del dolor muscular, cuello y espalda



Lea detenidamente este inserto antes de utilizar el producto ya que contiene información importante para usted. Siempre use este producto exactamente como está descrito en este inserto o como el profesional de la salud le indique. Conserve esta información, podría necesitar leerla nuevamente. Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda o necesita más información.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contienen: Diclofenaco dietilamina 1,16 g equivalente a diclofenaco sódico 1 g. Los excipientes son: carbómero, éter cetosteárilico de macrogol, caprilocaprato de cocoilo, dietilamina, alcohol isopropílico, propilenglicol, parafina líquida, perfume (contiene benzilbenzoato), agua purificada.

Voltaren Emulgel es un gel de apariencia cremosa blanco a blaucuzco, refrescante, no grasoso y que no mancha.

PROPIEDADES / INDICACIONES

Su principio activo es diclofenaco, el cual pertenece a una clase terapéutica que se denomina «antiinflamatorios no esteroideos» (AINES). Está especialmente diseñado para frotarlo sobre la piel. Se utiliza para aliviar el dolor, reducir la inflamación y edema en un número de condiciones dolorosas que afectan las articulaciones y los músculos.

Puede ser usado para tratar:

- Lesiones de músculos y articulaciones, por ejemplo: golpes, contusiones, esguinces, dolor de espalda y lesiones deportivas.
- Tendinitis (por ejemplo, codo del tenista).
- Artritis moderada de rodilla y dedos.

DOSIS / MODO DE EMPLEO

Vía de administración: Tópica.

Adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores: Aplique frotando suavemente 3 o 4 veces al día en el área del dolor o área inflamada. La cantidad necesaria dependerá del tamaño de la zona con dolor o inflamada; una cantidad equivalente al tamaño de una cereza o al de una nuez será suficiente. Lave sus manos luego de la aplicación, a menos que éstas sean el sitio por tratar. Únicamente para uso externo. No lo use en niños menores de 12 años de edad.

Siempre use la menor dosis efectiva y durante el tiempo más corto. No usar el producto por más de 2 semanas en casos de lesiones en músculos y articulaciones (por ejemplo: golpes, contusiones y esguinces) o tendinitis y por más de 3 semanas en casos de dolor artrítico sin consultar a un médico o farmacéutico. Si el dolor o la inflamación no mejoran dentro de los 7 días o si éstas empeoran, consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES

No debe usar el producto si:

- Es alérgico al diclofenaco u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos usados para tratar dolor, fiebre o inflamación, tales como ibuprofeno o aspirina, o cualquiera de los ingredientes que contiene este medicamento. Si no está seguro, consulte a su médico o farmacéutico.
- Los síntomas de una reacción alérgica a estos medicamentos pueden incluir: sibilancias o dificultad para respirar (asma); erupciones en la piel con ampollas o urticaria, inflamación de la cara o lengua y flujo nasal.
- Está dentro de los últimos 3 meses de embarazo.
- Cirugía de derivación arterial coronaria (bypass coronario)

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No aplique en la piel con cortadas, heridas abiertas o que presenta erupciones o eczema. Suspenda el tratamiento si se desarrollan erupciones en la piel luego de la aplicación del producto. No use más producto del indicado o por un periodo de tiempo más prolongado, a menos que su médico se lo recomiende.

No lo use en la boca, no ingerir y lavar las manos después de aplicarlo, a menos que estas sean el sitio por tratar. Evite la aplicación en los ojos, si esto ocurre, debe lavarlos con abundante agua limpia y consultar con su médico o farmacéutico si persiste alguna molestia. Se puede usar con aparatos ortopédicos o vendajes empleados comúnmente para lesiones como esguinces, pero no lo use debajo de vendas herméticas (plásticas).

La formulación contiene propilenglicol y benzilbenzoato los cuales pueden causar irritaciones localizadas moderadas en la piel de algunas personas.

62000000207534



EMBARAZO, FERTILIDAD Y LACTANCIA

- Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que puede estar embarazada o está planeando tener un bebé, úselo únicamente bajo previo consejo de su médico.
- No usar durante los últimos 3 meses de embarazo, ya que podría afectar al feto o causar problemas durante el parto.

REACCIONES ADVERSAS

Al usar este producto puede experimentar:

Erupciones en la piel con o sin ampollas; urticaria; sibilancias, dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación de la cara, labios, lengua o garganta; enrojecimiento o picazón de la piel. La piel puede ser más sensible a la luz solar (sol o cabina de bronceado). Los posibles signos son quemaduras solares con picazón, hinchazón y ampollas.

INTERACCIONES

Informe a su médico o farmacéutico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento habitual en productos de venta con o sin prescripción médica.

Si ingiere este medicamento consulte a su médico inmediatamente.

COMENTARIOS ESPECIALES

- Condición de venta: Venta Libre
- Conservar a una temperatura no mayor a 30°C.
- No utilice el producto después de la fecha de expiración que se indica en el tubo y la caja.

MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS

Presentaciones autorizadas para Ecuador: 30 g, 60 g y 100 g. Fabricado por: Haleon CH SARL, Route de L'Etraz 2, 1260 Nyon, Suiza.

Fecha de la última revisión: **Versión 06 (Agosto 2021)**
GDS 3.0 Diclofenaco tópico

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2023 grupo de compañías Haleon o licenciante.

62000000207534