

PROYECTO DE MARBETE  
CAJA DE CARTÓN CON 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA

LOGOS

ADVIL 12 HORAS  
Ibuprofeno  
TABLETA  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Caja con 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 tabletas en envase de burbuja.

#### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** ADVIL 12 Horas alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma ADVIL 12 Horas si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ámpulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ámpulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30 °C.

Conserve la caja bien cerrada.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer-141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

PROYECTO DE MARBETE  
CAJA DE CARTÓN CON 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA

LOGOS

ADVIL 12 Horas  
Ibuprofeno  
TABLETA  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Caja con 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 tabletas en envase de burbuja

#### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** ADVIL 12 Horas alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma ADVIL 12 Horas si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ámpulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ámpulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30 °C.

Conserve la caja bien cerrada.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Acondicionado (Secundario) en Canadá por:**

Jones Contract Packaging Services.

55 Walker Drive, Brampton ON L6T 5K5, Canadá.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

PROYECTO DE MARBETE  
CAJA DE CARTÓN CON 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA

LOGOS

ADVIL 12 Horas  
Ibuprofeno  
TABLETA  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Caja con 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 tabletas en envase de burbuja

**FÓRMULA:**

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** ADVIL 12 Horas alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma ADVIL 12 Horas si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ampulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ampulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.



**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30 °C.

Conserve la caja bien cerrada.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Acondicionado (Secundario) por:**

Pfizer, S.A. de C.V.

Km. 63 Carretera México Toluca, Zona Industrial,

C.P. 50140, Toluca, México, México.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

Logo

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

## PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA (PVDC/PE/PVC/Al)

LOGOS

**Advil 12 Horas**

**IBUPROFENO**

Tableta

**600 mg**

Liberación prolongada

ORAL

Reg. No. 215M2018 SSA V

Lote:

Caducidad:

Hecho en Puerto Rico

*LOGOTIPO (CONTRAINDICACIÓN EN EMBARAZO)*

## PROYECTO DE MARBETE CARTERA DE CARTÓN

LOGOS

**ADVIL 12 Horas**  
Ibuprofeno  
TABLETA  
600 mg  
Liberación prolongada  
Logos

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Cartera con 1 o 2 tabletas en envase de burbuja.

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** **ADVIL 12 Horas** alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ámpulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ámpulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30 °C.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa-al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

## PROYECTO DE MARBETE CARTERA DE CARTÓN

LOGOS

**ADVIL 12 Horas**  
Ibuprofeno  
TABLETA  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Cartera con 1 ó 2 tabletas en envase de burbuja.

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** **ADVIL 12 Horas** alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ámpulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ámpulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido

a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30 °C.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3),Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Acondicionado (Secundario) en Canadá por:**

Jones Contract Packaging Services.

55 Walker Drive, Brampton ON L6T 5K5, Canadá.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)



## PROYECTO DE MARBETE CARTERA DE CARTÓN

LOGOS

**ADVIL 12 Horas**  
Ibuprofeno  
TABLETA  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Cartera con 1 o 2 tabletas en envase de burbuja.

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** **ADVIL 12 Horas** alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

### USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

No consuma **ADVIL 12 Horas** si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ámpulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ámpulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30 °C.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3),Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Acondicionado (Secundario) por:**

Pfizer, S.A. de C.V.

Km. 63 Carretera México Toluca, Zona Industrial,

C.P. 50140, Toluca, México, México.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

PROYECTO DE MARBETE  
CAJA DE CARTÓN PARA FRASCO

LOGOS

ADVIL 12 Horas  
Ibuprofeno  
Tableta  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Caja con frasco con 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 tabletas.

**FÓRMULA:**

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** ADVIL 12 Horas alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.  
**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ampulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ampulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre)

o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Mantenga el frasco bien cerrado. Consérvese a no más de 30 °C.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3),Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

## PROYECTO DE MARBETE CAJA DE CARTÓN PARA FRASCO

LOGOS

ADVIL 12 Horas  
Ibuprofeno  
Tableta  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Caja con frasco con 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 tabletas.

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno ..... 600 mg  
Excipiente cbp ..... 1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** ADVIL 12 Horas alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma ADVIL 12 Horas si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ampulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ampulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.



**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Mantenga el frasco bien cerrado. Consérvese a no más de 30 °C.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3),Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Acondicionado (Secundario) en Canadá por:**

Jones Contract Packaging Services.

55 Walker Drive, Brampton ON L6T 5K5, Canadá.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

## PROYECTO DE MARBETE CAJA DE CARTÓN PARA FRASCO

LOGOS

**ADVIL 12 Horas**  
Ibuprofeno  
Tableta  
600 mg  
Liberación prolongada

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Caja con frasco con 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 tabletas.

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** **ADVIL 12 Horas** alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.

**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

### USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:

No consuma **ADVIL 12 Horas** si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ámpulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ámpulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Mantenga el frasco bien cerrado. Consérvese a no más de 30 °C.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Acondicionado (Secundario) por:**

Pfizer, S.A. de C.V.

Km. 63 Carretera México Toluca, Zona Industrial,

C.P. 50140, Toluca, México, México.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.co](mailto:mystory.mx@haleon.co)

## PROYECTO DE MARBETE FRASCO (PEAD o HDPE)

LOGOS

ADVIL 12 Horas  
Ibuprofeno  
Tableta  
600 mg  
Liberación prolongada  
Logos

- Alivia dolor de articulaciones
- Dolores musculares y de espalda
- Dolor asociado con artritis o exceso de ejercicio físico

Frasco con 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 o 14 tabletas.

### FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Ibuprofeno .....600 mg  
Excipiente cbp .....1 tableta.

**INDICACIÓN TERAPÉUTICA:** ADVIL 12 Horas alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis (dolor de articulación) o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza por tensión y dolor por migraña leve a moderada, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago (dolor de espalda baja), dolores y molestias debidos al resfriado común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y cólico menstrual. Además, reduce la fiebre.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral. Léase el instructivo anexo/impreso.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** Mayores de 18 años: Tome 1 tableta cada 12 horas. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez. No triture, mastique ni disuelva la tableta.  
**NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.**

**USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA:** No consuma ADVIL 12 Horas si se encuentra embarazada, particularmente durante el último trimestre del embarazo ni durante la lactancia.

**CONTRAINDICACIONES:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si tiene antecedentes recurrentes de úlceras gastrointestinales o sangrado gastrointestinal, alergia o hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquier componente de la fórmula. No consuma durante el embarazo o la lactancia, particularmente durante los últimos 3 meses de embarazo. No administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

- Interrumpa el tratamiento si la fiebre persiste por más de 3 días o si el dolor persiste por más de 10 días.
- Antes de administrar, consulte a su médico si presenta irritación del tracto gastrointestinal, incluido antecedentes de úlceras pépticas.
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si presenta reacción alérgica severa, incluyendo erupciones cutáneas (ronchas), enrojecimiento o ampulas (granos con agua).
- Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas.
- Consulte a su médico antes de administrar si usted sufre de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática (daño en el hígado), hipertensión o enfermedad renal (daño en riñón).
- No lo consuma con otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor).
- Administre con cuidado en adultos mayores.
- El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).
- Los efectos adversos pueden minimizarse con la administración de la dosis mínima durante el menor tiempo posible.

**USO PEDIÁTRICO:** No se administre en niños o adolescentes menores de 18 años.

**REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:** Los siguientes síntomas se pueden relacionar con la administración de ibuprofeno. Si presenta de manera inexplicable cualquiera de estos síntomas o cualquier otro síntoma durante el consumo de **ADVIL 12 Horas**, suspenda el tratamiento inmediatamente y consulte a su médico: Dolor abdominal, acidez gástrica, náuseas o vómitos, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio o presión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón, erupciones cutáneas, enrojecimiento cutáneo, ampulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o sanguinolentas o ictericia (coloración amarilla de la piel).

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y ALIMENTARIAS:** No consuma **ADVIL 12 Horas** si toma otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor), anticoagulantes (medicamentos para la sangre) o cualquier otro medicamento; consulte a su médico antes de consumirlo. Si consume ácido acetilsalicílico debido a un ataque cardíaco o enfermedad cerebrovascular, debe consultar a su médico antes de consumir este producto, debido a que ibuprofeno puede reducir dicha efectividad.

**INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS:** Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Mantenga el frasco bien cerrado. Consérvese a no más de 30 °C.

No exceda la dosis recomendada.

Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico.

No se use durante el embarazo y la lactancia.

*LOGO DE CONTRAINDICACIÓN DEL EMBARAZO.*

**Fabricado en Puerto Rico por:**

**PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.**

State Road No. 3, (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

**Acondicionado en Canadá por:**

PF Consumer Healthcare Canada ULC.

1025 Boulevard Marcel Laurin,

St-Laurent, QC Canadá, H4R 1J6.

**Distribuido en México por:**

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo*

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

## PROYECTO DE MARBETE PARA INSTRUCTIVO ANEXO/IMPRESO

LOGOS

**ADVIL 12 Horas**  
Ibuprofeno  
Tableta  
600 mg  
Liberación prolongada

### ACERCA DE ESTE MEDICAMENTO

#### Para qué se usa el medicamento:

ADVIL 12 Horas alivia el dolor a causa de la inflamación asociada con artritis o exceso de ejercicio físico, dolores de cabeza que incluyen dolor de cabeza tensional y dolor por migraña de leve a moderado, dolores y molestias leves asociados con los músculos, articulaciones, lumbago, dolores y molestias debidos al resfrío común; alivia dolores de muelas, por extracciones dentales y dolor menstrual. Además, reduce la fiebre.

ADVIL 12 Horas (ibuprofeno) es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que puede reducir las sustancias químicas producidas por el cuerpo que causan dolor e inflamación.

ADVIL 12 Horas solamente puede aliviar el dolor y reducir la hinchazón, siempre y cuando continúe tomándolo.

#### Cuándo no debe administrarse

No consuma ADVIL 12 Horas si presenta alguna de las siguientes situaciones:

- tiene úlcera estomacal activa o recurrente, sangrado gastrointestinal (GI) o enfermedad intestinal inflamatoria activa (enfermedad de Crohn, colitis),
- está tomando ácido acetilsalicílico o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo (medicamento para el dolor) incluido cualquier otro producto con ibuprofeno,
- tiene alergia/hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, otros salicilatos, otros antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o a cualquiera de los ingredientes de ADVIL 12 Horas
- tiene pólipos nasales (hinchazón de la parte interna de la nariz), o manifestaciones alérgicas como asma, anafilaxia (reacción alérgica potencialmente mortal, severa y repentina), urticaria/ronchas, rinitis (congestión o secreción nasal que puede atribuirse a alergias), erupción cutánea u otros síntomas alérgicos,
- está deshidratado (pérdida significativa de líquido) debido a vómito, diarrea o falta de ingesta de líquidos,
- le diagnosticaron hipertensión arterial severa o padece enfermedad arterial coronaria severa,
- sufre de una nefropatía (enfermedad del riñón) o hepatopatía seria (enfermedad del hígado),
- Lupus Eritematoso Sistémico
- o si está embarazada o amamantando.

ADVIL 12 Horas NO debe suministrarse a pacientes menores de 18 años de edad ya que NO se ha determinado su efectividad y seguridad.



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

### Advertencias y Precauciones Serias

Precaución en pacientes propensos a la irritación del tracto gastrointestinal, incluidos aquellos con antecedentes de úlcera péptica. ANTES de ingerir ADVIL 12 Horas consulte a su médico si padece lo siguiente:

- úlceras estomacales actuales o previas, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía (enfermedad del corazón) o enfermedad tiroidea (enfermedad en Tiroides), asma, nefropatía (enfermedad del riñón) o hepatopatía (enfermedad del hígado), glaucoma (presión alta en el ojo que puede causar disminución de la vista), trastorno de coagulación sanguínea (enfermedad de la sangre) (como la hemofilia), cualquier otra enfermedad seria, o si está recibiendo atención médica por cualquier afección seria, está embarazada o amamantando, o está tomando cualquier otro medicamento, incluidos los medicamentos de venta libre.

Administrar con cuidado en adultos mayores.

El uso continuo y a largo plazo puede aumentar el riesgo de sufrir ataque cardíaco o apoplejía (daño en el cerebro que puede causar parálisis).

## INTERACCIONES CON ESTE MEDICAMENTO

Consulte a su médico si está tomando otro medicamento (ya sea recetado o no) como cualquiera de los siguientes (NO es una lista completa):

Ácido acetilsalicílico, acetaminofén, anticoagulantes (diluyentes sanguíneos), digoxina, insulina y antidiabéticos orales, diuréticos, metotrexato, litio, medicamentos que se unen a proteínas incluidos probenecid, tiroxina, antibióticos (como ciclosporina), fenitoína, corticosteroides o benzodiazepinas, otros medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (medicamentos para el dolor) o medicamentos para la hipertensión arterial. El ibuprofeno puede interferir con los beneficios preventivos del ácido acetilsalicílico.

## ADMINISTRACIÓN CORRECTA DE ESTE MEDICAMENTO

### Dosis habitual:

Adultos  $\geq 18$  años: Tome 1 tableta cada 12 horas según necesidad. No ingiera más de 2 tabletas en 24 horas, a menos que así lo indique el médico. No consuma el medicamento durante más de 3 días para reducir la fiebre o más de 5 días para aliviar el dolor. No consuma más de la dosis indicada ni más de 1 tableta a la vez.

No triture, mastique ni disuelva la tableta.

### Sobredosis:

Interrumpa el tratamiento y consulte a su médico.

### Dosis perdida:

Tome la dosis olvidada tan pronto se acuerde. Si es casi la hora de la siguiente dosis, espere hasta entonces para tomar su medicamento y omita la dosis olvidada. **No tome dos dosis al mismo tiempo.**

## EFFECTOS SECUNDARIOS Y QUÉ HACER CON ELLOS

Si presenta dolor abdominal, acidez gástrica, náusea o vómito, distensión abdominal (inflamación del estómago o intestino), diarrea o estreñimiento, ruido o zumbido en los oídos, nerviosismo, insomnio, mareos o cualquier cambio en la visión, picazón, retención de líquidos (hinchazón del cuerpo), disnea (dificultad para respirar), sibilancia, cualquier problema respiratorio u opresión en el pecho, urticaria (ronchas), inflamación o picazón,

erupciones cutáneas, enrojecimiento de la piel, ampulas (granos con agua), sangre en vómito, heces negras o con sangre, ictericia (ojos o piel de color amarillento a causa de problemas hepáticos), o cualquier otro efecto secundario o síntomas inexplicables mientras está tomando ADVIL 12 Horas, suspenda su administración inmediatamente y póngase en contacto con un médico.

Los efectos secundarios pueden minimizarse administrando la dosis mínima durante el menor periodo de tiempo.

*Esta no es una lista completa de efectos secundarios. Si presenta algún efecto inesperado al tomar ADVIL 12 Horas, póngase en contacto con su médico.*

### **CÓMO ALMACENARLO:**

Consérvese a no más de 30 °C.

Mantenga fuera del alcance de los niños. Este empaque contiene suficiente medicamento como para dañar seriamente a un niño.

### **MÁS INFORMACIÓN**

**Si tiene alguna duda, consulte a su médico.**

No exceda la dosis recomendada. Si el malestar persiste o si se presenta algún efecto adverso, consulte a su médico. No se use durante el embarazo y la lactancia.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: [farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en [mystory.mx@haleon.com](mailto:mystory.mx@haleon.com)

Reg. No. 215M2018 SSA V

*Logo de contraindicación en el embarazo.*