

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA VENTA AL PÚBLICO

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

Caja con 2 ó 12 tabletas.

ALIVIA EL DOLOR:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo:](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico **(PR)** 00784,
Guayama, Porto Rico, E.U.A.

Acondicionado en México por: **Pfizer, S.A. de C.V.**

Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,
Toluca, México, México.

PM 02
AABRIL 2024ADVIL TABLETA
CDS: Ibuprofen CDSV-13_28-Feb-2012

HALEON

**Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.**

Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720

Torre 3 Piso 11

Col. Jardines del Pedregal

Alcaldía Alvaro Obregón

C.P. 01900, Ciudad de México

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA PARA VENTA AL PÚBLICO

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

Cartera con 2 tabletas

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

Acondicionado en México por: **Pfizer, S.A. de C.V.**

Km. 63 Carretera México-Toluca,

Zona Industrial, C.P. 50140,

Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

PM 02
AABRIL 2024ADVIL TABLETA
CDS: Ibuprofen CDSV-13_28-Feb-2012

HALEON

**Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.**

Bld. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA

LOGOS

ADVIL

IBUPROFENO

TABLETA

200 mg

ORAL

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote:

Caducidad:

Hecho en Puerto Rico

Logotipo (opcional)

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA DE CARTÓN CON 24, 30, 50 ó 100 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA DE 2 TABLETAS CADA UNO CON TARJETA INCLUIDA

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

DOSIS INDIVIDUAL

Caja con 24, 30, 50 ó 100 tabletas en envase de burbuja de 2 tabletas cada uno y tarjeta incluida.

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL acción alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio máximo al público:

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

Acondicionado por: **Pfizer, S.A. de C.V.**

PM 02
AABRIL 2024ADVIL TABLETA
CDS: Ibuprofen CDSV-13_28-Feb-2012

HALEON

**Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,
Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA DE CARTÓN CON 24, 30, 50 ó 100 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA DE 2 TABLETAS CADA UNO

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

DOSIS INDIVIDUAL

Caja con 24, 30, 50 ó 100 tabletas en envase de burbuja de 2 tabletas cada uno.

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL acción alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier

antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio máximo al público:

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

Acondicionado por: **Pfizer, S.A. de C.V.**
Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,
Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA DESPACHADOR CON 24, 30, 50 ó 100 TABLETAS EN ENVASE DE BURBUJA DE 2 TABLETAS CADA UNO EN CAJA O CARTERA INDIVIDUAL

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

DOSIS INDIVIDUAL

Despachador con 24, 30, 50 ó 100 tabletas en envase de burbuja de 2 tabletas cada uno en caja o cartera individual.

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL alivia el dolor:

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio máximo al público:

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

Acondicionado por:

Pfizer, S.A. de C.V.

Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,
Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA CON 2 TABLETAS CADA UNO

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

DOSIS INDIVIDUAL

Envase de burbuja de 2 tabletas cada uno.

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio máximo al público:

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

PM 02
AABRIL 2024ADVIL TABLETA
CDS: Ibuprofen CDSV-13_28-Feb-2012

HALEON

**Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Acondicionado por: **Pfizer, S.A. de C.V.**
Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,
Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

**PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA DE 2 TABLETAS CADA
UNO CON TARJETA INCLUIDA**

ADVIL

IBUPROFENO

TABLETA

200 mg

ORAL

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote

Caducidad

Precio máximo al público

Hecho en Puerto Rico

Consulte instrucciones en el interior

PROYECTO DE MARBETE PARA TARJETA INCLUIDA EN ENVASE DE BURBUJA DE 2 TABLETAS

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

DOSIS INDIVIDUAL

Contiene 2 tabletas

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio máximo al público:

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

Acondicionado por: **Pfizer, S.A. de C.V.**
Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,
Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA DE CARTÓN

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

Caja con frasco con 24 ó 100 tabletas.

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio máximo al público:

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, Guayama, Porto Rico, E.U.A.

Acondicionado por: **Pfizer, S.A. de C.V.**
Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,
Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA FRASCO

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO 200 mg TABLETA

Frasco con 24 ó 100 tabletas.

ALIVIA EL DOLOR

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

| | |
|----------------|-----------|
| Ibuprofeno | 200 mg |
| Excipiente cbp | 1 tableta |

INDICACION TERAPÉUTICA:

ADVIL alivia el dolor:

- | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| *De cabeza | * De articulaciones | * Dolores leves de osteoartritis |
| *Muscular | * Originado por cólico menstrual | * De oídos |
| *Dental | * Asociado con el resfriado común | * Reduce la fiebre |
| *De espalda | | |

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos tabletas cada 4 o 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 tabletas al día.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: ADVIL no debe utilizarse en mujeres embarazadas ni en lactancia, salvo indicación médica. No use durante los últimos 3 meses de embarazo.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

CONTRAINDICACIONES: No usar ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier

antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los 3 últimos meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: A menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, si observa sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón, en caso de estar tomando otros antiinflamatorios no esteroideos. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Pueden ocurrir más comúnmente reacciones alérgicas, náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar estomacal. Otras reacciones adversas pueden ocurrir. Consulte a su médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico. No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C y en lugar seco.

Logo de contraindicación del embarazo

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reg. No. 197M87 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio máximo al público:

Hecho en Puerto Rico por:

PF Consumer Healthcare B.V. (Puerto Rico Operations) LLC.

State Road No. 3 (Kilometer 141.3), Guayama, Puerto Rico (PR) 00784, **Guayama, Porto Rico, E.U.A.**

Acondicionado por:

Pfizer, S.A. de C.V.

Km. 63 Carretera México-Toluca,
Zona Industrial, C.P. 50140,

PM 02
AABRIL 2024ADVIL TABLETA
CDS: Ibuprofen CDSV-13_28-Feb-2012

HALEON

**Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Toluca, México, México.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.