

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

Caja con 10 ó 20 cápsulas.

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: Cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días; si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Léase inserto impreso / anexo en el interior.
Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI
Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico,
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

Caja con 10 ó 20 cápsulas.

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: Cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días; si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampullas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a no más de 25° C.
Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote: Caducidad: Precio Máximo al Público:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B -201, Atlántico,
Barranquilla, Colombia.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA DESPACHADOR CON 24 ó 48 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA CON 2 CÁPSULAS CADA UNO CON TARJETA / INSERTO INCLUIDO

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Caja con 24 ó 48 cápsulas en envase de burbuja con 2 cápsulas cada uno con tarjeta/inserto incluido.

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: Cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días; si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: No se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA DESPACHADOR CON 48 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA CON 4 CÁPSULAS CADA UNO CON TARJETA / INSERTO INCLUIDO

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Caja con 48 cápsulas en envase de burbuja con 4 cápsulas cada uno con tarjeta/inserto incluido.

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: Cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: No se use Advil si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso de Advil puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA CON 2 ó 4 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA CON TARJETA / INSERTO INCLUIDO

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Contiene 2 ó 4 cápsulas.

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: Cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días; si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: No se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Léase inserto impreso / anexo en el interior.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico

Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA CON 2 ó 4 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Contiene 2 ó 4 cápsulas.

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: Cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días; si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: No se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a no más de 25° C.
Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote. Caducidad: Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com
Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA TARJETA / INSERTO INCLUIDO EN ENVASE DE BURBUJA CON 2 ó 4 CÁPSULAS

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Contiene 2 ó 4 cápsulas.

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: Cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: No se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: Consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: Descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días; si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampullas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: No se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: El uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: Suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a no más de 25° C.
Logo de contraindicación del embarazo
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com
Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA INSERTO ANEXO/IMPRESO EN PRESENTACIONES

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos capsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardiaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardiaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo**: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA (AI/PVC/PVDC)

ADVIL

IBUPROFENO

CÁPSULA

200 mg

ORAL

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote:

Caducidad:

LOGOS

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL



**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

**PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA (AI/PVC/PVDC) CON 2 ó 4 CÁPSULAS CON
TARJETA / INSERTO INCLUIDO**

ADVIL

IBUPROFENO

CÁPSULA

200 mg

ORAL

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

LOGOS

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**ADVIL
IBUPROFENO
CÁPSULA
200 mg**

Caja con frasco con 20 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a no más de 25° C.
Léase inserto impreso / anexo en el interior.
Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

Caja con frasco con 20 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampullas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

No se deje al alcance de los niños.
Consérvese a no más de 25° C.
Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote. Caducidad: Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico,
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA FRASCO (PEAD o HDPE)

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 200 mg

Frasco con 20 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor:

- De cabeza
- Muscular
- De espalda
- Cólico menstrual

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	200 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: de una a dos cápsulas cada 4 ó 6 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 6 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.
Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.