

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

Caja con 3 ó 10 ó 20 ó 40 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Léase inserto impreso / anexo en el interior.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA**ADVIL
IBUPROFENO
CÁPSULA
400 mg**

Caja con 3 ó 10 ó 20 ó 40 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años.

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico,
Barranquilla, Colombia.

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA DESPACHADOR CON 12 ó 24 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA CON 1 CÁPSULA CADA UNO CON TARJETA / INSERTO INCLUIDO

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Caja con 12 ó 24 cápsulas en envase de burbuja con 1 cápsula cada uno con tarjeta/inserto incluido.

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Consérvese a no más de 25° C.
Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote. Caducidad:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, A.A, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA DESPACHADOR CON 36 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA CON 3 CÁPSULAS CADA UNO CON TARJETA / INSERTO INCLUIDO

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Caja con 36 cápsulas en envase de burbuja con 3 cápsulas cada uno con tarjeta/inserto incluido.

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA DESPACHADOR CON 36 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA CON 3 CÁPSULAS CADA UNO DENTRO DE SU CAJA INDIVIDUAL

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Caja con 36 cápsulas en envase de burbuja con 3 cápsulas cada uno dentro de su caja individual.

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Logo de contraindicación del embarazo.
LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA CON 1 ó 3 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA CON TARJETA / INSERTO INCLUIDO

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Contiene 1 ó 3 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Léase inserto impreso / anexo en el interior.

Logo de contraindicación del embarazo.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CARTERA CON 1 ó 3 CÁPSULAS EN ENVASE DE BURBUJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Contiene 1 ó 3 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno, o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx): farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA TARJETA / INSERTO INCLUIDO EN ENVASE DE BURBUJA CON 1 ó 3 CÁPSULAS

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

DOSIS INDIVIDUAL

Contiene 1 ó 3 cápsulas.

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com
Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA INSERTO ANEXO/IMPRESO EN PRESENTACIONES

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 25° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA INSERTO ANEXO/IMPRESO EN PRESENTACIONES

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa **al correo:** farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL



**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA (AI/PVC/PVDC)

ADVIL

IBUPROFENO

CÁPSULA

400 mg

ORAL

Reg. No. 272M2004 SSA VI

LOGOS

Lote:

Caducidad:

**PROYECTO DE MARBETE PARA ENVASE DE BURBUJA (AI/PVC/PVDC) CON 1 ó 3 CÁPSULAS CON
TARJETA / INSERTO INCLUIDO**

ADVIL

IBUPROFENO

CÁPSULA

400 mg

ORAL

Reg. No. 272M2004 SSA VI

LOGOS

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

Caja con frasco con 20 ó 40 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:
Ibuprofeno 400 mg
Excipiente cbp 1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C.

Léase inserto impreso / anexo en el interior.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx): farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

Caja con frasco con 20 ó 40 cápsulas

Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

USO PEDIÁTRICO: no se administre a menores de 12 años

USO EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA: consulte a su médico antes de usar ADVIL en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. No se use durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por ataque cardíaco o apoplejía ya que el ibuprofeno puede disminuir el beneficio del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: el uso de ADVIL puede generar ocasionalmente náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ardor y malestar epigástrico.

INGESTA ACCIDENTAL Y SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30° C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx): farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**

Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA FRASCO (PEAD o HDPE)

ADVIL IBUPROFENO CÁPSULA 400 mg

Frasco con 20 ó 40 cápsulas
Auxiliar en el alivio del dolor

FÓRMULA: cada cápsula contiene:

Ibuprofeno	400 mg
Excipiente cbp	1 cápsula

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Auxiliar en el alivio de dolores de cabeza, de migraña, osteoartritis leve, de espalda, asociado al resfriado común, de articulaciones, muscular, dental, de oídos, el originado por cólico menstrual y reduce la fiebre.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: oral.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: adultos y niños mayores de 12 años: tome una cápsula cada 6 a 8 horas, dependiendo de la severidad de los síntomas, sin exceder de 3 cápsulas al día. No tome este producto por más de 10 días si se trata de aliviar algún dolor o por más de 3 días si se busca reducir la fiebre.

NO EXCEDA LA DOSIS RECOMENDADA.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: descontinúe su uso y consulte a su médico si el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si presenta reacciones alérgicas severas incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas, sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar si padece de asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión, enfermedad del riñón o en caso de estar tomando otro antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque cardíaco o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis mínima por el menor periodo de tiempo. Use con cuidado en pacientes de edad avanzada.

CONTRAINDICACIONES: no se use ADVIL si tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquiera de los componentes de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, en caso de presencia o antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal y durante los últimos 3 meses de embarazo.

Si persisten las molestias, o se presenta cualquier efecto indeseable, consulte a su médico.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese a no más de 30°C.

Logo de contraindicación del embarazo.

LOGOS

Reg. No. 272M2004 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

PM 02
ABRIL 2024
ADVIL

**Haleon Consumer Healthcare Mexico,
S. de R.L. de C.V.**
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Hecho en Colombia por: **Procaps S.A.**
Calle 80 No. 78 B –201, Atlántico
Barranquilla, Colombia

Distribuido por: **Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.**
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.