

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO SUSPENSIÓN 100 mg/ 5 mL INFANTIL

Caja con frasco con 100 mL y vaso dosificador.

Reduce la fiebre y alivia el dolor

Asociados con:

- Resfriado común
- Gripe
- Dolor de garganta
- Post vacunación

INDICACIONES: ADVIL suspensión Infantil, para niños, alivia la fiebre y el dolor asociados al resfriado común, gripe, post vacunación; el dolor de cabeza, dientes y dolor de garganta.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ibuprofeno	2 g
Vehículo cbp	100 mL

DOSIS: utilice la dosis indicada en la tabla siguiente. Si es posible, utilice la dosis por peso, o en caso contrario, utilice como referencia la edad. No exceda la dosis recomendada.

Repita la dosis cada 6-8 horas si es necesario. No lo use más de 4 veces por día. Mida la dosis con el vaso dosificador.

Agítese antes de usar.

TABLA DOSIFICADORA		
PESO (Kg)	Edad (años)	Dosis (vaso dosificador)
11 –15	2-3	1 cucharadita (5 ml)
16 – 21	4-5	1 ½ cucharadita (7.5 ml)
22 – 26	6-8	2 cucharaditas (10 ml)
27 – 32	9-10	2 ½ cucharaditas (12.5 ml)
33 - 43	11-12	3 cucharaditas (15 ml)

La acción de una toma (dosis) puede durar de 6-8 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

CONTRAINDICACIONES: no utilizar si el paciente tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquier componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo o en caso de presentar o tener antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: a menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si se presenta una reacción alérgica severa incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas o si presenta sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar en caso de tener asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón o en caso de estar tomando cualquier otro analgésico antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque al corazón o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Consulte a su médico antes de usar si su niño no ha estado tomando líquidos o perdió fluidos debido a vómito o diarrea continuos. Contiene el 50 por ciento de azúcar y 7 por ciento de otros azúcares.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: las manifestaciones más comunes son ardor y dolor epigástrico, náusea, vómito, flatulencia, cólico, diarrea y constipación. En general, estas reacciones son leves y ocurren en muy baja proporción.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por infarto o apoplejía debido a que el ibuprofeno pudiera disminuir los beneficios del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico inmediatamente.

Si persisten las molestias o empeoran, consulte a su médico. Consérvese el frasco bien cerrado, a no más de 30°C y en lugar seco.

No se deje al alcance de los niños.

Logo de contraindicación del embarazo

Pensando en su tranquilidad y en la de su familia,
ADVIL Infantil con tapa de seguridad a prueba de niños.
Para abrir presione hacia abajo y gire hacia la
izquierda.



Reg. No. 265M98 SSA VI

Lote:

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o
en mystory.mx@haleon.com

Hecho en Canadá por:

PF Consumer Healthcare Canada ULC
1025 Marcel-Laurin Boulevard
Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido por: **Haleon** Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

Costa Rica Reg. No.

El Salvador Reg. No.

Honduras Reg. No.

Guatemala Reg. No.

Panamá Reg. No.

Nicaragua Reg. No.

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA DE FRASCO (PP)

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO SUSPENSIÓN 100 mg/ 5 mL INFANTIL

Frasco con 100 mL y vaso dosificador.

Reduce la fiebre y alivia el dolor

Asociados con:

- Resfriado común
- Gripe
- Dolor de garganta
- Post vacunación

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ibuprofeno	2 g
Vehículo cbp	100 mL

INDICACIONES: ADVIL suspensión Infantil, para niños, alivia la fiebre y el dolor asociados al resfriado común, gripe, post vacunación; el dolor de cabeza, dientes y dolor de garganta.

DOSIS: utilice la dosis indicada en la tabla siguiente. Si es posible, utilice la dosis por peso, o en caso contrario, utilice como referencia la edad. No exceda la dosis recomendada.

Repita la dosis cada 6-8 horas si es necesario. No lo use más de 4 veces por día. Mida la dosis con el vaso dosificador.

Agítese antes de usar.

TABLA DOSIFICADORA		
PESO (Kg)	Edad (años)	Dosis (vaso dosificador)
11 –15	2-3	1 cucharadita (5 ml)
16 – 21	4-5	1 ½ cucharadita (7.5 ml)
22 – 26	6-8	2 cucharaditas (10 ml)
27 – 32	9-10	2 ½ cucharaditas (12.5 ml)
33 - 43	11-12	3 cucharaditas (15 ml)

La acción de una toma (dosis) puede durar de 6-8 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: oral

CONTRAINDICACIONES: no utilizar si el paciente tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquier componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo o en caso de presentar o tener antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: a menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si se presenta una reacción alérgica severa incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas o si presenta sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar en caso de tener asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón o en caso de estar tomando cualquier otro analgésico antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque al corazón o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Consulte a su médico antes de usar si su niño no ha estado tomando líquidos o perdió fluidos debido a vómito o diarrea continuos. Contiene el 50 por ciento de azúcar y 7 por ciento de otros azúcares.

Si persisten las molestias o empeoran, consulte a su médico. Consérvese el frasco bien cerrado, a no más de 30°C y en lugar seco.

No se deje al alcance de los niños.

Logo de contraindicación del embarazo

Reg. No. 265M98 SSA VI

Lote: Caducidad:

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

PM 03
JULIO 2024
ADVIL SUSPENSIÓN
CDS: Ibuprofen CDS Versión 13.0 del 18-Jan-2019

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Hecho en Canadá por:

PF Consumer Healthcare Canada ULC
1025 Marcel-Laurin Boulevard
Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido por: **Haleon** Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

.
Costa Rica Reg. No.
El Salvador Reg. No.
Honduras Reg. No.
Guatemala Reg. No.
Panamá Reg. No.
Nicaragua Reg. No.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

LOGOS

**ADVIL
IBUPROFENO
SUSPENSIÓN
100 mg/ 5 mL
INFANTIL**

Caja con frasco con 60 mL y vaso dosificador.

Reduce la fiebre y alivia el dolor

Asociados con:

- Resfriado común
- Gripe
- Dolor de garganta
- Post vacunación

Hasta 8 horas de alivio

Sabor a frutas

Fácil administración

Para edades de 2 a 12 años

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ibuprofeno	2 g
Vehículo cbp	100 mL

INDICACIONES: ADVIL suspensión Infantil, para niños, alivia temporalmente la fiebre y el dolor asociados al resfriado común, gripe, post vacunación; el dolor de cabeza, dientes y dolor de garganta.

DOSIS: utilice la dosis indicada en la tabla siguiente. Si es posible, utilice la dosis por peso, o en caso contrario, utilice como referencia la edad. No exceda la dosis recomendada.

Repita la dosis cada 6-8 horas si es necesario. No lo use más de 4 veces por día. Mida la dosis con el vaso dosificador.

Agítese antes de usar

TABLA DOSIFICADORA		
PESO (Kg)	Edad (años)	Dosis (vaso dosificador)
11 –15	2-3	1 cucharadita (5 ml)
16 – 21	4-5	1 ½ cucharadita (7.5 ml)
22 – 26	6-8	2 cucharaditas (10 ml)
27 – 32	9-10	2 ½ cucharaditas (12.5 ml)
33 – 43	11-12	3 cucharaditas (15 ml)

La acción de una toma (dosis) puede durar de 6-8 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: oral

CONTRAINDICACIONES: no utilizar si el paciente tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquier componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo o en caso de presentar o tener antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: a menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si se presenta una reacción alérgica severa incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas o si presenta sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar en caso de tener asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón o en caso de estar tomando cualquier otro analgésico antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque al corazón o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Consulte a su médico antes de usar si su niño no ha estado tomando líquidos o perdió fluidos debido a vómito o diarrea continuos. Contiene el 50 por ciento de azúcar y 7 por ciento de otros azúcares.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: las manifestaciones más comunes son ardor y dolor epigástrico, náusea, vómito, flatulencia, cólico, diarrea y constipación. En general, estas reacciones son leves y ocurren en muy baja proporción.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por infarto o apoplejía debido a que el ibuprofeno pudiera disminuir los beneficios del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.


SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico inmediatamente.

Si persisten las molestias o empeoran, consulte a su médico. Consérvese el frasco bien cerrado, a no más de 30°C y en lugar seco.

No se deje al alcance de los niños.

Logo de contraindicación del embarazo

Pensando en su tranquilidad y en la de su familia, ADVIL Infantil con tapa de seguridad a prueba de niños. Para abrir presione hacia abajo y gire hacia la izquierda.



Reg. No. 265M98 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Hecho en Canadá por:

PF Consumer Healthcare Canada ULC
1025 Marcel-Laurin Boulevard
Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido por: **Haleon** Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

Costa Rica Reg. No.

El Salvador Reg. No.

Honduras Reg. No.

Guatemala Reg. No.

Panamá Reg. No.

Nicaragua Reg. No.

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA DE FRASCO (PP)

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO SUSPENSIÓN 100 mg/ 5 mL INFANTIL

Frasco con 60 mL y vaso dosificador.

Reduce la fiebre y alivia el dolor

Asociados con:

- Resfriado común
- Gripe
- Dolor de garganta
- Post vacunación

FÓRMULA:

Cada 100 ml contienen:

Ibuprofeno	2 g
Vehículo cbp	100 mL

INDICACIONES: ADVIL suspensión Infantil, para niños, alivia la fiebre y el dolor asociados al resfriado común, gripe, post vacunación; el dolor de cabeza, dientes y dolor de garganta.

DOSIS: utilice la dosis indicada en la tabla siguiente. Si es posible, utilice la dosis por peso, o en caso contrario, utilice como referencia la edad. No exceda la dosis recomendada.

Repita la dosis cada 6-8 horas si es necesario. No lo use más de 4 veces por día. Mida la dosis con el vaso dosificador.

Agítese antes de usar

TABLA DOSIFICADORA		
PESO (Kg)	Edad (años)	Dosis (vaso dosificador)
11 – 15	2-3	1 cucharadita (5 ml)
16 – 21	4-5	1 ½ cucharadita (7.5 ml)
22 – 26	6-8	2 cucharaditas (10 ml)
27 – 32	9-10	2 ½ cucharaditas (12.5 ml)
33 – 43	11-12	3 cucharaditas (15 ml)

La acción de una toma (dosis) puede durar de 6-8 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: oral

CONTRAINDICACIONES: no utilizar si el paciente tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquier componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo o en caso de presentar o tener antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: a menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si se presenta una reacción alérgica severa incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas o si presenta sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar en caso de tener asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón o en caso de estar tomando cualquier otro analgésico antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque al corazón o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Consulte a su médico antes de usar si su niño no ha estado tomando líquidos o perdió fluidos debido a vómito o diarrea continuos. Contiene el 50 por ciento de azúcar y 7 por ciento de otros azúcares.

Si persisten las molestias o empeoran, consulte a su médico. Consérvese el frasco bien cerrado a no más de 30°C y en lugar seco.

No se deje al alcance de los niños.

Logo de contraindicación del embarazo

Reg. No. 265M98 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

PM 03
JULIO 2024
ADVIL SUSPENSIÓN
CDS: Ibuprofen CDS Versión 13.0 del 18-Jan-2019

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Hecho en Canadá por:

PF Consumer Healthcare Canada ULC
1025 Marcel-Laurin Boulevard
Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido por: **Haleon** Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

Costa Rica Reg. No.
El Salvador Reg. No.
Honduras Reg. No.
Guatemala Reg. No.
Panamá Reg. No.
Nicaragua Reg. No.

PROYECTO DE MARBETE PARA CAJA

LOGOS

ADVIL IBUPROFENO SUSPENSIÓN 100 mg/ 5 mL PEDIÁTRICA

Caja con frasco con 60 mL y jeringa dosificadora.

Reduce la fiebre y alivia el dolor

Asociados con:

- Resfriado común
- Gripe
- Dolor de garganta
- Post vacunación

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ibuprofeno	2 g
Vehículo cbp	100 mL

INDICACIONES: ADVIL suspensión Pediátrica para niños, alivia la fiebre y el dolor asociados al resfriado común, gripe, post vacunación; el dolor de cabeza, dientes y dolor de garganta.

DOSIS: utilice la dosis indicada en la tabla siguiente. Si es posible, utilice la dosis por peso, o en caso contrario, utilice como referencia la edad. No exceda la dosis recomendada.

Repita la dosis cada 6-8 horas si es necesario. No lo use más de 4 veces por día. Mida la dosis con la jeringa dosificadora
Agítese antes de usar

TABLA DOSIFICADORA		
PESO (Kg)	EDAD	DOSIS
2.0 – 5.0	0 – 6 meses	Consulte a su médico
5.4 – 7.7	6 – 11 meses	2.5 ml (½ jeringa)
7.8 – 10.9	12 – 23 meses	3.75 ml (¾ jeringa)
11 – 15	2 – 3 años	5.0 ml (1 jeringa)

La acción de una toma (dosis) puede durar de 6-8 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: oral

CONTRAINDICACIONES: no utilizar si el paciente tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquier componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo o en caso de presentar o tener antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: a menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si se presenta una reacción alérgica severa incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampulas o si presenta sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar en caso de tener asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón o en caso de estar tomando cualquier otro analgésico antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque al corazón o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Consulte a su médico antes de usar si su niño no ha estado tomando líquidos o perdió fluidos debido a vómito o diarrea continuos. Contiene el 50 por ciento de azúcar y 7 por ciento de otros azúcares.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: las manifestaciones más comunes son ardor y dolor epigástrico, náusea, vómito, flatulencia, cólico, diarrea y constipación. En general, estas reacciones son leves y ocurren en muy baja proporción.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: consulte a su médico antes de usar en caso de estar tomando ácido acetilsalicílico por infarto o apoplejía debido a que el ibuprofeno pudiera disminuir los beneficios del ácido acetilsalicílico, o en caso de estar tomando cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo, anticoagulantes o cualquier otro medicamento.

SOBREDOSIS: suspenda el medicamento y consulte a su médico inmediatamente.

Si persisten las molestias o empeoran, consulte a su médico. Consérvese el frasco bien cerrado, a no más de 30°C y en lugar seco.

No se deje al alcance de los niños.
Logo de contraindicación del embarazo

Pensando en su tranquilidad y en la de su familia,
ADVIL* Pediátrico con tapa de seguridad a prueba de
niños. Para abrir presione hacia abajo y gire hacia la
izquierda.



Reg. No. 265M98 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Precio Máximo al Público:

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o
en mystory.mx@haleon.com

Hecho en Canadá por:

PF Consumer Healthcare Canada ULC
1025 Marcel-Laurin Boulevard
Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido por: **Haleon** Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

Costa Rica Reg. No.
El Salvador Reg. No.
Guatemala Reg. No.
Panamá Reg. No.
Honduras Reg. No.
Nicaragua Reg. No.

PROYECTO DE MARBETE PARA ETIQUETA FRASCO (PP)

LOGOS

**ADVIL
IBUPROFENO
SUSPENSIÓN
100 mg/ 5 mL
PEDIATRICA**

Frasco con 60 mL

Reduce la fiebre y alivia el dolor

Asociados con:

- Resfriado común
- Gripe
- Dolor de garganta
- Post vacunación

FÓRMULA:

Cada 100 mL contienen:

Ibuprofeno	2 g
Vehículo cbp	100 mL

INDICACIONES: ADVIL suspensión Pediátrica para niños, alivia temporalmente la fiebre y el dolor asociados al resfriado común, gripe, post vacunación; el dolor de cabeza, dientes y dolor de garganta.

DOSIS: utilice la dosis indicada en la tabla siguiente. Si es posible, utilice la dosis por peso, o en caso contrario, utilice como referencia la edad. No exceda la dosis recomendada.

Repita la dosis cada 6-8 horas si es necesario. No lo use más de 4 veces por día. Mida la dosis con la jeringa dosificadora.

Agítese antes de usar.

TABLA DOSIFICADORA		
PESO (Kg)	EDAD	DOSIS
2.0 – 5.0	0 – 6 meses	Consulte a su médico
5.4 – 7.7	6 – 11 meses	2.5 ml (½ jeringa)
7.8 – 10.9	12 – 23 meses	3.75 ml (¾ jeringa)
11 – 15	2 – 3 años	5.0 ml (1 jeringa)

La acción de una toma (dosis) puede durar de 6-8 horas.

VIA DE ADMINISTRACIÓN: oral

CONTRAINDICACIONES: no utilizar si el paciente tiene hipersensibilidad al ibuprofeno o a cualquier componente de la fórmula, al ácido acetilsalicílico o a cualquier antiinflamatorio no esteroideo o en caso de presentar o tener antecedentes de úlcera o sangrado gastrointestinal o durante los últimos 3 meses de embarazo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: a menos que el médico lo indique, descontinúe su uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 10 días o si la fiebre empeora o persiste por más de 3 días, si se presenta una reacción alérgica severa incluyendo enrojecimiento de la piel, erupción o ampollas o si presenta sangre en vómito o heces negras o sanguinolentas. Consulte a su médico antes de usar en caso de tener asma, enfermedad del corazón, cirrosis hepática, hipertensión o enfermedad del riñón o en caso de estar tomando cualquier otro analgésico antiinflamatorio no esteroideo. El uso continuo a largo plazo puede incrementar el riesgo de ataque al corazón o apoplejía. Los efectos adversos pueden minimizarse utilizando la dosis menor por la menor duración de tiempo. Consulte a su médico antes de usar si su niño no ha estado tomando líquidos o perdió fluidos debido a vómito o diarrea continuos. Contiene el 50 por ciento de azúcar y 7 por ciento de otros azúcares.

Si persisten las molestias o empeoran, consulte a su médico. Consérvese el frasco bien cerrado a no más de 30°C y en lugar seco.

No se deje al alcance de los niños.

Logo de contraindicación del embarazo

Reg. No. 265M98 SSA VI

Lote.

Caducidad:

Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

PM 03
JULIO 2024
ADVIL SUSPENSIÓN
CDS: Ibuprofen CDS Versión 13.0 del 18-Jan-2019

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Hecho en Canadá por:

PF Consumer Healthcare Canada ULC
1025 Marcel-Laurin Boulevard
Saint-Laurent, Quebec, H4R 1J6, Canadá.

Distribuido por: **Haleon** Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

Costa Rica Reg. No.
El Salvador Reg. No.
Honduras Reg. No.
Guatemala Reg. No.
Panamá Reg. No.
Nicaragua Reg. No.