

PROYECTO DE MARBETE SOBRES

LOGO GSK LOGOS

THERAFLU DAYTIME
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg

Auxiliar en el alivio de los síntomas de RESFRIADO SEVERO Y TOS
Reduce los síntomas más molestos de gripa y tos

Sobre con 10.2 g
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Para el alivio de los síntomas del resfriado y tos como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos producida por irritación leve de garganta y bronquios
- Dolor leve de garganta
- Dolores menores, dolor de cabeza
- Reducción temporal de la fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.
Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.
No debe utilizarse el producto más de 7 días.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
En pacientes que ingieran o hayan ingerido inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en los últimos 14 días.
No tome este producto si padece: enfermedad renal o hepática, enfermedad cardiovascular, hipertensión, hipertiroidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática, glaucoma, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, riesgo de desarrollar deficiencia respiratoria.

Precauciones y advertencias: Consulte a su médico si tiene: Tos crónica o con demasiada flema; dolor de garganta intenso que persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náuseas o vómitos; fiebre que empeora o dura por más de 3 días; dolor, tos o congestión nasal que empeoran o duran más de 7 días o se acompañan de fiebre alta, sarpullido o dolor de cabeza persistente.
No exceda la dosis recomendada ni se tome por más de 7 días consecutivos.
Si persisten las molestias o tiene efectos secundarios consulte a su médico.
No tomar con otros productos que contengan paracetamol.
No consumir bebidas alcohólicas.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.
Contiene 73.8 % de azúcar.
Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina. Contiene aspartamo.
Este medicamento contiene azul No. 1 que puede producir reacciones alérgicas.
No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

Reacciones adversas: Deje de tomar este medicamento y consulte a su médico si experimenta: Reacciones alérgicas como sibilancias, dificultad para respirar, hinchazón de cara, labios, lengua o garganta; urticaria, enrojecimiento de la piel; descamación, ampollas, llagas, úlceras en la boca; sangrado o moretones; náusea, vómito, mareo, insomnio, nerviosismo, dolor de cabeza, taquicardia, palpitaciones e hipertensión, malestar abdominal, diarrea o somnolencia.
Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Interacciones medicamentosas y alimentarias: Debe evitarse el consumo concomitante con medicamentos para la tuberculosis, anticonvulsivantes, anticoagulantes orales (acenocumarina, warfarina), probenecid, medicamentos para tratar la depresión (amitriptilina), medicamentos usados

PM 06
JULIO 2024
Theraflu Daytime
CSS
GDS
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

para evitar náuseas y vómito (domperidona, metoclopramida), antiarrítmicos (amiodarona) y antihipertensivos (dabrisoquina, metildopa, reserpina).

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente.

Consérvese a no más de 30°C.

No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Hecho y acondicionado en EUA por:

Haleon US Inc.

10401 HWY 6, Lincoln, NE 68517, EUA.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.

Autopista México Querétaro Km 34.5

Nave 6 Int. 5, Col. San Isidro, C.P. 54740,

Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

Haleon Consumer Healthcare

México, S. de R.L. de C.V.

Autopista México-Qro. KM 41.5 Edif. TR9 Int. 5B,

Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715,

Cuautitlán Izcalli, México, México.

Distribuido por:

Haleon Consumer Healthcare

México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Reg. No. 026M2016 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en

mystory.mx@haleon.com

PROYECTO DE MARBETE SOBRES VENTA INDIVIDUAL

LOGOS

THERAFLU DAYTIME

Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg

Auxiliar en el alivio de los síntomas de RESFRIADO SEVERO Y TOS
Reduce los síntomas más molestos de gripa y tos

Sobre con 10.2 g
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Para el alivio de los síntomas del resfriado y tos como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos producida por irritación leve de garganta y bronquios
- Dolor leve de garganta
- Dolores menores, dolor de cabeza
- Reducción temporal de la fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.

Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.

No debe utilizarse el producto más de 7 días.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
En pacientes que ingieran o hayan ingerido inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en los últimos 14 días.
No tome este producto si padece: enfermedad renal o hepática, enfermedad cardiovascular, hipertensión, hipertiroidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática, glaucoma, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, riesgo de desarrollar deficiencia respiratoria.

Precauciones y advertencias: Consulte a su médico si tiene: Tos crónica o con demasiada flema; dolor de garganta intenso que persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náuseas o vómitos; fiebre que empeora o dura por más de 3 días; dolor, tos o congestión nasal que empeoran o duran más de 7 días o se acompañan de fiebre alta, sarpullido o dolor de cabeza persistente.
No exceda la dosis recomendada ni se tome por más de 7 días consecutivos.
Si persisten las molestias o tiene efectos secundarios consulte a su médico.
No tomar con otros productos que contengan paracetamol.
No consumir bebidas alcohólicas.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.
Contiene 73.8 % de azúcar.
Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina. Contiene aspartamo.
Este medicamento contiene azul No. 1 que puede producir reacciones alérgicas.
No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

Reacciones adversas: Deje de tomar este medicamento y consulte a su médico si experimenta: Reacciones alérgicas como sibilancias, dificultad para respirar, hinchazón de cara, labios, lengua o garganta; urticaria, enrojecimiento de la piel; descamación, ampollas, llagas, úlceras en la boca; sangrado o moretones; náusea, vómito, mareo, insomnio, nerviosismo, dolor de cabeza, taquicardia, palpitaciones e hipertensión, malestar abdominal, diarrea o somnolencia.
Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Interacciones medicamentosas y alimentarias: Debe evitarse el consumo concomitante con medicamentos para la tuberculosis, anticonvulsivantes, anticoagulantes orales (acenocumarina, warfarina), probenecid, medicamentos para tratar la depresión (amitriptilina), medicamentos usados

PM 06
JULIO 2024
Theraflu Daytime
CSS
GDS
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

para evitar náuseas y vómito (domperidona, metoclopramida), antiarrítmicos (amiodarona) y antihipertensivos (debrisoquina, metildopa, reserpina).

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente.

Consérvese a no más de 30°C.

No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Hecho y acondicionado en EUA por:

[Haleon US Inc.](#)

10401 HWY 6, Lincoln, NE 68517, EUA.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics

SC México, S.A. de C.V.

Autopista México Querétaro Km 34.5

Nave 6 Int. 5, Col. San Isidro, C.P. 54740,

Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

Haleon Consumer Healthcare

México, S. de R.L. de C.V.

Autopista México-Qro. KM 41.5 Edif. TR9 Int. 5B,

Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54750 54715,

Cuautitlán Izcalli, México, México.

Distribuido por:

Haleon Consumer Healthcare

México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio máximo al público:

Reg. No. 026M2016 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en

mystory.mx@haleon.com

PROYECTO DE MARBETE CAJA INDIVIDUAL

LOGOS

THERAFLU DAYTIME
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg
Oral

Auxiliar en el alivio de los síntomas de RESFRIADO SEVERO Y TOS
Reduce los síntomas más molestos de gripa y tos

Caja con 1, 6, 10, 12 o 20 sobres
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de Dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de Fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Para el alivio de los síntomas del resfriado y tos como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos producida por irritación leve de garganta y bronquios
- Dolor leve de garganta
- Dolores menores, dolores de cabeza
- Reducción temporal de la fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.
Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.

No debe utilizarse el producto más de 7 días.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
En pacientes que ingieran o hayan ingerido inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en los últimos 14 días.
No tome este producto si padece: enfermedad renal o hepática, enfermedad cardiovascular, hipertensión, hipertiroidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática, glaucoma, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, riesgo de desarrollar deficiencia respiratoria.

Precauciones y advertencias: Consulte a su médico si tiene: Tos crónica o con demasiada flema; dolor de garganta intenso que persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náuseas o vómitos; fiebre que empeora o dura por más de 3 días; dolor, tos o congestión nasal que empeoran o duran más de 7 días o se acompañan de fiebre alta, sarpullido o dolor de cabeza persistente.
No exceda la dosis recomendada ni se tome por más de 7 días consecutivos.
Si persisten las molestias o tiene efectos secundarios consulte a su médico.
No tomar con otros productos que contengan paracetamol.
No consumir bebidas alcohólicas.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso. Contiene 73.8 % de azúcar.
Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina. Contiene aspartamo.
Este medicamento contiene azul No. 1 que puede producir reacciones alérgicas.
No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

Reacciones adversas: Deje de tomar este medicamento y consulte a su médico si experimenta: Reacciones alérgicas como sibilancias, dificultad para respirar, hinchazón de cara, labios, lengua o garganta; urticaria, enrojecimiento de la piel; descamación, ampollas, llagas, úlceras en la boca; sangrado o moretones; náusea, vómito, mareo, insomnio, nerviosismo, dolor de cabeza, taquicardia, palpitaciones e hipertensión, malestar abdominal, diarrea o somnolencia.
Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Interacciones medicamentosas y alimentarias: Debe evitarse el consumo concomitante con medicamentos para la tuberculosis, anticonvulsivantes, anticoagulantes orales (acenocumarina, warfarina), probenecid, medicamentos para tratar la depresión (amitriptilina), medicamentos usados

PM 06
JULIO 2024
Theraflu Daytime
CSS
GDS
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 3 Piso 11
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

para evitar náuseas y vómito (domperidona, metoclopramida), antiarrítmicos (amiodarona) y antihipertensivos (debrisoquina, metildopa, reserpina).

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.
No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Hecho y acondicionado en EUA por:

[Haleon US Inc.](#)
10401 HWY 6, Lincoln, NE 68517, EUA.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics
SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km 34.5
Nave 6 Int. 5, Col. San Isidro, C.P. 54740,
Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

[Haleon Consumer Healthcare](#)
México, S. de R.L. de C.V.
Autopista México-Qro. KM 41.5 Edif. TR9 Int. 5B,
Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715,
Cuautitlán Izcalli, México, México.

Distribuido por:

[Haleon Consumer Healthcare](#)
México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio máximo al público:

Reg. No. 026M2016 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

PROYECTO DE MARBETE CAJA DISPENSADORA

LOGOS

THERAFLU DAYTIME

Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg
Oral

Auxiliar en el alivio de los síntomas de RESFRIADO SEVERO Y TOS
Reduce los síntomas más molestos de gripa y tos

Caja con 6, 10, 12, 20 o 50 sobres
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de Dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de Fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Para el alivio de los síntomas del resfriado y tos como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos producida por irritación leve de garganta y bronquios
- Dolor leve de garganta
- Dolores menores, dolor de cabeza
- Reducción temporal de la fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y mayores de 12 años: disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.
Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.
No debe utilizarse el producto más de 7 días.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.
En pacientes que ingieran o hayan ingerido inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en los últimos 14 días.
No tome este producto si padece: enfermedad renal o hepática, enfermedad cardiovascular, hipertensión, hipertiroidismo, diabetes mellitus, hipertrofia prostática, glaucoma, deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, riesgo de desarrollar deficiencia respiratoria.

Precauciones y advertencias: Consulte a su médico si tiene: Tos crónica o con demasiada flema; dolor de garganta intenso que persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, náuseas o vómitos; fiebre que empeora o dura por más de 3 días; dolor, tos o congestión nasal que empeoran o duran más de 7 días o se acompañan de fiebre alta, sarpullido o dolor de cabeza persistente.
No exceda la dosis recomendada ni se tome por más de 7 días consecutivos.
Si persisten las molestias o tiene efectos secundarios consulte a su médico.
No tomar con otros productos que contengan paracetamol.
No consumir bebidas alcohólicas.
Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.
Contiene 73.8 % de azúcar.
Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina. Contiene aspartamo.
Este medicamento contiene azul No. 1 que puede producir reacciones alérgicas.
No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

Reacciones adversas: Deje de tomar este medicamento y consulte a su médico si experimenta: Reacciones alérgicas como sibilancias, dificultad para respirar, hinchazón de cara, labios, lengua o garganta; urticaria, enrojecimiento de la piel; descamación, ampollas, llagas, úlceras en la boca; sangrado o moretones; náusea, vómito, mareo, insomnio, nerviosismo, dolor de cabeza, taquicardia, palpitaciones e hipertensión, malestar abdominal, diarrea o somnolencia.
Reporte las sospechas de reacción adversa [al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx](mailto:farmacovigilancia@cofepris.gob.mx)

Interacciones medicamentosas y alimentarias: Debe evitarse el consumo concomitante con medicamentos para la tuberculosis, anticonvulsivantes, anticoagulantes orales (acenocumarina, warfarina), probenecid, medicamentos para tratar la depresión (amitriptilina), medicamentos usados

PM 06
JULIO 2024
Theraflu Daytime
CSS
GDS
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

para evitar náuseas y vómito (domperidona, metoclopramida), antiarrítmicos (amiodarona) y antihipertensivos (debrisoquina, metildopa, reserpina).

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente.

Consérvese a no más de 30°C.
No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Hecho y acondicionado en EUA por:

[Haleon US Inc.](#)
10401 HWY 6, Lincoln, NE 68517, EUA.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics
SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km 34.5
Nave 6 Int. 5, Col. San Isidro, C.P. 54740,
Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

[Haleon Consumer Healthcare](#)
México, S. de R.L. de C.V.
Autopista México-Qro. KM 41.5 Edif. TR9 Int. 5B,
Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715,
Cuautitlán Izcalli, México, México.

Distribuido por:

[Haleon Consumer Healthcare](#)
México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578,
Jiutepec, Morelos, México.

Lote:

Caducidad:

Precio máximo al público:

Reg. No. 026M2016 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com