

PROYECTO DE MARBETE SOBRES

LOGOS

THERAFLU DAYTIME
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg

Para el alivio de los síntomas de RESFRIADO Y TOS.
Reduce los síntomas de gripa y tos.

Sobre con 10.2 g
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Auxiliar para el alivio temporal de los síntomas del resfriado e influenza, tales como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos causada por irritación menor de garganta y bronquios.
- Dolores menores de garganta y cabeza
- Fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral, para solución. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.

Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.

No tomar por más de 7 días sin consultar a su médico.

No exceder la dosis establecida.

Usar la dosis más pequeña que necesite para tratar sus síntomas y usar el medicamento por el periodo de tiempo más corto necesario.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: No usar si:

- Es alérgico al paracetamol, dextrometorfano, fenilefrina o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Está tomando o haya tomado inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en las últimas 2 semanas, los cuales son utilizados para tratar la depresión.
- Tiene una infección en el pecho, empeoramiento del asma o problemas respiratorios severos.

Precauciones y advertencias: Contiene paracetamol. Siempre leer y seguir la etiqueta. No tomar:

- Con cualquier otro medicamento para el alivio de la tos y el resfriado, congestión o nariz tapada.
- Más de la dosis recomendada, ya que puede causar daños serios a su hígado.
- Junto con otros medicamentos que contengan paracetamol, para tratar el dolor, fiebre, síntomas de resfriado o gripe o para inducir el sueño.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Tiene problemas hepáticos o renales.
- Tiene bajo peso o está desnutrido.
- Bebe alcohol regularmente. Es posible que deba evitar el uso de este producto en su totalidad o limitar la cantidad de paracetamol que tome. No consumir bebidas alcohólicas mientras toma este producto.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Presenta tos a largo plazo o persistente (como con asma y enfisema) o con demasiada flema.
- Presenta presión sanguínea alta, enfermedad cardíaca o enfermedad de los vasos sanguíneos, tales como el fenómeno de Raynaud (la cual puede aparecer como entumecimiento, hormigueo y cambio de coloración (blanco, azul y después rojo) en los dedos de manos y pies cuando se exponen al frío), diabetes o hipertiroidismo (glándula tiroides hiperactiva).
- Tiene glaucoma (presión excesiva dentro de sus ojos).
- Tiene feocromocitoma (un tumor inusual de las glándulas suprarrenales que se sitúa arriba de los riñones).
- Presenta dificultad para orinar debido al agrandamiento de la glándula prostática.
- Presenta una infección severa, está severamente desnutrido, severamente bajo de peso o es un usuario crónico del alcohol, ya que esto puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica.

Los signos de la acidosis metabólica incluyen: respiración profunda, rápida y difícil, tiene náusea o vómito, pérdida del apetito.

Consulte al médico inmediatamente si tiene una combinación de estos síntomas.

No tome este medicamento con ninguno de los siguientes medicamentos:

- Warfarina o medicamentos similares (anticoagulantes), utilizados para diluir la sangre.
- Para controlar su presión sanguínea (beta bloqueadores).
- Para padecimientos cardíacos (digoxina).
- Supresores o estimulantes del apetito.
- Para tratar la depresión, como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos (amitriptilina).
- Para el tratamiento del dolor de cabeza agudo de migraña (ergotamina, metisergida).

Debe informar a su médico acerca de cualquier otro medicamento que esté tomando.

- Ha abusado de drogas u otras sustancias en el pasado.
- Tiene características específicas de metabolismo (metabolizador lento del CYP2D6).

Si el dolor de garganta es severo, persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos. Si la fiebre dura más de 3 días, si el dolor de cabeza o erupción persiste; estos pueden ser signos de una condición más seria, se debe buscar consejo médico.

No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Este medicamento puede producir somnolencia o mareo y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso

Información importante acerca de algunos de los ingredientes en su producto:

Si ha sido advertido por su médico que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Contiene 73.8% de azúcar. Esto debe tomarse en consideración si tiene diabetes. Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina, la cual puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria. Contiene aspartamo.

Este medicamento contiene azul No. 1 y rojo allura que puede producir reacciones alérgicas.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

PM 09
ABRIL 2026: MAH-PITAYA
Theraflu Daytime
GDS 8.0
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 2 Piso 03
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Reacciones adversas: Al utilizar este producto puede experimentar: dolor de cabeza, mareo, nerviosismo, dificultad para dormir, hipertensión, náusea, vómito y dolor estomacal. Deje de tomar este medicamento y consulte inmediatamente a su médico si experimenta:

- Reacciones alérgicas como erupción cutánea o comezón a veces con problemas respiratorios o hinchazón de cara, labios, lengua o garganta.
- Erupción cutánea o descamación, o úlceras en la boca.
- Sangrado o hematomas inexplicables.
- Confusión, sensación de inquietud, sudoración, agitación, temblores, sacudidas repentinas de los músculos o aumento de la presión sanguínea, ya que pueden ser síntomas de una condición llamada síndrome de la serotonina.
- Ha experimentado anteriormente problemas respiratorios con aspirina o con antiinflamatorios no esteroideos o experimenta una reacción similar con este producto.
- Taquicardia inusual o sensación de ritmo cardíaco inusualmente rápido o irregular
- Pérdida de la visión que puede deberse a una anormal y alta presión sanguínea en los ojos, muy probable que ocurra en pacientes con glaucoma.
- Dificultad al orinar lo cual es más probable que ocurra en hombres con agrandamiento de la glándula prostática.

Estas reacciones son raras. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente, incluso si no tiene síntomas debido al riesgo de falla hepática.

Consérvese a no más de 30°C.
No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Lote:
Caducidad:
Precio máximo al público:

Reg. No. 026M2016 SSA VI
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

PROYECTO DE MARBETE SOBRES VENTA INDIVIDUAL

LOGOS

THERAFLU DAYTIME

Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg

Auxiliar en el alivio de los síntomas de RESFRIADO Y TOS.
Reduce los síntomas de gripa y tos.

Sobre con 10.2 g
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Auxiliar para el alivio temporal de los síntomas del resfriado e influenza, tales como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos causada por irritación menor de garganta y bronquios.
- Dolores menores de garganta y cabeza
- Fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral, para solución. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.

Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.

No tomar por más de 7 días sin consultar a su médico.

No exceder la dosis establecida.

Usar la dosis más pequeña que necesite para tratar sus síntomas y usar el medicamento por el periodo de tiempo más corto necesario.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: No usar si:

- Es alérgico al paracetamol, dextrometorfano, fenilefrina o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Está tomando o haya tomado inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en las últimas 2 semanas, los cuales son utilizados para tratar la depresión.
- Tiene una infección en el pecho, empeoramiento del asma o problemas respiratorios severos

Precauciones y advertencias: Contiene paracetamol. Siempre leer y seguir la etiqueta. No tomar:

- Con cualquier otro medicamento para el alivio de la tos y el resfriado, congestión o nariz tapada.
- Más de la dosis recomendada, ya que puede causar daños serios a su hígado.
- Junto con otros medicamentos que contengan paracetamol, para tratar el dolor, fiebre, síntomas de resfriado o gripe o para inducir el sueño.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Tiene problemas hepáticos o renales.
- Tiene bajo peso o está desnutrido.
- Bebe alcohol regularmente. Es posible que deba evitar el uso de este producto en su totalidad o limitar la cantidad de paracetamol que tome. No consumir bebidas alcohólicas mientras toma este producto.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Presenta tos a largo plazo o persistente (como con asma y enfisema) o con demasiada flema.
- Presenta presión sanguínea alta, enfermedad cardíaca o enfermedad de los vasos sanguíneos, tales como el fenómeno de Raynaud (la cual puede aparecer como entumecimiento, hormigueo y cambio de coloración (blanco, azul y después rojo) en los dedos de manos y pies cuando se exponen al frío), diabetes o hipertiroidismo (glándula tiroides hiperactiva).
- Tiene glaucoma (presión excesiva dentro de sus ojos).
- Tiene feocromocitoma (un tumor inusual de las glándulas suprarrenales que se sitúa arriba de los riñones).
- Presenta dificultad para orinar debido al agrandamiento de la glándula prostática.
- Presenta una infección severa, está severamente desnutrido, severamente bajo de peso o es un usuario crónico del alcohol, ya que esto puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica.

Los signos de la acidosis metabólica incluyen: respiración profunda, rápida y difícil, tiene náusea o vómito, pérdida del apetito.

Consulte al médico inmediatamente si tiene una combinación de estos síntomas.

No tome este medicamento con ninguno de los siguientes medicamentos:

- Warfarina o medicamentos similares (anticoagulantes), utilizados para diluir la sangre.
- Para controlar su presión sanguínea (beta bloqueadores).
- Para padecimientos cardíacos (digoxina).
- Supresores o estimulantes del apetito.
- Para tratar la depresión, como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos (amitriptilina).
- Para el tratamiento del dolor de cabeza agudo de migraña (ergotamina, metisergida).

Debe informar a su médico acerca de cualquier otro medicamento que esté tomando.

- Ha abusado de drogas u otras sustancias en el pasado.
- Tiene características específicas de metabolismo (metabolizador lento del CYP2D6).

Si el dolor de garganta es severo, persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos. Si la fiebre dura más de 3 días, si el dolor de cabeza o erupción persiste; estos pueden ser signos de una condición más seria, se debe buscar consejo médico.

No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Este medicamento puede producir somnolencia o mareo y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

Información importante acerca de algunos de los ingredientes en su producto:

Si ha sido advertido por su médico que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Contiene 73.8% de azúcar. Esto debe tomarse en consideración si tiene diabetes. Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina, la cual puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria. Contiene aspartamo.

Este medicamento contiene azul No. 1 y rojo allura que puede producir reacciones alérgicas.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

Reacciones adversas: Al utilizar este producto puede experimentar: dolor de cabeza, mareo, nerviosismo, dificultad para dormir, hipertensión, náusea, vómito y dolor estomacal. Deje de tomar este medicamento y consulte inmediatamente a su médico si experimenta:

- Reacciones alérgicas como erupción cutánea o comezón a veces con problemas respiratorios o hinchazón de cara, labios, lengua o garganta.
- Erupción cutánea o descamación, o úlceras en la boca.
- Sangrado o hematomas inexplicables.
- Confusión, sensación de inquietud, sudoración, agitación, temblores, sacudidas repentinas de los músculos o aumento de la presión sanguínea, ya que pueden ser síntomas de una condición llamada síndrome de la serotonina.
- Ha experimentado anteriormente problemas respiratorios con aspirina o con antiinflamatorios no esteroideos o experimenta una reacción similar con este producto.
- Taquicardia inusual o sensación de ritmo cardíaco inusualmente rápido o irregular
- Pérdida de la visión que puede deberse a una anormal y alta presión sanguínea en los ojos, muy probable que ocurra en pacientes con glaucoma.
- Dificultad al orinar lo cual es más probable que ocurra en hombres con agrandamiento de la glándula prostática.

Estas reacciones son raras. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente, incluso si no tiene síntomas debido al riesgo de falla hepática.

Consérvese a no más de 30°C.
No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Hecho y acondicionado en EUA por:
Haleon US Inc.
10401 HWY 6, Lincoln, NE 68517, EUA.

Para: Haleon Panamá, S.A.
Urbanización Parque Industrial, Calle A y B, Correg.
Juan Díaz, Provincia Panamá, Panamá.

Acondicionador secundario:
DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km 34.5
Nave 6 Int. 5, Col. San Isidro, C.P. 54740,
Cuautitlán Izcalli, México, México.

PM 09
ABRIL 2026: MAH-PITAYA
Theraflu Daytime
GDS 8.0
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 2 Piso 03
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Representante legal, Importado y Distribuido por:
Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Autopista México-Qro. KM 41.5 Edif. TR9 Int. 5A/5B,
Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Lote:
Caducidad:
Precio máximo al público:

Reg. No. 026M2016 SSA VI
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en
mystory.mx@haleon.com
Marcas propiedad o licenciadas por Haleon.

PROYECTO DE MARBETE CAJA INDIVIDUAL

LOGOS

THERAFLU DAYTIME
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg
Oral

Para el alivio de los síntomas de RESFRIADO Y TOS.
Reduce los síntomas de gripa y tos.

Caja con 1, 6, 10, 12 o 20 sobres
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de Dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de Fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Auxiliar para el alivio temporal de los síntomas del resfriado e influenza, tales como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos causada por irritación menor de garganta y bronquios.
- Dolores menores de garganta y cabeza
- Fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral, para solución. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.

Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.

No tomar por más de 7 días sin consultar a su médico.

No exceder la dosis establecida.

Usar la dosis más pequeña que necesite para tratar sus síntomas y usar el medicamento por el periodo de tiempo más corto necesario.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: No usar si:

- Es alérgico al paracetamol, dextrometorfano, fenilefrina o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Está tomando o haya tomado inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en las últimas 2 semanas, los cuales son utilizados para tratar la depresión.
- Tiene una infección en el pecho, empeoramiento del asma o problemas respiratorios severos.

Precauciones y advertencias: Contiene paracetamol. Siempre leer y seguir la etiqueta. No tomar:

- Con cualquier otro medicamento para el alivio de la tos y el resfriado, congestión o nariz tapada.
- Más de la dosis recomendada, ya que puede causar daños serios a su hígado.
- Junto con otros medicamentos que contengan paracetamol, para tratar el dolor, fiebre, síntomas de resfriado o gripe o para inducir el sueño.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Tiene problemas hepáticos o renales.
- Tiene bajo peso o está desnutrido.
- Bebe alcohol regularmente. Es posible que deba evitar el uso de este producto en su totalidad o limitar la cantidad de paracetamol que tome. No consumir bebidas alcohólicas mientras toma este producto.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Presenta tos a largo plazo o persistente (como con asma y enfisema) o con demasiada flema.
- Presenta presión sanguínea alta, enfermedad cardíaca o enfermedad de los vasos sanguíneos, tales como el fenómeno de Raynaud (la cual puede aparecer como entumecimiento, hormigueo y cambio de coloración (blanco, azul y después rojo) en los dedos de manos y pies cuando se exponen al frío), diabetes o hipertiroidismo (glándula tiroides hiperactiva).
- Tiene glaucoma (presión excesiva dentro de sus ojos).
- Tiene feocromocitoma (un tumor inusual de las glándulas suprarrenales que se sitúa arriba de los riñones).
- Presenta dificultad para orinar debido al agrandamiento de la glándula prostática.
- Presenta una infección severa, está severamente desnutrido, severamente bajo de peso o es un usuario crónico del alcohol, ya que esto puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica.

Los signos de la acidosis metabólica incluyen: respiración profunda, rápida y difícil, tiene náusea o vómito, pérdida del apetito.

Consulte al médico inmediatamente si tiene una combinación de estos síntomas.

No tome este medicamento con ninguno de los siguientes medicamentos:

- Warfarina o medicamentos similares (anticoagulantes), utilizados para diluir la sangre.
- Para controlar su presión sanguínea (beta bloqueadores).
- Para padecimientos cardíacos (digoxina).
- Supresores o estimulantes del apetito.
- Para tratar la depresión, como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos (amitriptilina).
- Para el tratamiento del dolor de cabeza agudo de migraña (ergotamina, metisergida).

Debe informar a su médico acerca de cualquier otro medicamento que esté tomando.

- Ha abusado de drogas u otras sustancias en el pasado.
- Tiene características específicas de metabolismo (metabolizador lento del CYP2D6).

Si el dolor de garganta es severo, persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos. Si la fiebre dura más de 3 días, si el dolor de cabeza o erupción persiste; estos pueden ser signos de una condición más seria, se debe buscar consejo médico.

No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Este medicamento puede producir somnolencia o mareo y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso

Información importante acerca de algunos de los ingredientes en su producto:

Si ha sido advertido por su médico que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Contiene 73.8% de azúcar. Esto debe tomarse en consideración si tiene diabetes. Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina, la cual puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria. Contiene aspartamo.

Este medicamento contiene azul No. 1 y rojo allura que puede producir reacciones alérgicas.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

Reacciones adversas: Al utilizar este producto puede experimentar: dolor de cabeza, mareo, nerviosismo, dificultad para dormir, hipertensión, náusea, vómito y dolor estomacal. Deje de tomar este medicamento y consulte inmediatamente a su médico si experimenta:

- Reacciones alérgicas como erupción cutánea o comezón a veces con problemas respiratorios o hinchazón de cara, labios, lengua o garganta.
- Erupción cutánea o descamación, o úlceras en la boca.
- Sangrado o hematomas inexplicables.
- Confusión, sensación de inquietud, sudoración, agitación, temblores, sacudidas repentinas de los músculos o aumento de la presión sanguínea, ya que pueden ser síntomas de una condición llamada síndrome de la serotonina.
- Ha experimentado anteriormente problemas respiratorios con aspirina o con antiinflamatorios no esteroideos o experimenta una reacción similar con este producto.
- Taquicardia inusual o sensación de ritmo cardíaco inusualmente rápido o irregular
- Pérdida de la visión que puede deberse a una anormal y alta presión sanguínea en los ojos, muy probable que ocurra en pacientes con glaucoma.
- Dificultad al orinar lo cual es más probable que ocurra en hombres con agrandamiento de la glándula prostática.

Estas reacciones son raras. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente, incluso si no tiene síntomas debido al riesgo de falla hepática.

Consérvese la caja bien cerrada a no más de 30°C.
No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Hecho y acondicionado en EUA por:
Haleon US Inc.
10401 HWY 6, Lincoln, NE 68517, EUA.

Para: Haleon Panamá, S.A.
Urbanización Parque Industrial, Calle A y B, Correg.
Juan Díaz, Provincia Panamá, Panamá.

Acondicionador secundario:
DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km 34.5
Nave 6 Int. 5, Col. San Isidro, C.P. 54740,
Cuautitlán Izcalli, México, México.

PM 09
ABRIL 2026: MAH-PITAYA
Theraflu Daytime
GDS 8.0
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 2 Piso 03
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Representante legal, Importado y Distribuido por:
Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Autopista México-Qro. KM 41.5 Edif. TR9 Int. 5A/5B,
Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Lote:
Caducidad:
Precio máximo al público:

Reg. No. 026M2016 SSA VI
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en
mystory.mx@haleon.com
Marcas propiedad o licenciadas por Haleon.

PROYECTO DE MARBETE CAJA DISPENSADORA

LOGOS

THERAFLU DAYTIME
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina
Granulado
650 mg/20 mg/10 mg
Oral

Para el alivio de los síntomas de RESFRIADO Y TOS.
Reduce los síntomas de gripa y tos.

Caja con 6, 10, 12, 20 o 50 sobres
Sabor frutos del bosque

Fórmula

Cada sobre contiene:

Paracetamol	650 mg
Bromhidrato de Dextrometorfano	20 mg
Clorhidrato de Fenilefrina	10 mg
Excipientes cbp	1 sobre

Indicación terapéutica: Auxiliar para el alivio temporal de los síntomas del resfriado e influenza, tales como:

- Congestión nasal y de senos paranasales
- Tos causada por irritación menor de garganta y bronquios.
- Dolores menores de garganta y cabeza
- Fiebre
- Cuerpo cortado

Vía de administración: Oral, para solución. Disuélvase previamente en agua caliente.

Dosis y modo de empleo: Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver el contenido de un sobre en una taza con agua caliente pero no hirviendo (aprox. 250 mL). Beber cuando se enfríe a una temperatura aceptable.
Puede repetir un sobre cada 4-6 horas según sea necesario sin exceder de 5 sobres en 24 horas.
No tomar por más de 7 días sin consultar a su médico.
No exceder la dosis establecida.
Usar la dosis más pequeña que necesite para tratar sus síntomas y usar el medicamento por el periodo de tiempo más corto necesario.

Uso en el embarazo y lactancia: No use THERAFLU DAYTIME durante el embarazo o lactancia.
(Incluir logo símbolo del embarazo y lactancia)

Contraindicaciones: No usar si:

- Es alérgico al paracetamol, dextrometorfano, fenilefrina o a cualquiera de los componentes de la fórmula.
- Está tomando o haya tomado inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAOs) en las últimas 2 semanas, los cuales son utilizados para tratar la depresión.
- Tiene una infección en el pecho, empeoramiento del asma o problemas respiratorios severos.

Precauciones y advertencias: Contiene paracetamol. Siempre leer y seguir la etiqueta. No tomar:

- Con cualquier otro medicamento para el alivio de la tos y el resfriado, congestión o nariz tapada.
- Más de la dosis recomendada, ya que puede causar daños serios a su hígado.
- Junto con otros medicamentos que contengan paracetamol, para tratar el dolor, fiebre, síntomas de resfriado o gripe o para inducir el sueño.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Tiene problemas hepáticos o renales.
- Tiene bajo peso o está desnutrido.
- Bebe alcohol regularmente. Es posible que deba evitar el uso de este producto en su totalidad o limitar la cantidad de paracetamol que tome. No consumir bebidas alcohólicas mientras toma este producto.

Consulte a su médico antes de usar si:

- Presenta tos a largo plazo o persistente (como con asma y enfisema) o con demasiada flema.
- Presenta presión sanguínea alta, enfermedad cardíaca o enfermedad de los vasos sanguíneos, tales como el fenómeno de Raynaud (la cual puede aparecer como entumecimiento, hormigueo y cambio de coloración (blanco, azul y después rojo) en los dedos de manos y pies cuando se exponen al frío), diabetes o hipertiroidismo (glándula tiroides hiperactiva).
- Tiene glaucoma (presión excesiva dentro de sus ojos).
- Tiene feocromocitoma (un tumor inusual de las glándulas suprarrenales que se sitúa arriba de los riñones).
- Presenta dificultad para orinar debido al agrandamiento de la glándula prostática.
- Presenta una infección severa, está severamente desnutrido, severamente bajo de peso o es un usuario crónico del alcohol, ya que esto puede aumentar el riesgo de acidosis metabólica.

Los signos de la acidosis metabólica incluyen: respiración profunda, rápida y difícil, tiene náusea o vómito, pérdida del apetito.

Consulte al médico inmediatamente si tiene una combinación de estos síntomas.

No tome este medicamento con ninguno de los siguientes medicamentos:

- Warfarina o medicamentos similares (anticoagulantes), utilizados para diluir la sangre.
- Para controlar su presión sanguínea (beta bloqueadores).
- Para padecimientos cardíacos (digoxina).
- Supresores o estimulantes del apetito.
- Para tratar la depresión, como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos (amitriptilina).
- Para el tratamiento del dolor de cabeza agudo de migraña (ergotamina, metisergida).

Debe informar a su médico acerca de cualquier otro medicamento que esté tomando.

- Ha abusado de drogas u otras sustancias en el pasado.
- Tiene características específicas de metabolismo (metabolizador lento del CYP2D6).

Si el dolor de garganta es severo, persiste por más de 2 días y se acompaña de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos. Si la fiebre dura más de 3 días, si el dolor de cabeza o erupción persiste; estos pueden ser signos de una condición más seria, se debe buscar consejo médico.

No se deje al alcance ni a la vista de los niños.

Este medicamento puede producir somnolencia o mareo y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

Información importante acerca de algunos de los ingredientes en su producto:

Si ha sido advertido por su médico que tiene intolerancia a algunos azúcares, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Contiene 73.8% de azúcar. Esto debe tomarse en consideración si tiene diabetes. Atención fenilcetonúricos, este producto contiene fenilalanina, la cual puede ser perjudicial para personas con fenilcetonuria. Contiene aspartamo.

Este medicamento contiene azul No. 1 y rojo allura que puede producir reacciones alérgicas.

Uso pediátrico: No usar en menores de 12 años.

Reacciones adversas: Al utilizar este producto puede experimentar: dolor de cabeza, mareo, nerviosismo, dificultad para dormir, hipertensión, náusea, vómito y dolor estomacal. Deje de tomar este medicamento y consulte inmediatamente a su médico si experimenta:

- Reacciones alérgicas como erupción cutánea o comezón a veces con problemas respiratorios o hinchazón de cara, labios, lengua o garganta.
- Erupción cutánea o descamación, o úlceras en la boca.
- Sangrado o hematomas inexplicables.
- Confusión, sensación de inquietud, sudoración, agitación, temblores, sacudidas repentinas de los músculos o aumento de la presión sanguínea, ya que pueden ser síntomas de una condición llamada síndrome de la serotonina.
- Ha experimentado anteriormente problemas respiratorios con aspirina o con antiinflamatorios no esteroideos o experimenta una reacción similar con este producto.
- Taquicardia inusual o sensación de ritmo cardíaco inusualmente rápido o irregular
- Pérdida de la visión que puede deberse a una anormal y alta presión sanguínea en los ojos, muy probable que ocurra en pacientes con glaucoma.
- Dificultad al orinar lo cual es más probable que ocurra en hombres con agrandamiento de la glándula prostática.

Estas reacciones son raras. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Ingesta accidental y sobredosis: En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico inmediatamente, incluso si no tiene síntomas debido al riesgo de falla hepática.

Consérvese a no más de 30°C.
No se use si el sobre sellado está rasgado o roto.

Hecho y acondicionado en EUA por:
Haleon US Inc.
10401 HWY 6, Lincoln, NE 68517, EUA.

Para: Haleon Panamá, S.A.
Urbanización Parque Industrial, Calle A y B, Correg.
Juan Díaz, Provincia Panamá, Panamá.

Acondicionador secundario:
DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km 34.5
Nave 6 Int. 5, Col. San Isidro, C.P. 54740,
Cuautitlán Izcalli, México, México.

PM 09
ABRIL 2026: MAH-PITAYA
Theraflu Daytime
GDS 8.0
Paracetamol, Dextrometorfano, Fenilefrina

HALEON
Haleon Consumer Healthcare México,
S. de R.L. de C.V.
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines No. 3720
Torre 2 Piso 03
Col. Jardines del Pedregal
Alcaldía Alvaro Obregón
C.P. 01900, Ciudad de México

Representante legal, Importado y Distribuido por:
Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Autopista México-Qro. KM 41.5 Edif. TR9 Int. 5A/5B,
Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Lote:
Caducidad:
Precio máximo al público:

Reg. No. 026M2016 SSA VI
Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en
mystory.mx@haleon.com
Marcas propiedad o licenciadas por Haleon.