

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Empaque secundario: Caja de cartón

LOGOS

Voltaren 24 H

Diclofenaco

Parche

30 mg

Logo

Alivia el dolor en el sitio de aplicación*

- Aplícalo 1 vez al día
 - Discreto y ultradelgado**
 - No mancha tus manos ni ropa
 - Práctico tamaño adecuado a tu necesidad
- *La aplicación tópica de diclofenaco alivia el dolor en el sitio de aplicación
**0.5 mm de grosor

Caja con 1, 2, 3, 5, 7 o 10 parches (14 X 10 cm) en sobre metálico laminado individual.

Fórmula/Composición:

Cada parche de 14 X 10 cm contiene:

Diclofenaco sódico.... 30 mg

Excipientes cs..... 1 parche

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

Lea detenidamente esta información.

Indicaciones Terapéuticas:

Auxiliar para el alivio del dolor inflamación e hinchazón en:

Lesiones de tejido blando: trauma de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones, p. ej., debido a esguinces, torceduras, moretones y dolores de espalda;

Formas localizadas de reumatismo de tejidos blandos: tendinitis (p.ej. codo de tenista), bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatía; auxiliar para el alivio del dolor por osteoartritis no grave de la rodilla o dedos.

Vía de Administración: Transdérmica.

Dosis y modo de empleo:

Solo para uso en la piel.

No se use en niños menores de 15 años de edad.

Aplicar un parche por día en el área con dolor.

Si necesita utilizar más parches, pregunte a su médico. No los use por más de 14 días para lesiones de tejidos blandos o reumatismos de tejidos blandos, o 21 días para dolor artrítico, a menos que lo recomiende un médico.

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Si la condición no mejora dentro de 7 días, o si empeora, informe a su médico.

Método de aplicación:

Antes del primer uso, el sobre sellado se abre cortando a lo largo de la línea punteada. Se saca un parche y se retira la película de plástico que lo protege. La parte adhesiva del parche no debe tocarse. El parche debe aplicarse inmediatamente después de haber retirado la película plástica en la piel limpia, seca e intacta.

Reacciones secundarias:

Cuando utilice este producto usted puede experimentar:

Erupción cutánea con o sin ampollas, urticaria; sibilancia (hacer silbidos al respirar), dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación del rostro, labios, lengua o garganta; comezón o enrojecimiento de la piel.

La piel podría ser más sensible a la luz del sol (cabina solar o de bronceado). Algunos posibles signos son quemadura de sol con comezón, inflamación y ampollas.

Contraindicaciones:

No lo use si usted: Es alérgico al diclofenaco o a otro fármaco antiinflamatorio no esteroideo utilizado para tratar el dolor, fiebre o inflamación, como ibuprofeno o aspirina, o a cualquier otro ingrediente contenido en este medicamento. Si usted no está seguro, pregunte a su médico.

Los síntomas de una reacción alérgica a estos medicamentos pueden incluir: sibilancias (hacer silbidos al respirar) o dificultad para respirar (asma); erupción cutánea con ampollas o urticaria; inflamación del rostro o lengua; secreción nasal.

Precauciones y advertencias:

No aplique sobre la piel con condiciones como cortaduras, heridas abiertas o sobre la piel que presenta una erupción o eczema. Interrumpa el tratamiento si desarrolla una erupción en la piel después de aplicar el producto.

No use más producto del indicado o durante un periodo de tiempo mayor al tiempo indicado, a menos que lo indique su médico.

No lo use en la boca. No lo ingiera. Lávese las manos después de usarlo. Tenga cuidado de que este medicamento no entre en sus ojos. Si esto ocurre, enjuague bien sus ojos con agua limpia. Vea a su médico o farmacéutico si persisten las molestias.

Una rodillera, codera o envoltura utilizada comúnmente utilizada para lesiones como esguinces puede utilizarse, pero no se utilice bajo vendaje (plásticos) herméticos.

Contiene ésteres de propilenglicol y dibutilhidroxitolueno que pueden causar irritación leve localizada en la piel en algunas personas.

Informe a su médico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento regular de prescripción o de venta libre.

Si usted ingiere este medicamento: Busque atención médica inmediata.

Embarazo y lactancia:

Si usted está embarazada, en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de embarazarse, consulte a su médico antes de usar este medicamento. No utilizar durante los últimos 3 meses del embarazo, ya que puede dañar a su hijo no nacido o causar problemas en el parto. **(Logo símbolo Mujer Embarazada).**

Léase instructivo impreso al reverso de la caja.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Consérvese a no más de 25°C.

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Consérvese la caja bien cerrada.
Protéjase de la luz.

Hecho y acondicionado en Japón por:

Dojin Iyaku-Kako Co. Ltd., Fukushima Plant
8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-Machi, Fukushima-Shi, Fukushima 960-0101
Japón.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km. 34.5 Nave 6 Int. 5,
Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Autopista México-Qro. KM41.5 Edif. TR9, Int. 5B,
Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Representante legal, distribuidor e importador:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos, México.

Reg. No. 031M2006 SSA VI

Lot:

Cad:

Fab:

Precio máximo al público:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en
mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx



800 234 3000

mystory.mx@haleon.com

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Empaque primario: Sobre Metálico Laminado

LOGOS

Voltaren 24 H

Diclofenaco

Parche

30 mg

Logo

Alivia el dolor en el sitio de aplicación*

- Aplícalo 1 vez al día
- Discreto y ultradelgado**
- No mancha tus manos ni ropa
- Práctico tamaño adecuado a tu necesidad

*La aplicación tópica de diclofenaco alivia el dolor en el sitio de aplicación

**0.5 mm de grosor

Sobre metálico laminado individual con 1, 2, 3, 5, 7 ó 10 parches (14 X 10 cm)

Fórmula/Composición

Cada parche de 14 X 10 cm contiene:

Diclofenaco sódico.... 30 mg

Excipientes cs..... 1 parche

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

Lea detenidamente esta información.

Indicaciones terapéuticas:

Auxiliar para el alivio del dolor inflamación e hinchazón en:

Lesiones de tejido blando: trauma de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones, p. ej., debido a esguinces, torceduras, moretones y dolores de espalda;

• Formas localizadas de reumatismo de tejidos blandos: tendinitis (p.ej. codo de tenista), bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatía; auxiliar para el alivio del dolor por osteoartritis no grave de la rodilla o dedos.

Vía de administración: Transdérmica.

Dosis y modo de empleo:

Solo para uso en la piel.

No se use en niños menores de 15 años de edad.

Aplicar un parche por día en el área con dolor.

Si necesita utilizar más parches, pregunte a su médico. No los use por más de 14 días para lesiones de tejidos blandos o reumatismos de tejidos blandos, o 21 días para dolor artrítico, a menos que lo recomiende un médico.

Si la condición no mejora dentro de 7 días, o si empeora, informe a su médico.

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Método de aplicación:

Antes del primer uso, el sobre sellado se abre cortando a lo largo de la línea punteada. Se saca un parche y se retira la película de plástico que lo protege. La parte adhesiva del parche no debe tocarse. El parche debe aplicarse inmediatamente después de haber retirado la película plástica en la piel limpia, seca e intacta

Precauciones y advertencias:

No aplique sobre la piel con condiciones como cortaduras, heridas abiertas o sobre la piel que presenta una erupción o eczema. Interrumpa el tratamiento si desarrolla una erupción en la piel después de aplicar el producto.

No use más producto del indicado o durante un periodo de tiempo mayor al tiempo indicado, a menos que lo indique su médico.

No lo use en la boca. No lo ingiera. Lávese las manos después de usarlo. Tenga cuidado de que este medicamento no entre en sus ojos. Si esto ocurre, enjuague bien sus ojos con agua limpia. Vea a su médico o farmacéutico si persisten las molestias.

Una rodillera, codera o envoltura utilizada comúnmente utilizada para lesiones como esguinces puede utilizarse, pero no se utilice bajo vendaje (plásticos) herméticos.

Contiene ésteres de propilenglicol y dibutilhidroxitolueno que pueden causar irritación leve localizada en la piel en algunas personas.

Informe a su médico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento regular de prescripción o de venta libre.

Si usted ingiere este medicamento: Busque atención médica inmediata.

Embarazo y lactancia:

Si usted está embarazada, en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de embarazarse, consulte a su médico antes de usar este medicamento. No utilizar durante los últimos 3 meses del embarazo, ya que puede dañar a su hijo no nacido o causar problemas en el parto. **(Logo símbolo Mujer Embarazada).**

Léase instructivo impreso al reverso de la caja.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Consérvese a no más de 25°C.

Consérvese la caja bien cerrada.

Protéjase de la luz.

Hecho y acondicionado en Japón por:

Dojin Iyaku-Kako Co. Ltd., Fukushima Plant

8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-Machi, Fukushima-Shi, Fukushima 960-0101
Japón.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.

Autopista México Querétaro Km. 34.5 Nave 6 Int. 5,

Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Autopista México-Qro. KM41.5 Edif. TR9, Int. 5B,

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Representante legal, distribuidor e importador:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos, México.

Reg. No. 031M2006 SSA VI

Lot:

Cad:

Fab:

Precio máximo al público:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx



800 234 3000

mystory.mx@haleon.com

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Empaque secundario: Caja Dispensadora

LOGOS

Voltaren 24 H

Diclofenaco

Parche

30 mg

Logo

Alivia el dolor en el sitio de aplicación*

- Aplícalo 1 vez al día
 - Discreto y ultradelgado**
 - No mancha tus manos ni ropa
 - Práctico tamaño adecuado a tu necesidad
- *La aplicación tópica de diclofenaco alivia el dolor en el sitio de aplicación
**0.5 mm de grosor

Caja dispensadora con 10, 20, 30 ó 50 sobres individuales conteniendo 1, 2, 3, 5, 7 ó 10 parches (14 X 10 cm).

Fórmula/Composición:

Cada parche de 14 X 10 cm contiene:

Diclofenaco sódico.... 30 mg

Excipientes cs..... 1 parche

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

Lea detenidamente esta información.

Indicaciones terapéuticas:

Auxiliar para el alivio del dolor inflamación e hinchazón en:

Lesiones de tejido blando: trauma de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones, p. ej., debido a esguinces, torceduras, moretones y dolores de espalda;

Formas localizadas de reumatismo de tejidos blandos: tendinitis (p.ej. codo de tenista), bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatía; auxiliar para el alivio del dolor por osteoartritis no grave de la rodilla o dedos.

Vía de administración: Transdérmica.

Dosis y modo de empleo:

Solo para uso en la piel.

No se use en niños menores de 15 años de edad.

Aplicar un parche por día en el área con dolor.

Si necesita utilizar más parches, pregunte a su médico. No los use por más de 14 días para lesiones de tejidos blandos o reumatismos de tejidos blandos, o 21 días para dolor artrítico, a menos que lo recomiende un médico.

Si la condición no mejora dentro de 7 días, o si empeora, informe a su médico.

Método de aplicación:

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Antes del primer uso, el sobre sellado se abre cortando a lo largo de la línea punteada. Se saca un parche y se retira la película de plástico que lo protege. La parte adhesiva del parche no debe tocarse. El parche debe aplicarse inmediatamente después de haber retirado la película plástica en la piel limpia, seca e intacta.

Reacciones secundarias:

Cuando utilice este producto usted puede experimentar:

Erupción cutánea con o sin ampollas, urticaria; sibilancia (hacer silbidos al respirar), dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación del rostro, labios, lengua o garganta; comezón o enrojecimiento de la piel.

La piel podría ser más sensible a la luz del sol (cabina solar o de bronceado). Algunos posibles signos son quemadura de sol con comezón, inflamación y ampollas.

Contraindicaciones:

No lo use si usted: Es alérgico al diclofenaco o a otro fármaco antiinflamatorio no esteroideo utilizado para tratar el dolor, fiebre o inflamación, como ibuprofeno o aspirina, o a cualquier otro ingrediente contenido en este medicamento. Si usted no está seguro, pregunte a su médico.

Los síntomas de una reacción alérgica a estos medicamentos pueden incluir: sibilancias (hacer silbidos al respirar) o dificultad para respirar (asma); erupción cutánea con ampollas o urticaria; inflamación del rostro o lengua; secreción nasal.

Precauciones y advertencias:

No aplique sobre la piel con condiciones como cortaduras, heridas abiertas o sobre la piel que presenta una erupción o eczema. Interrumpa el tratamiento si desarrolla una erupción en la piel después de aplicar el producto.

No use más producto del indicado o durante un periodo de tiempo mayor al tiempo indicado, a menos que lo indique su médico.

No lo use en la boca. No lo ingiera. Lávese las manos después de usarlo. Tenga cuidado de que este medicamento no entre en sus ojos. Si esto ocurre, enjuague bien sus ojos con agua limpia. Vea a su médico o farmacéutico si persisten las molestias.

Una rodillera, codera o envoltura utilizada comúnmente utilizada para lesiones como esguinces puede utilizarse, pero no se utilice bajo vendaje (plásticos) herméticos.

Contiene ésteres de propilenglicol y dibutilhidroxitolueno que pueden causar irritación leve localizada en la piel en algunas personas.

Informe a su médico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento regular de prescripción o de venta libre.

Si usted ingiere este medicamento: Busque atención médica inmediata.

Embarazo y lactancia:

Si usted está embarazada, en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de embarazarse, consulte a su médico antes de usar este medicamento. No utilizar durante los últimos 3 meses del embarazo, ya que puede dañar a su hijo no nacido o causar problemas en el parto. **(Logo símbolo Mujer Embarazada).**

Léase instructivo impreso al reverso de la caja.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Consérvese a no más de 25°C.

Consérvese la caja bien cerrada.

Protéjase de la luz.

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Hecho y acondicionado en Japón por:

Dojin Iyaku-Kako Co. Ltd., Fukushima Plant
8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-Machi, Fukushima-Shi, Fukushima 960-0101
Japón.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.
Autopista México Querétaro Km. 34.5 Nave 6 Int. 5,
Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Autopista México-Qro. KM41.5 Edif. TR9, Int. 5B,
Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Representante legal, distribuidor e importador:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.
Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos, México.

Reg. No. 031M2006 SSA VI

Lot:

Cad:

Fab:

Precio máximo al público:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en
mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx



800 234 3000

mystory.mx@haleon.com

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Empaque primario: Sobre Metálico Laminado

LOGOS

Voltaren 24 H

Diclofenaco

Parche

30 mg

Logo

Alivia el dolor en el sitio de aplicación*

- Aplícalo 1 vez al día
- Discreto y ultradelgado**
- No mancha tus manos ni ropa
- Práctico tamaño adecuado a tu necesidad

*La aplicación tópica de diclofenaco alivia el dolor en el sitio de aplicación

**0.5 mm de grosor

Sobre metálico laminado individual con 1, 2, 3, 5, 7 ó 10 parches (14 X 10 cm)

Fórmula/Composición

Cada parche de 14 X 10 cm contiene:

Diclofenaco sódico.... 30 mg

Excipientes cs..... 1 parche

INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

Lea detenidamente esta información.

Indicaciones terapéuticas:

Auxiliar para el alivio del dolor inflamación e hinchazón en:

Lesiones de tejido blando: trauma de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones, p. ej., debido a esguinces, torceduras, moretones y dolores de espalda;

• Formas localizadas de reumatismo de tejidos blandos: tendinitis (p.ej. codo de tenista), bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatía; auxiliar para el alivio del dolor por osteoartritis no grave de la rodilla o dedos.

Vía de administración: Transdérmica.

Dosis y modo de empleo:

Solo para uso en la piel.

No se use en niños menores de 15 años de edad.

Aplicar un parche por día en el área con dolor.

Si necesita utilizar más parches, pregunte a su médico. No los use por más de 14 días para lesiones de tejidos blandos o reumatismos de tejidos blandos, o 21 días para dolor artrítico, a menos que lo recomiende un médico.

Si la condición no mejora dentro de 7 días, o si empeora, informe a su médico.

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Método de aplicación:

Antes del primer uso, el sobre sellado se abre cortando a lo largo de la línea punteada. Se saca un parche y se retira la película de plástico que lo protege. La parte adhesiva del parche no debe tocarse. El parche debe aplicarse inmediatamente después de haber retirado la película plástica en la piel limpia, seca e intacta

Precauciones y advertencias:

No aplique sobre la piel con condiciones como cortaduras, heridas abiertas o sobre la piel que presenta una erupción o eczema. Interrumpa el tratamiento si desarrolla una erupción en la piel después de aplicar el producto.

No use más producto del indicado o durante un periodo de tiempo mayor al tiempo indicado, a menos que lo indique su médico.

No lo use en la boca. No lo ingiera. Lávese las manos después de usarlo. Tenga cuidado de que este medicamento no entre en sus ojos. Si esto ocurre, enjuague bien sus ojos con agua limpia. Vea a su médico o farmacéutico si persisten las molestias.

Una rodillera, codera o envoltura utilizada comúnmente utilizada para lesiones como esguinces puede utilizarse, pero no se utilice bajo vendaje (plásticos) herméticos.

Contiene ésteres de propilenglicol y dibutilhidroxitolueno que pueden causar irritación leve localizada en la piel en algunas personas.

Informe a su médico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento regular de prescripción o de venta libre.

Si usted ingiere este medicamento: Busque atención médica inmediata.

Embarazo y lactancia:

Si usted está embarazada, en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de embarazarse, consulte a su médico antes de usar este medicamento. No utilizar durante los últimos 3 meses del embarazo, ya que puede dañar a su hijo no nacido o causar problemas en el parto. **(Logo símbolo Mujer Embarazada).**

Léase instructivo impreso al reverso de la caja.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Consérvese a no más de 25°C.

Consérvese la caja bien cerrada.

Protéjase de la luz.

Hecho y acondicionado en Japón por:

Dojin Iyaku-Kako Co. Ltd., Fukushima Plant

8-1, Higashi Nakakawara, Senoue-Machi, Fukushima-Shi, Fukushima 960-0101

Japón.

Acondicionador secundario alterno:

DHL Metropolitan Logistics SC México, S.A. de C.V.

Autopista México Querétaro Km. 34.5 Nave 6 Int. 5,

Col. San Isidro, C.P. 54740, Cuautitlán Izcalli, México, México.

Almacenado por:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Autopista México-Qro. KM41.5 Edif. TR9, Int. 5B,

Col. Ex Hacienda San Miguel, C.P. 54715, Cuautitlán Izcalli, México, México.

PROYECTO DE MARBETE VENTA AL PÚBLICO

Representante legal, distribuidor e importador:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Calle 21-E No. 104, CIVAC, C.P. 62578, Jiutepec, Morelos, México.

Reg. No. 031M2006 SSA VI

Lot:

Cad:

Fab:

Precio máximo al público:

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx



800 234 3000

mystory.mx@haleon.com

INSTRUCTIVO IMPRESO AL REVERSO DE LA CAJA

LOGOS

Voltaren 24 H

Diclofenaco sódico 1%

Parche transdérmico

Los parches de Voltaren 24 H, vienen en dos tamaños 7X10 cm adecuado a tus necesidades y 14 X10 cm para mayor cobertura de la zona afectada.

Lea detenidamente este inserto antes de utilizar Voltaren 24 H Parche transdérmico. Consérvelo por si necesita volver a leerlo. Consulte a su profesional de la salud si tiene alguna duda.

1. ¿Qué contiene Voltaren 24 H?

Cada parche de Voltaren 24 H contiene diclofenaco sódico al 1%

El parche transdérmico también contiene los siguientes componentes inactivos: Levomentol, N-metil-2-pirrolidona, ésteres de propilenglicol de ácidos grasos, ácido cítrico anhidro, copolímero en bloque del estireno-isopreno-estireno, poliisobutileno, goma éster, 2-mercaptobencimidazol, dibutilhidroxitolueno, parafina líquida.

PROPIEDADES/ INDICACIONES

2. ¿Para qué sirve Voltaren 24 H?

Voltaren 24 H ayuda a aliviar el dolor, inflamación e hinchazón en lesiones de tejido blando: trauma de tendones, ligamentos, músculos y articulaciones debido a torceduras, esguinces, moretones y dolores de espalda.

Formas localizadas de reumatismo en tejidos blandos como tendinitis (ej. codo de tenista), bursitis, síndrome hombro-mano y periartropatía.

Auxiliar para el alivio del dolor por osteoartritis de la rodilla o dedos.

DOSIS/ MODO DE EMPLEO

3. ¿Cómo debe ser usado Voltaren 24 H?

Solo para uso en la piel.

No se use en niños menores de 15 años de edad.

Aplique un parche de Voltaren 24 H por día en el área con dolor.

Si necesita utilizar más parches, pregunte a su médico. No los use por más de 14 días para lesiones de tejidos blandos o reumatismos de tejidos blandos, o 21 días para dolor artrítico, a menos que lo recomiende un médico.

Método de aplicación: Antes del primer uso, el sobre sellado se abre cortando a lo largo de la línea punteada. Se saca un parche y se retira la película de plástico que lo protege. La parte adhesiva del parche no debe tocarse. El parche debe aplicarse inmediatamente después de haber retirado la película plástica.

Si la condición no mejora dentro de 7 días o empeora, informe a su médico.

CONTRAINDICACIONES

4. ¿Cuándo no debe usarse Voltaren 24 H?

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Si es hipersensible al diclofenaco o a cualquiera de los excipientes contenidos enumerados en la sección "¿Qué contiene Voltaren 24 H?".

Si ha tenido alguna vez una reacción alérgica o ataque asmático después de utilizar diclofenaco o cualquier otro antiinflamatorio/analgésico como ácido acetilsalicílico o ibuprofeno.

5. ¿Qué precauciones deben tomarse cuando se usa Voltaren 24 H?

No aplique sobre la piel con condiciones como cortaduras, heridas abiertas o sobre la piel que presenta una erupción o eczema. Interrumpa el tratamiento si desarrolla una erupción en la piel después de aplicar el producto.

No use más producto del indicado o durante un periodo de tiempo mayor al tiempo indicado, a menos que lo indique su médico.

No lo use en la boca. No lo ingiera. Lávese las manos después de usarlo. Tenga cuidado de que este medicamento no entre en sus ojos. Si esto ocurre, enjuague bien sus ojos con agua limpia. Vea a su médico o farmacéutico si persisten las molestias.

Una rodillera, codera o envoltura utilizada comúnmente utilizada para lesiones como esquinces puede utilizarse, pero no se utilice bajo vendaje (plásticos) herméticos.

Contiene ésteres de propilenglicol y dibutilhidroxitolueno que pueden causar irritación leve localizada en la piel en algunas personas.

EMBARAZO/ LACTANCIA

6. ¿Puede ser utilizado Voltaren 24 H durante el embarazo o el periodo de lactancia?

Si usted está embarazada, en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de embarazarse, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

No use si está en los últimos 3 meses del embarazo, ya que puede dañar a su hijo no nacido o causar problemas en el parto. (Logosímbolo Mujer Embarazada).

USO PEDIÁTRICO/ NIÑOS

7. ¿Puede ser usado Voltaren 24 H en los niños?

No se use en niños menores de 15 años de edad

PERSONAS DE EDAD AVANZADA

8. ¿Puede ser usado Voltaren 24 H en las personas de edad avanzada?

Voltaren 24 H puede ser utilizado en pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años). Se puede utilizar la dosis usual para adultos.

REACCIONES SECUNDARIAS

9. ¿Qué reacciones secundarias puede causar Voltaren 24 H?

Cuando utilice este producto usted puede experimentar:

Erupción cutánea con o sin ampollas, urticaria; sibilancia (hacer silbidos al respirar), dificultad para respirar o sensación de opresión en el pecho (asma); inflamación del rostro, labios, lengua o garganta; comezón o enrojecimiento de la piel.

La piel podría ser más sensible a la luz del sol (cabina solar o de bronceado). Algunos posibles signos son quemaduras de sol con comezón, inflamación y ampollas.

INTERACCIONES

10. ¿Está tomando otros medicamentos?

Informe a su médico antes de usar si está tomando, o ha tomado recientemente, cualquier medicamento regular de prescripción o de venta libre.

Si usted ingiere este medicamento: Busque atención médica inmediata.

COMENTARIOS ESPECIALES

11. ¿Cómo debe almacenar Voltaren 24 H?

- Consérvese a no más de 25°C.
- Almacene los parches en el empaque original, para protegerlos de la luz y humedad.

- No utilice el producto después de la fecha de caducidad que se indica en el empaque.

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Representante Legal:

Haleon Consumer Healthcare México, S. de R.L. de C.V.

Reg. No. 031M2006 SSA VI

Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono 800 234 3000 o en mystory.mx@haleon.com

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx



800 234 3000

mystory.mx@haleon.com