

ANTIGRIPAL NF

Panadol

6200000212890

**Cuando use este producto podría experimentar reacciones adversas:** seris en la piel, **mayor poca camesa:** con síntomas que incluyen prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel. **de mayor frecuencia** como ligera somnolencia, mareos, debilidad muscular, dificultad del movimiento, de la cara, torpeza, temblores, alteración en las sensaciones, del gusto y olfato, hormigueo, sequedad (boca, nariz y garganta), pérdida de apetito, molestias gastrointestinales (pueden disminuir si se toma con alimentos), náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, retención urinaria, espesamiento de las mucosidades, sudoración, visión borrosa u otros trastornos de la visión, **ojos:** como malestar, hipersensibilidad, aumento de los niveles de transaminasa en sangre, iriditis de mocoarcho, eritema vespertil, edema conjuntival, hemorragia cerebral (a dosis altas en pacientes sensibles), excitación menéica (a dosis altas, más frecuente en ancianos y niños, puede incluir inquietud, irritación, nerviosismo e incluso convulsiones), tensión en el pecho, ruidos pulmonares, latidos del corazón rápidos o irregulares (con sobredosis), trastornos hepáticos (pueden ocurrir dolor de estómago, náuseas, vómitos u otros síntomas), reacción alérgica, reacciones de hipersensibilidad graves (tos, dificultad para tragar, latidos rápidos, hinchazón de paladar o alrededor de la boca, cara hinchada, dificultad respiratoria), fotosensibilidad, alergia con medicamentos relacionados con la clorfenamina, alteraciones sanguíneas (leucopenia, leucopenia, anemia aplásica, trombocitopenia con eritema como hemorragia no habitual, dolor de garganta o cansancio), edema, alteraciones en los riñones, impotencia, alteraciones menstruales, **mayor para enfermedad renal:** orina turbia, erupción cutánea, ictericia, neutropenia, anemia hemolítica, hipoglucemia, **de frecuencia desconocida** como ansiedad, irritabilidad, debilidad, hipotensión (a dosis altas y en pacientes sensibles), dolor de cabeza (a dosis altas) y puede ser síntoma de hipertensión), disfunción grave, vasodilatación periférica, reducción del rendimiento del corazón (especialmente en ancianos y pacientes con pobre circulación cerebral o coronaria), posible producción o agravamiento de enfermedad cardíaca, pérdida de peso, erupción, hiperglucemia, destrucción de potasio en sangre, acidosis metabólica (alteración del metabolismo), frío en piernas o brazos, rubor, sensación de desmayo, **a dosis elevada** como vómitos, palbucciones, espasmo proctico con alteraciones, **con uso prolongado** como disminución del volumen de sangre.

**Si toma más medicamento del que debería:** consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, incluso si no tiene ningún síntoma, debido a que puede causar serios problemas de salud. **Advertencia de sobredosis:** acóctate. Verifique siempre los componentes de los medicamentos que recibe, su desconocimiento podría ocasionar un consumo de paracetamol superior a la dosis diaria máxima recomendada (3 gramos), generando daño a nivel hepático. Se debe suspender su uso y preparar al médico y/o farmacéutico si se presentan náuseas u vómitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el hondo hepático.

Almacenar a temperatura no mayor de 30°C. Venta sin receta médica. Marca registrada con propiedad o licenciada por grupo de compañías HALEON. ©2024 grupo de compañías HALEON o sus filiales.

Fabricado por: HALEON PHARMA S.A. - Perú. País: HALEON PERU S.A., Av. Jorge Basadre 247, oficina 05W09, San Isidro 15075, Perú. RUC: 2067649937. S. Y. E. 05/2024

Panadol

ANTIGRIPAL NF

Paracetamol 500mg + Clorhidrato de fenilefrina 5mg + Maleato de clorfenamina 2mg

104 Tabletas

HALEON

Cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 5 mg, maleato de clorfenamina 2 mg, excipientes c.a.

**Para qué está indicado:** Alivia temporalmente los síntomas del resfriado común y la gripa: congestión nasal, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, dolores y molestias menores, estornudos y fiebre.

**Como tomar:** vía oral. Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 1 tableta cada 6 h, según sea necesario, **máximo 4 tabletas en 24 h.** No tome más de la dosis indicada. No tome por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico. **Se debe utilizar la menor dosis efectiva para aliviar los síntomas y por el tiempo más corto.** Las personas con edad avanzada son más propensas a efectos adversos, no deben usar el producto sin consultar al médico. **No recomendado en menores de 12 años.**

**No tome si es alérgico al paracetamol, fenilefrina, clorfenamina, excipientes, está embarazada o en lactancia tiene enfermedad hepática o renal grave, hipertensión, diabetes, glaucoma, hipertensión, enfermedad vascular o cardíaca grave, trastornos de la conducción eléctrica, taquicardia, infarto de miocardio o síndrome de QT largo, para la depresión o enfermedad de Parkinson.**

**No usar con otros productos que contengan paracetamol o con alcohol:** puede causar daño hepático. **No exceder de 3 g de paracetamol en 24 h. Alcohólicos crónicos:** No exceder de 2 g de paracetamol en 24 h (2 tabletas). **Consulte a su médico antes de usar si tiene enfermedad hepática, renal, cardíaca, pulmonar o si toma:** fenilacetilamina, ácido acetilsalicílico, antidiabéticos o al efecto sedante de medicamento; no va a realizar análisis clínicos (puede alterar los resultados). **Cuando use este producto:** no conduzca el manejo maquinaria si tiene somnolencia, consulte a su médico si el dolor dura más de 3 días, si fiebre con más de 3 días, si dolor o fiebre empeoran o aparecen nuevos síntomas, consulte a su médico inmediatamente si el dolor de garganta es grave durante más de 2 días y es seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos.

**Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.**

**Adelante de tomar este producto consulte a su médico si:** **farmacológico o toma otros medicamentos, particularmente:** antiepilépticos (fenitoina, fenitoina, otras hidantoínas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamazepina), antibióticos (clonazepam, clonazepam, rifampicina), anticonvulsivos y antiespásticos (barbitúricos, hipnóticos, sedantes), antipsicóticos orales (haloperidol, haloperidol), diuréticos del asa (del grupo furosemida) u otros diuréticos que producen pérdida de potasio (diuréticos para hipertensión u otros bloqueantes de la beta-adrenergica como labetalol y carvedilol (para el corazón o enfermedades arteriales), antipsicóticos tricíclicos y tetracíclicos, antidiabéticos orales, antihipertensivos, glucocorticoides sintéticos, hormonas tiroideas, depresores del SNC, quinolonas o ampicilina), ototóxicos, fotosensibilizantes, medicamentos para dormir, náuseas y vómitos (metoclopramida, domperidona), glicina (propofol y sufentanil), hipertensión y anemia: cardiacos (digoxina), disminución de colesterol en sangre (colestiramina), hipertrofia prostática, asma bronquial, hipotensión, hipertensión, osteoporosis, paracetamol, vómitos estomacales, obstrucción piloro-duodenal, migraña, el parto, enfermedades cardíacas o digestivas (síndrome de Zollinger-Ellison).

Panadol

ANTIGRIPAL NF

Paracetamol 500mg + Clorhidrato de fenilefrina 5mg + Maleato de clorfenamina 2mg

104 Tabletas

HALEON

Cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 5 mg, maleato de clorfenamina 2 mg, excipientes c.a.

**Para qué está indicado:** Alivia temporalmente los síntomas del resfriado común y la gripa: congestión nasal, dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta, dolores y molestias menores, estornudos y fiebre.

**Como tomar:** vía oral. Adultos y adolescentes mayores de 12 años: 1 tableta cada 6 h, según sea necesario, **máximo 4 tabletas en 24 h.** No tome más de la dosis indicada. No tome por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico. **Se debe utilizar la menor dosis efectiva para aliviar los síntomas y por el tiempo más corto.** Las personas con edad avanzada son más propensas a efectos adversos, no deben usar el producto sin consultar al médico. **No recomendado en menores de 12 años.**

**No tome si es alérgico al paracetamol, fenilefrina, clorfenamina, excipientes, está embarazada o en lactancia tiene enfermedad hepática o renal grave, hipertensión, diabetes, glaucoma, hipertensión, enfermedad vascular o cardíaca grave, trastornos de la conducción eléctrica, taquicardia, infarto de miocardio o síndrome de QT largo, para la depresión o enfermedad de Parkinson.**

**No usar con otros productos que contengan paracetamol o con alcohol:** puede causar daño hepático. **No exceder de 3 g de paracetamol en 24 h. Alcohólicos crónicos:** No exceder de 2 g de paracetamol en 24 h (2 tabletas). **Consulte a su médico antes de usar si tiene enfermedad hepática, renal, cardíaca, pulmonar o si toma:** fenilacetilamina, ácido acetilsalicílico, antidiabéticos o al efecto sedante de medicamento; no va a realizar análisis clínicos (puede alterar los resultados). **Cuando use este producto:** no conduzca el manejo maquinaria si tiene somnolencia, consulte a su médico si el dolor dura más de 3 días, si fiebre con más de 3 días, si dolor o fiebre empeoran o aparecen nuevos síntomas, consulte a su médico inmediatamente si el dolor de garganta es grave durante más de 2 días y es seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupción cutánea, náuseas o vómitos.

**Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.**

**Adelante de tomar este producto consulte a su médico si:** **farmacológico o toma otros medicamentos, particularmente:** antiepilépticos (fenitoina, fenitoina, otras hidantoínas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamazepina), antibióticos (clonazepam, clonazepam, rifampicina), anticonvulsivos y antiespásticos (barbitúricos, hipnóticos, sedantes), antipsicóticos orales (haloperidol, haloperidol), diuréticos del asa (del grupo furosemida) u otros diuréticos que producen pérdida de potasio (diuréticos para hipertensión u otros bloqueantes de la beta-adrenergica como labetalol y carvedilol (para el corazón o enfermedades arteriales), antipsicóticos tricíclicos y tetracíclicos, antidiabéticos orales, antihipertensivos, glucocorticoides sintéticos, hormonas tiroideas, depresores del SNC, quinolonas o ampicilina), ototóxicos, fotosensibilizantes, medicamentos para dormir, náuseas y vómitos (metoclopramida, domperidona), glicina (propofol y sufentanil), hipertensión y anemia: cardiacos (digoxina), disminución de colesterol en sangre (colestiramina), hipertrofia prostática, asma bronquial, hipotensión, hipertensión, osteoporosis, paracetamol, vómitos estomacales, obstrucción piloro-duodenal, migraña, el parto, enfermedades cardíacas o digestivas (síndrome de Zollinger-Ellison).



Letra W:

Exp.: