Cuando use este producto podría experimentar reacciones adversas: serias en la piel: ***muy poco comunes***: con síntomas que incluyen: prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel; ***de mayor frecuencia*** como: ligera somnolencia, mareos, debilidad muscular, dificultad en movimientos de la cara, torpeza, temblores, alteración en las sensaciones del gusto y olfato, hormigueo, sequedad (boca, nariz y garganta), pérdida de apetito, molestias gastrointestinales (pueden disminuir si se toma con alimentos), nauseas, vomitos, diarrea, estreñimiento, dolor de estómago, retención urinaria, espesamiento de las mucosidades, sudoración, visión borrosa u otros trastornos de la visión; ***raras*** como: malestar, hipotensión, aumento de los niveles de transaminasas en sangre, infarto de miocardio, arritmia ventricular, edema pulmonar, hemorragia cerebral (a dosis altas o en pacientes sensibles), excitación nerviosa (a dosis altas, más frecuente en ancianos y niños, puede incluir inquietud, insomnio, nerviosismo e incluso convulsiones), tensión en el pecho, ruidos pulmonares, latidos del corazón rápidos o irregulares (con sobredosis), trastornos hepáticos (puede ocurrir dolor de estómago, orina oscura u otros síntomas), reacción alérgica, reacciones de hipersensibilidad graves (tos, dificultad para tragar, latidos rápidos, picor, hinchazón de párpados o alrededor de los ojos, cara, lengua, dificultad respiratoria), fotosensibilidad, alergia con medicamentos relacionados con la clorfenamina, alteraciones sanguíneas (agranulocitosis, leucopenia, anemia aplásica, trombocitopenia, con síntomas como hemorragia no habitual, dolor de garganta o cansancio), edema, alteraciones en los oídos, impotencia, alteraciones menstruales; ***muy raras*** como: enfermedad renal, orina turbia, erupción cutánea, ictericia, neutropenia, anemia hemolítica, hipoglucemia; ***de frecuencia desconocida*** como: ansiedad, irritabilidad, debilidad, hipertensión (a dosis altas y en pacientes sensibles), dolor de cabeza (a dosis altas y puede ser síntoma de hipertensión), bradicardia grave, vasoconstricción periférica, reducción del rendimiento del corazón (especialmente en ancianos y pacientes con pobre circulación cerebral o coronaria), posible producción o agravamiento de enfermedad cardiaca, palidez, vello erizado, hiperglucemia, disminución de potasio en sangre, acidosis metabólica (alteración del metabolismo), frío en piernas o brazos, rubor, sensación de desmayo; ***a dosis elevadas*** como: vómitos, palpitaciones, estados psicóticos con alucinaciones; ***con uso prolongado*** como: disminución del volumen de sangre.
Si toma más medicamento del que debería: consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico, incluso si no tiene ningún síntoma, debido a que puede causar serios problemas de salud. ***Advertencia de sobredosis accidental:*** Verifique siempre los componentes de los medicamentos que recibe; su desconocimiento podría ocasionar un consumo de paracetamol superior a la dosis diaria máxima recomendada (3 gramos), generando daño a nivel hepático. Se debe suspender su uso y preguntar al médico y/o farmacéutico si se presentan nauseas y vómitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático.
Almacénese a temperatura no mayor de 30°C. Venta sin receta médica. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2024 grupo de compañías Haleon o licenciante.
Fabricado por: Haleon Panamá S.A. - Panamá. **Para: HALEON PERU S.R.L.,** Av. Jorge Basadre 547, oficina 05W109, San Isidro 15073, Peru. RUC 20607649937. R.S. N° EE-0529.

0-800-51-475
mystory.pe@haleon.com
www.panadol.com.pe
facebook.com/panadolperu