

## ROTULADO MEDIATO: Caja

[Logo Hialeon]

### Panadol

#### Efervescente

Analgésico-Antipirético

Paracetamol 500 mg

24 tabletas efervescentes

Alivio rápido y efectivo

Alivia la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor de espalda

Rápida absorción

No irrita el estómago

**Panadol Efervescente** no irrita su estómago. Brinda rápido y efectivo alivio por su rápida absorción

#### [FÓRMULA O INGREDIENTES]

Cada tableta efervescente contiene: paracetamol 500 mg, excipientes c.s.

#### [INDICACIONES]

**Para qué está indicado:** para el alivio de la fiebre, dolor de cabeza, dolor de cabeza por tensión, migraña, dolor de espalda, dolor reumático y muscular, dolor dental y dolor menstrual. También alivia el dolor de garganta, molestias y dolores del resfrío y la gripe.

#### [DOSIS O MODO DE USO]

**Cómo tomar:** **Mayores de 16 años**, 1 a 2 tabletas disueltas en agua cada 4 a 6 horas, según sea necesario, sin exceder de 8 tabletas en 24 horas. **Niños de 10 a 15 años**, 1 tableta disuelta en agua cada 4 a 6 horas, según sea necesario, sin exceder de 4 tabletas en 24 horas, ni por más de 3 días a menos que lo indique el médico. **Solo para administración oral. Siempre tome la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto.** No tome por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico o por más de 7 días. **No tome más de la dosis recomendada** ni con más frecuencia que cada 4 horas. **No recomendado en menores de 10 años.**

#### [ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES]

**CONTIENE PARACETAMOL:** no tome más de lo indicado, puede causar grave daño hepático y renal.

**SIEMPRE LEA Y SIGA LO INDICADO EN ESTE ENVASE.**

**Consulte a su médico antes de usar si:** está embarazada; está en una dieta baja en sodio (contiene 427 mg de sodio por tableta); es intolerante a algunos azúcares (contiene sorbitol);

tiene afecciones subyacentes, tiene problemas hepáticos o renales, tiene bajo peso o malnutrición, o toma alcohol con regularidad. **Durante el tratamiento informe a su médico inmediatamente si tiene:** enfermedades graves como insuficiencia renal grave o sepsis, malnutrición, alcoholismo crónico o si toma flucloxacilina. Se ha notificado acidosis metabólica en pacientes en estas situaciones cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina, los síntomas pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos.

**Cuando use este producto:** consulte a su médico si sus síntomas continúan o su dolor de cabeza se vuelve persistente.

**Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.** Puede tomarlo en la lactancia.

### **[INTERACCIONES]**

**Antes de tomar este producto dígame a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, particularmente:** metoclopramida o domperidona (para náuseas o vómitos); colestiramina (para reducir el colesterol en sangre); anticoagulantes (p. ej. warfarina) y necesita tomar analgésicos diariamente (consulte con su médico debido al riesgo de sangrado, pero puede tomar dosis ocasionales del producto junto a anticoagulantes); flucloxacilina (antibiótico), debido a un riesgo grave de acidosis metabólica que requiere tratamiento urgente.

### **[CONTRAINDICACIONES]**

**No tome el producto si:** es alérgico al paracetamol o a los excipientes; toma otros medicamentos, con o sin receta médica que contengan paracetamol, para el dolor, fiebre, síntomas del resfrío y la gripe, o para ayudarlo a dormir.

### **[REACCIONES ADVERSAS]**

**Deje de tomar y consulte inmediatamente a su médico si experimenta:** reacciones serias en la piel, muy poco comunes, con síntomas que incluyen prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas, y desprendimiento de la capa superior de la piel; reacciones alérgicas que pueden ser graves como erupción cutánea y picazón, a veces con hinchazón de la boca o cara, o dificultad para respirar; úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables; problemas respiratorios, más probables si los ha tenido al tomar otros analgésicos como ibuprofeno o aspirina; náuseas, pérdida repentina de peso, pérdida del apetito y coloración amarillenta de los ojos y la piel. **De frecuencia desconocida:** acidosis metabólica en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol.

### **[SOBREDOSIS]**

**Si toma más medicamento del que debería:** consulte inmediatamente a su médico, incluso si se siente bien, debido al riesgo retardado de daño hepático grave.

### **[INFORMACIÓN ADICIONAL]**

Conservar a una temperatura no mayor de 30°C. Venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos.

Venta sin receta médica en establecimientos comerciales (Aplica solo para presentaciones comerciales x 8, 16 tabletas efervescentes)

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.

**[FABRICANTE Y TITULAR]**

**Fabricado por:** Haleon Ireland Dungarvan Limited - Irlanda. **Importado por:** HALEON PERU S.R.L., Av. Jorge Basadre 347, oficina 05W109, San Isidro 15073, Perú. RUC 20607649937. R.S. N° EE-03123.

**[LEGALES]**

Lote N°:

Exp.:

 0-800-51-475

 [mystory.pe@haleon.com](mailto:mystory.pe@haleon.com)

**Nota:**

La información entre corchetes “[ ]” solo es de guía y referencia, no será transcrito en el texto del diseño final del producto.