DIRECTION OF GRAIN

PHARMA CODE REF. IS: 2461

**Panadol Efervescente** no irrita su estómago. Brinda rápido y efectivo alivio por su rápida absorción.
Cada tableta efervescente contiene: paracetamol 500 mg, excipientes c.s.
**Para qué está indicado:** para el alivio de la fiebre, dolor de cabeza, dolor de cabeza por tensión, migraña, dolor de espalda, dolor reumático y muscular, dolor dental y dolor menstrual. También alivia el dolor de garganta, molestias y dolores del resfrío y la gripe.
**Cómo tomar:** ***Mayores de 16 años,*** 1 a 2 tabletas disueltas en agua cada 4 a 6 horas, según sea necesario, sin exceder de 8 tabletas en 24 horas. ***Niños de 10 a 15 años,*** 1 tableta disuelta en agua cada 4 a 6 horas, según sea necesario, sin exceder de 4 tabletas en 24 horas, ni por más de 3 días a menos que lo indique el médico. **Solo para administración oral. Siempre tome la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto.** No tome por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico o por más de 7 días. **No tome más de la dosis recomendada** ni con más frecuencia que cada 4 horas. **No recomendado en menores de 10 años.**
**No tome el producto si:** es alérgico al paracetamol o a los excipientes; toma otros medicamentos, con o sin receta médica que contengan paracetamol, para el dolor, fiebre, síntomas del resfrío y la gripe, o para ayudarlo a dormir.
**CONTIENE PARACETAMOL:** no tome más de lo indicado, puede causar grave daño hepático y renal.
**SIEMPRE LEA Y SIGA LO INDICADO EN ESTE ENVASE.**
**Consulte a su médico antes de usar si:** está embarazada; está en una dieta baja en sodio (contiene 427 mg de sodio por tableta); es intolerante a algunos azúcares (contiene sorbitol); tiene afecciones subyacentes, tiene problemas hepáticos o renales, tiene bajo peso o malnutrición, o toma alcohol con regularidad. ***Durante el tratamiento informe a su médico inmediatamente si tiene:*** enfermedades graves como insuficiencia renal grave o sepsis, malnutrición, alcoholismo crónico o si toma flucloxacilina. Se ha notificado acidosis metabólica en pacientes en estas situaciones cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina, los síntomas pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos. **Cuando use este producto:** consulte a su médico si sus síntomas continúan o su dolor de cabeza se vuelve persistente. **Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.** Puede tomarlo en la lactancia.

HALEON

Panadol

Efervescente

Analgésico - Antipirético
Paracetamol 500 mg

Alivio rápido y efectivo

Alivia la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor de espalda
Rápida absorción
No irrita el estómago

24 tabletas efervescentes

**Antes de tomar este producto dígale a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, particularmente:** metoclopramida o domperidona (para náuseas o vómitos); colestiramina (para reducir el colesterol en sangre); anticoagulantes (p. ej. warfarina) y necesita tomar analgésicos diariamente (consulte con su médico debido al riesgo de sangrado, pero puede tomar dosis ocasionales del producto junto a anticoagulantes); flucloxacilina (antibiótico), debido a un riesgo grave de acidosis metabólica que requiere tratamiento urgente.
**Deje de tomar y consulte inmediatamente a su médico si experimenta:** reacciones serias en la piel, muy poco comunes, con síntomas que incluyen prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel; reacciones alérgicas que pueden ser graves como erupción cutánea y picazón, a veces con hinchazón de la boca o cara, o dificultad para respirar; úlceras en la boca; hematomas o sangrado inexplicables; problemas respiratorios, más probables si los ha tenido al tomar otros analgésicos como ibuprofeno o aspirina; náuseas, perdida repentina de peso, pérdida del apetito y coloración amarillenta de los ojos y la piel. **De frecuencia desconocida:** acidosis metabólica en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol.
**Si toma más medicamento del que debería:** consulte inmediatamente a su médico, incluso si se siente bien, debido al riesgo retardado de daño hepático grave.
Conservar a una temperatura no mayor de 30°C. Venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos.
Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.
**Fabricado por:** Haleon Ireland Dungarvan Limited - Irlanda. **Importado por: HALEON PERU S.R.L.,** Av. Jorge Basadre 347, oficina 05W109, San Isidro 15073, Perú. RUC 20607649937. R.S. N° EE-03123.

mystory.pe@haleon.com
0-800-51-475

7 759277 000024

62000000223581

HALEON

Panadol

Efervescente

Analgésico - Antipirético
Paracetamol 500 mg

Alivio rápido y efectivo

Alivia la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor de espalda
Rápida absorción
No irrita el estómago

24 tabletas efervescentes

HALEON

Panadol

Efervescente

24 tabletas efervescentes

Lote:

Manf:

Vence:

PHARMA CODE REF. IS: 2461