Panadol
Forte
Paracetamol 500 mg
Cafeína 65 mg
Alivia dolores tan fuertes como la migraña.
Vía oral
16 tabletas
HALEON
Panadol
Forte
16 tabletas
2005104808
Panadol
Forte
16 tabletas
Cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, cafeína 65 mg, excipientes c.s.
Para qué está indicado: Panadol Forte se utiliza para el alivio rápido y eficaz del dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor dental, dolor menstrual, dolor reumático, usar bajar la fiebre. Cuando usted haya sido diagnosticado de migraña o dolor reumático, usar y migraña. También alivia las molestias en refriado, gripe y dolor de garganta. Ayuda a bajo su supervisión médica. Panadol Forte contiene paracetamol que es un analgésico (reduce dolores) y antipirético (baja la temperatura corporal cuando se tiene fiebre) y cafeína que ayuda a la eficacia del paracetamol. Como tomar: Adultos y mayores de 18 años: tomar más de 4 tabletas en peso mínimo a 50kg, alcoholismo crónico, deshidratadas y 1-2 tabletas cada 4-6 horas, según las necesiten, no exceder de 8 tabletas en 24 horas. No desintoxicación crónica. Niños de 12 a 18 años: 1 tableta cada 4-6 horas, según sea necesario, sin exceder de 4 tabletas en 24 horas. Sólo para adolescentes oral. Siempre tome la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto, no tome más de la dosis recomendada ni con más frecuencia que cada 4 horas. No recomendado en menores de 12 años. Contraindicaciones: No tome si product sie es alérgico al paracetamol, cafeína o excipientes, está embarazada o en lactancia, está tomando Bilo. Advertencias y Precauciones: CONTIENE PARACETAMOL. No tome más de lo indicado, puede causar grave daño hepático. No tome con otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol, para el dolor, fiebre, síntomas del resfrío y la gripe o para ayudar bajo peso o desnutrición o tomar alcohol con regularidad, ya que podría ser necesario limitar la dosis de paracetamol de manera parcial o total; tiene deshidratación severa, toma medicamentos que afectan a su hígado, tiene trombocitopenia severa, muy bajo peso o nutrición severa, toma alcohol en exceso y de forma crónica, que pueden aumentar el riesgo de acidosis metabólica (consulte inmediatamente al médico si tiene respiración rápida, difícil y profunda, náuseas, vomitos y pérdida de apetito); Cuando use este producto consulte al médico si sus síntomas no mejoran o su dolor de cabeza se vuelve persistente (cefalea crónica, en el consumo excesivo de cafeína en bebidas como café, causado por palpitaciones; no tome por más de 2 días para la fiebre sin consultar al médico, ni por más de 7 días para el dolor. Puede causar daño hepático y renal. El uso prolongado, excepto bajo supervisión médica puede ser perjudicial. Este medicamento solo debe tomarse cuando sea necesario. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. Interacciones: Antes de tomar este producto dígale al médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, particularmente: anticoagulantes o anticoagulantes (para tomar anticoagulantes (p. ej. warfarina) y necesita tomar analgésicos diariamente, consulte al médico debido al riesgo de sangrada, pero si podría tomar dosis ocasionales del producto junto a anticoagulantes. Inmediatamente el experimentar reacciones serias en la piel, muy poco comunes, con síntomas que incluyen punto, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel; reacciones alérgicas muy poco comunes que pueden ser graves como erupción cutánea y picazón, a veces con hinchazón de labios, lengua, garganta o cara, dificultad para respirar; ictera en la boca; moretones o sangrado inexplicables; problemas respiratorios más probables si los ha tenido antes al tomar aspirina o antiinflamatorios o asmáticos; náuseas, pérdida repentina de peso; pérdida del apetito y coloración amarillenta de los ojos y la piel. Otras reacciones adversas incluyen: insomnio, nauseabul, irritabilidad, dolores de cabeza, dolor estomacal, palpitaciones, nerviosismo y nervios. La ingesta excesiva de café o té con este producto puede provocar tensión e irritabilidad. Sobredosis: si tiene más medicamento del que debería: consulte inmediatamente al médico, incluso si se siente adecuado. Verifique siempre los componentes de los medicamentos que reciba: su desconocimiento podría ocasionar un consumo de paracetamol superior a la dosis diaria máxima recomendada (3 gramos), generando daño a nivel hepático. Se debe suspender su uso y preguntar al médico y/o farmacéutico si se presentan síntomas y vomitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático. Conservar a una temperatura no mayor de 30°C. No utilice el medicamento después de la fecha de caducidad. Pregunte al farmacéutico cómo desechar el medicamento que ya no usa.
Ventas sin receta médica. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. GZ024 grupo de compañías Haleon o licenciante.
Elaborado por Haleon Perú S.A. Perú. Importado por HALEON PERU S.R.L. Av. Jorge Basadre 347, Ocina 05M105, San Isidro 15073, Perú. RUC 20607649937. R.S. N° EE-03884.
0-800-51-475
mystory.pe@haleon.com
www.panadol.com.pe
facebook.com/panadolperu
7 759277 000109
Lote N°:
Exp.: