



Cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, cafeína 65 mg, excipientes c.s.
Para qué está indicado:
 Panadol Forte se utiliza para el alivio rápido y eficaz del dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor dental, dolor menstrual, dolor reumático y migraña. También alivia las molestias en resfriado, gripe y dolor de garganta. Ayuda a bajar la fiebre. Cuando usted haya sido diagnosticado de migraña o dolor reumático, usar bajo supervisión médica.
 Panadol Forte contiene paracetamol que es un analgésico (reduce dolores) y antiéptico (baja la temperatura corporal cuando se tiene fiebre) y cafeína que ayuda a la eficacia del paracetamol.
Cómo tomar: Adultos y mayores de 16 años. 1-2 tabletas cada 4-6 horas, según sea necesario, sin exceder de 6 tabletas en 24 horas. No tomar más de 4 tabletas en peso inferior a 50kg, alcoholismo crónico, deshidratación y desnutrición crónica. Niños de 12 a 15 años. 1 tableta cada 4-6 horas, según sea necesario, sin exceder de 4 tabletas en 24 horas. Solo para administración oral. Siempre tome la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto. No tome más de la dosis recomendada ni con más frecuencia que cada 4 horas. No recomendado en menores de 12 años.
Contraindicaciones: No tome el producto si es alérgico al paracetamol, cafeína o excipientes; está embarazada o en lactancia; está tomando litio.
Advertencias y Precauciones: CONTIENE PARACETAMOL. No tome más de lo indicado, puede causar grave daño hepático. No tome con otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol, para el dolor, fiebre, síntomas del resfriado o la gripe o para ayudar a dormir. **SIEMPRE LEA Y SIGA LO INDICADO EN ESTE ENVASE. Consulte al médico antes de usar si:** tiene problemas hepáticos o renales; incluida enfermedad hepática alcohólica; ha perdido el conocimiento o toma alcohol con regularidad, ya que podría ser necesario limitar la dosis de paracetamol de manera parcial o total; tiene deshidratación severa, toma medicamentos que afectan a su hígado, tiene infección severa, muy bajo peso o malnutrición severa, toma alcohol en exceso y de forma crónica, que pueden aumentar el riesgo de acción tóxica; consulte inmediatamente al médico si tiene respiración ligada, difícil y profunda, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. **Cuando use este producto:** consulte al médico si sus síntomas no mejoran o si el dolor de cabeza se vuelve persistente; **Evite la cafeína,** evite el consumo excesivo de cafeína en bebidas como café. Si estos puede producir insomnio, temblores y una sensación de malestar en el pecho causado por palpitaciones no tome por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico, ni por más de 7 días para el dolor. Puede causar daño hepático y renal. El uso prolongado, excepto bajo supervisión médica puede ser perjudicial. Este medicamento sólo debe tomarse cuando sea necesario. **Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.**
Interacciones: Antes de tomar este producto dígame al médico y al farmacéutico si está tomando otros medicamentos, particularmente: metoprolol, nifedipina o domperidona (para náuseas o vómitos); colestiramina para reducir el colesterol en sangre; fluocinidol; si toma anticoagulantes (p. ej. warfarina) y necesita tomar analgésicos diariamente, consulte al médico debido al riesgo de sangrado; pero si podría tomar dosis ocasionales del producto junto a anticoagulantes.
Reacciones adversas: Deje de tomar y consulte inmediatamente al médico si experimenta: reacciones serias en la piel, muy poco comunes, con síntomas que incluyen prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel; reacciones alérgicas muy poco comunes que pueden ser graves como erupción cutánea y picazón, a veces con hinchazón de labios, lengua, garganta o cara, o dificultad para respirar; úlceras en la boca; moretones o sangrado inexplicables; problemas respiratorios más profundos si los ha tenido antes al tomar aspirina o antiinflamatorios no esteroideos; náuseas, pérdida repentina de peso, pérdida del apetito y coloración amarillenta de los ojos y la piel.
 Otras reacciones adversas incluyen: insomnio, inquietud, ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, dolor estomacal, palpitaciones, nerviosismo y mareos. La ingestión excesiva de café té con este producto puede provocar temblores e irritabilidad.
Precaución: al tomar más medicamento del que debería consulte inmediatamente al médico, incluso si se siente bien, debido al riesgo retardado de daño hepático grave. **Advertencia de sobredosis accidental:** Verifique siempre los componentes de los medicamentos que recibe: su desconocimiento podría ocasionar un consumo de paracetamol superior a la dosis diaria máxima recomendada (3 gramos), generando daño a nivel hepático. Se debe suspender su uso y preguntar al médico y/o farmacéutico si se presentan náuseas y vómitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático. Conservar a una temperatura no mayor de 30°C. No utilizar el medicamento después de la fecha de caducidad. Pregunte al farmacéutico cómo deshechar el medicamento que ya no usa.
 Venta sin receta médica. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupos de compañías Haleon. ©2024 grupo de compañías Haleon o licenciante.
 Fabricado por Haleon Panamá S.A., Panamá, importado por: HALEON PERU S.A., Av. Jorge Basadre 347, oficina 059109, San Isidro 15073, Perú, RUC 20607649937, R.S. N° EE-03884.

0-800-51-475
 mystory.pe@haleon.com
 www.panadol.com.pe
 facebook.com/panadolperu



Lote N°:
 Exp.:

56 tabletas

Alivia dolores tan fuertes como la migraña.

Via oral



7 451079 003516

6200000212272

PHARMIA CODE REF. IS: 1074