DIRECTION OF GRAIN

PHARMA CODE REF. IS: 1263

Cada tableta contiene: paracetamol 500 mg, cafeína 65 mg, excipientes c.s.

Para qué está indicado:

Panadol Forte se utiliza para el alivio rápido y eficaz del dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor dental, dolor menstrual, dolor reumático y migraña. También alivia las molestias en resfriado, gripe y dolor de garganta. Ayuda a bajar la fiebre. Cuando usted haya sido diagnosticado de migraña o dolor reumático, usar bajo supervisión médica.

Panadol Forte contiene paracetamol que es un analgésico (reduce dolores) y antipirético (baja la temperatura corporal cuando se tiene fiebre) y cafeína que ayuda a la eficacia del paracetamol.

Cómo tomar: **Adultos y mayores de 16 años,** 1-2 tabletas cada 4-6 horas, según sea necesario, sin exceder de 6 tabletas en 24 horas. No tomar más de 4 tabletas en: peso inferior a 50kg, alcoholismo crónico, deshidratación y desnutrición crónica. **Niños de 12 a 15 años,** 1 tableta cada 4-6 horas, según sea necesario, sin exceder de 4 tabletas en 24 horas. **Solo para administración oral. Siempre tome la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto.** No tome más de la dosis recomendada ni con más frecuencia que cada 4 horas. **No recomendado en menores de 12 años.**

Contraindicaciones: No tome el producto si: es alérgico al paracetamol, cafeína o excipientes; está **embarazada** o en **lactancia**; está tomando litio.

Advertencias y Precauciones: CONTIENE PARACETAMOL. No tome más de lo indicado, puede causar grave daño hepático. No tome con otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol, para el dolor, fiebre, síntomas del resfrío y la gripe o para ayudar a dormir. ***SIEMPRE LEA Y SIGA LO INDICADO EN ESTE ENVASE. Consulte al médico antes de usar si:*** tiene problemas hepáticos o renales incluida enfermedad hepática alcohólica, bajo peso o desnutrición o toma alcohol con regularidad, ya que podría ser necesario limitar la dosis de paracetamol de manera parcial o total: tiene deshidratación severa, toma medicamentos que afectan a su hígado, tiene infección severa, muy bajo peso o malnutrición severa, toma alcohol en exceso y de forma crónica, que pueden aumentar el riesgo de acidosis metabólica (consulte inmediatamente al médico si tiene respiración rápida, difícil y profunda, náuseas, vómitos y pérdida de apetito); ***Cuando use este producto:*** consulte al médico si sus síntomas no mejoran o su dolor de cabeza se vuelve persistente; ***Contiene cafeína,*** evite el consumo excesivo de cafeína en bebidas como café, té u otros, puede producir insomnio, temblores y una sensación de malestar en el pecho causado por palpitaciones; no tome por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico, ni por más de 7 días para el dolor. Puede causar daño hepático y renal. El uso prolongado, excepto bajo supervisión médica puede ser perjudicial. Este medicamento sólo debe tomarse cuando sea necesario. **Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.**

Interacciones: Antes de tomar este producto dígale al médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, particularmente: metoclopramida o domperidona (para náuseas o vómitos); colestiramina (para reducir el colesterol en sangre); flucloxacilina; si toma anticoagulantes (p. ej. warfarina) y necesita tomar analgésicos diariamente, consulte al médico debido al riesgo de sangrado, pero si podría tomar dosis ocasionales del producto junto a anticoagulantes.

Reacciones adversas: Deje de tomar y consulte inmediatamente al médico si experimenta: reacciones serias en la piel, muy poco comunes, con síntomas que incluyen prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel; reacciones alérgicas muy poco comunes que pueden ser graves como erupción cutánea y picazón, a veces con hinchazón de labios, lengua, garganta o cara, o dificultad para respirar; úlceras en la boca; moretones o sangrado inexplicables; problemas respiratorios más probables si los ha tenido antes al tomar aspirina o antiinflamatorios no esteroideos; náuseas, pérdida repentina de peso, pérdida del apetito y coloración amarillenta de los ojos y la piel.

Otras reacciones adversas incluyen: insomnio, inquietud, ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, dolor estomacal, palpitaciones, nerviosismo y mareos. La ingesta excesiva de café o té con este producto puede provocar tensión e irritabilidad.

Sobredosis: si toma más medicamento del que debería: consulte inmediatamente al médico, incluso si se siente bien, debido al riesgo retardado de daño hepático grave. ***Advertencia de sobredosis accidental:*** Verifique siempre los componentes de los medicamentos que reciba; su desconocimiento podría ocasionar un consumo de paracetamol superior a la dosis diaria máxima recomendada (3 gramos), generando daño a nivel hepático. Se debe suspender su uso y preguntar al médico y/o farmacéutico si se presentan náuseas y vómitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático.

Conservar a una temperatura no mayor de 30°C. No utilice el medicamento después de la fecha de caducidad. Pregunte al farmacéutico cómo desechar el medicamento que ya no usa.

Venta sin receta médica.

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon.
©2024 grupo de compañías Haleon o licenciante.
Fabricado por: Haleon Panamá S.A., Panamá. **Importado por:** HALEON PERU S.R.L., Av. Jorge Basadre 347, oficina 05W109, San Isidro 15073, Perú. RUC 20607649937. R.S. N° EE-03884.

mystory.pe@haleon.com
0-800-51-475

PHARMA CODE REF. IS: 1263