



**Paracetamol 500 mg
Cafeína 65 mg
Tabletas**

Por favor, lea completamente este inserto antes de comenzar a usar este medicamento. Este medicamento está disponible sin receta médica, pero aún así necesita usar Panadol Forte tableta con cuidado para obtener los mejores resultados.

• Conserve este inserto, puede que necesite leerlo de nuevo.

¿Qué contiene este inserto:

1. Qué es Panadol Forte tableta y para qué se utiliza

2. Verifique antes de tomar Panadol Forte tableta

3. Cómo tomar Panadol Forte tableta

4. Posibles reacciones adversas

5. Cómo almacenar Panadol Forte tableta

6. Información adicional

1. Qué es Panadol Forte tableta y para qué se utiliza

Panadol Forte se utiliza para el alivio eficaz de dolores ocasionales tales como dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor dental, dolor menstrual, migraña y molestias asociadas al resfriado común, gripe y dolor de garganta. También ayuda a reducir la fiebre. Cuando usted haya sido diagnosticado de migraña, usar bajo supervisión médica. Panadol Forte contiene dos sustancias activas. El paracetamol es un analgésico (reduce dolores) y antipirético (baja la temperatura corporal cuando se tiene fiebre) y la cafeína que

ayuda a la eficacia del paracetamol.

2. Verifique antes de tomar Panadol Forte tableta

Contiene Paracetamol, no tome más de lo indicado, puede causar grave daño hepático.

No tome Panadol Forte tableta:

• **si alguna vez ha tenido una reacción alérgica** al paracetamol, cafeína o a cualquiera de los otros ingredientes (listados en la sección 6).

• **si está tomando cualquier otro medicamento con o sin receta que contenga paracetamol** para tratar el dolor, la fiebre, los síntomas del resfriado y la gripe, o para ayudar a dormir.

• **si está tomando litio.**

Consulte con su médico antes de tomar este medicamento si:

• **tiene problemas hepáticos o renales** incluida enfermedad hepática alcohólica, **tiene bajo peso o desnutrición, toma alcohol** con regularidad, ya que podría ser necesario limitar la dosis de paracetamol de manera parcial o total.

• **tiene deshidratación severa, toma medicamentos** que afectan a su hígado, **tiene infección severa, muy bajo peso o malnutrición severa, toma alcohol en exceso** y de forma crónica, que pueden aumentar el riesgo de acidosis metabólica.

Los signos de acidosis metabólica incluyen:

- respiración profunda, rápida y difícil
- sensación de náuseas, vómitos
- pérdida de apetito

Durante el tratamiento informe a su médico inmediatamente si:

• **tiene enfermedades graves**, como insuficiencia renal grave o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daño en los órganos), o padece malnutrición, alcoholismo crónico o si también está tomando flucloxacilina

HALEON

(un antibiótico). Se ha notificado de una afección grave denominada acidosis metabólica (una anomalía de la sangre y los fluidos) en pacientes en estas situaciones cuando se usa paracetamol en dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina. Los síntomas de la acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos. Póngase en contacto con un médico de inmediato si presenta una combinación de estos síntomas. Es posible que necesite evitar el uso de este producto o limitar la cantidad de paracetamol que toma.

Contactar al médico después de 3 días de fiebre o 7 días de dolor si los síntomas empeoran o no mejoran.

Si está tomando otros medicamentos

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento si está tomando algún medicamento recetado; particularmente **metoclopramida** o **domperidona** (para las náuseas [sensación de malestar] o vómitos [estar enfermo]) o **colestiramina** (para reducir el **colesterol en sangre**); **flucloxacilina** (antibiótico) debido al riesgo grave de alteración de la sangre y los fluidos (denominada acidosis metabólica) que requiere tratamiento urgente (ver advertencias y precauciones). Si toma **medicamentos anticoagulantes (anticoagulantes, p. ej., warfarina)** y necesita tomar un analgésico a diario, **consulte con su médico** debido al riesgo de sangrado. Sin embargo, aún puede tomar dosis **ocasionales** de Panadol Forte tableta al mismo tiempo que los anticoagulantes.

Embarazo y lactancia

Debido al contenido de cafeína, este producto

esta contraindicado durante el embarazo y la lactancia.

3. Cómo tomar Panadol Forte tableta

Adultos y niños mayores de 16 años:

Tome de 1 a 2 tabletas cada 4 a 6 horas según sea necesario, sin exceder de 6 tabletas en 24 horas. No tomar más de 4 tabletas en las siguientes situaciones, a menos que se lo indique su médico: peso inferior a 50kg, alcoholismo crónico, deshidratación y desnutrición crónica.

- Siempre use la dosis efectiva más baja para aliviar sus síntomas.
- No lo tome con más frecuencia que cada 4 horas.
- No tome más de la dosis recomendada.
- No administre a niños menores de 16 años.
- Evite el exceso de cafeína en bebidas como el café y el té.
- La ingesta excesiva de cafeína puede producir insomnio, temblores y una sensación de malestar en el pecho.
- Puede causar daño hepático y renal.
- El uso prolongado, excepto bajo supervisión médica puede ser perjudicial. Este medicamento sólo debe tomarse cuando sea necesario.

Si sus síntomas continúan o su dolor de cabeza se vuelve persistente, consulte a su médico.

Si toma demasiadas tabletas:

Consulte con un médico de inmediato si toma demasiadas tabletas de este medicamento, incluso si se siente bien. Esto se debe a que un exceso de paracetamol puede causar daño hepático grave y retardado.

Advertencia de sobredosis accidental:

Verifique siempre los componentes de los medicamentos que recibe; su desconocimiento podría ocasionar un consumo de paracetamol superior a la dosis diaria máxima recomendada (3 gramos), generando daño a nivel hepático. Se debe suspender su uso y preguntar al médico

y/o farmacéutico si se presentan náuseas y vómitos que pueden estar acompañados con dolor abdominal en el borde hepático.

4. Posibles reacciones adversas

Como todos los medicamentos, Panadol Forte tableta puede tener efectos secundarios, pero no todos los experimentan. Un pequeño número de personas ha tenido efectos secundarios. Se han notificado casos muy raros de reacciones cutáneas graves.

Deje de tomar el medicamento y consulte a su médico inmediatamente si experimenta:

- Reacciones serias en la piel, muy poco comunes, con síntomas que incluyen prurito, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel.
- Reacciones alérgicas que pueden ser graves, como erupción cutánea y picazón, a veces con hinchazón de labios, lengua, garganta o cara o dificultad para respirar.
- Erupción cutánea o descamación de la piel, o úlceras en la boca.
- Problemas respiratorios. Estos son más probables si los ha experimentado antes al tomar otros analgésicos como aspirina o antiinflamatorios no esteroideos.
- Moretones o sangrado inexplicables.
- Náuseas, pérdida repentina de peso, pérdida de apetito y coloración amarillenta de los ojos y la piel.
- De frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): Afección grave que puede aumentar la acidez de la sangre (acidosis metabólica) en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol (ver sección #2. Verifique antes de tomar Panadol Forte tableta).

Otras reacciones adversas: insomnio, inquietud, ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza, dolor estomacal, palpitaciones, nerviosismo y mareos. La ingesta excesiva de café o té con

este producto puede provocar tensión e irritabilidad.

Si experimenta cualquier reacción adversa, consulte con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible reacción adversa que no esté listada en este inserto.

También puede informar directamente las reacciones adversas a través del correo mystory.pe@haleon.com o al teléfono 0-800-51-475.

Al informar sobre las reacciones adversas, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacenar y desechar el Panadol Forte tableta

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar a una temperatura no mayor de 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el sobre después de EXP. Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Ingredientes activos: Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol y 65 mg de cafeína

Los otros ingredientes son: Almidón pregelatinizado, almidón de maíz, povidona, sorbato de potasio, talco, ácido esteárico, agua purificada, hidroxipropil metilcelulosa y triacetina.

Fabricado por: Haleon Panamá S.A. Panamá.

Importado por: HALEON PERU S.R.L.

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.

Fecha de revisión de la Información para el paciente: Marzo 2026

695100018