PHARMA CODE REF. IS: 383

Cada 1 mL contiene paracetamol 100 mg, excipientes c.s.

Indicaciones:

Reduce la fiebre y alivia dolores leves a moderados incluyendo: dolor de cabeza, dolor muscular/ musculoesquelético, dolor de garganta, dolor en la dentición, dolor y fiebre asociados con la vacunación, dolor y fiebre asociados con el resfrío común y la gripe.

Cómo tomar:

Siga las instrucciones indicadas por su médico. Si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico. **Sólo para administración oral.** La dosis depende del peso del bebé. Dosis diaria recomendada: 60 mg/kg/día, dividida en 4 a 6 tomas (15 mg/kg cada 6 horas, o 10 mg/kg cada 4 horas). Mida la dosis utilizando el gotero graduado. Para la administración de 15 mg/kg cada 6 horas, la dosis normal es:

Peso	Dosis recomendada en mL (cada 6 horas)	Peso	Dosis recomendada en mL (cada 6 horas)
2 kg	0,3 ml	8 kg	1,2 ml
3 kg	0,4 ml	9 kg	1,3 ml
4 kg	0,6 ml	10 kg	1,5 ml
5 kg	0,7 ml	11 kg	1,6 ml
6 kg	0,9 ml	12 kg	1,8 ml
7 kg	1 ml	13 kg	1,9 ml

Cálculo directo: multiplicar el peso del bebé en kg por 0,15, el resultado son los ml a administrar. Esta dosis puede repetirse cada 6 horas. Si a las 3-4 horas de administrado no mejoran los síntomas, puede adelantar la dosis cada 4 horas administrando 10 mg/kg. Administrar solo cuando aparezcan síntomas, suspender la medicación a medida que éstos desaparezcan. Si olvidó tomar la dosis: No tome una dosis doble para compensar dosis olvidadas. Tome otra tan pronto como sea posible y continúe con el horario habitual. Si la siguiente toma está muy próxima, salte la dosis que olvidó y tome la siguiente en su hora habitual.

No usar el producto si su bebé:

Es alérgico al paracetamol, excipientes y/o tiene enfermedad hepática.

CONTIENE PARACETAMOL:

Consultar al médico o farmacéutico antes o durante el uso del producto. No tomar más de la dosis recomendada, la sobredosis puede causar daño hepático. No debe ser usado con otros medicamentos que contengan paracetamol. Tomar paracetamol con bebidas alcohólicas puede provocar daño hepático. **Consulte a su médico antes de usar si su bebé tiene:** enfermedad renal, cardíaca, pulmonar o anemia; enfermedades graves como insuficiencia renal grave o sepsis, malnutrición o toma flucloxacilina. Se ha notificado acidosis metabólica en pacientes en estas situaciones cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina, los síntomas pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración profunda y rápida, somnolencia, náuseas y vómitos. **Cuando su bebé use este producto:** pueden aparecer reacciones alérgicas (posiblemente retardadas), debido al contenido de parabenos. Se recomienda precaución en pacientes asmáticos sensibles al ácido acetilsalicílico, debido a que se han descrito ligeras reacciones broncoespásticas con paracetamol. *Detenga el uso y consulte a su médico si su bebé tiene:* dolor o fiebre por más de 3 días (dolor de garganta por más de 2 días), empeoran o aparecen otros síntomas. **Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.**

Antes de usar dígale a su médico y/o farmacéutico si su bebé toma otros medicamentos, particularmente:

Anticoagulantes (acenocumarol, warfarina); antibióticos (cloranfenicol); anticonceptivos; estrógenos; antiepilépticos (lamotrigina, fenitoína, otras hidantoínas, fenobarbital, metilfenobarbital, primidona, carbamacepina); antituberculosos (isoniazida, rifampicina); barbitúricos (inductores del sueño, sedantes, anticonvulsivantes); carbón activado (para diarrea o gases); colestiramina (para disminuir el colesterol en sangre); para la gota (probenecid y sulfinpirazona); para espasmos de estómago, intestino y vejiga (anticolinérgicos); metoclopramida y domperidona (para náuseas y vómitos); propranolol (para hipertensión y arritmias cardíacas); zidovudina (para infección por VIH); flucloxacilina (antibiótico, puede causar acidosis metabólica que requiere tratamiento urgente). En análisis clínicos (sangre, orina, pruebas con alergenos, etc.) dígale al médico que está tomando este medicamento, ya que puede alterar los resultados.

Detenga el uso y consulte a su médico si su bebé tiene:

Reacciones serias en la piel, muy poco comunes, con síntomas que incluyen picazón, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel. Muy raramente puede presentarse daño hepático, erupciones en la piel, neutropenia e leucopenia. Frecuencia no conocida acidosis metabólica en pacientes con enfermedad grave que usan Paracetamol.

En caso de sobredosis:

Si el bebé ha tomado más medicamento del recomendado consulte inmediatamente al médico; incluso si no hay síntomas ya que se pueden manifestar hasta después de 3 días. Los síntomas por intoxicación grave pueden ser: mareos, vómitos, pérdida del apetito, coloración amarillenta de la piel y ojos (ictericia) y dolor abdominal.

Se considera sobredosis, la ingestión de una sola toma de más de 100mg/kg de peso en niños. El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de las 4 hrs siguientes a la ingestión. Pacientes que toman barbitúricos pueden ser más susceptibles a una sobredosis.

Conservese a menos de 30°C. Venta sin receta médica. Marcas registradas con propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.

Fabricado por: Pharmetique S.A. Colombia. Para: HALEON PERU S.R.L. Av. Jorge Basadre 547 oficina CSWFOS, San Isidro 15073, Perú. RUC 20607648937. R.S. Nº EE-08606 *Imagen de gotero referencial.

10003737

NOTA: DE ABRIR AL FRASCO

1. Empujar hacia arriba la tapa hasta abajo.
2. Presionando la tapa, gírala hacia la izquierda. Para cerrar no es necesario presionar la tapa, sólo gírala hacia la derecha.

TAPA DE SEGURIDAD
Evita que sea abierta por los niños.

7 44102600128 3

mystory.pe@haleon.com
0-800-51-475

HALEON

Panadol

Para Bebés de 1 a 24 meses

Alivio contra la fiebre y el dolor
Suave con el estómago
No contiene azúcar

Sabor a frutas
Antipirético - Analgésico

Solución oral GOTAS 15 mL
Paracetamol 100 mg/mL

HALEON

Panadol

Para Bebés de 1 a 24 meses

Alivio contra la fiebre y el dolor
Suave con el estómago
No contiene azúcar

Sabor a frutas
Antipirético - Analgésico

Solución oral GOTAS 15 mL
Paracetamol 100 mg/mL

Lote Nº:

Exp.:

PHARMA CODE REF. IS: 383