



Exp:
Lote N.º



Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de usar, si su niño toma warfarina.

Cuando su niño use este producto, no exceda la dosis recomendada. Contiene ácido benzoico, que puede aumentar la ictericia (coloración amarillenta de la piel y ojos) en bebés.

Detenga el uso y consulte a su médico al: el dolor empeora o dura más de 5 días, la fiebre empeora o dura más de 3 días, ocurren nuevos síntomas, se presenta hinchazón o enrojecimiento, los cuales pueden ser signos de una enfermedad grave. **Mantener fuera del alcance de los niños.**

Advertencia de sobredosis: consulte inmediatamente a su médico. La atención médica rápida es crítica tanto para niños y adultos, incluso si no nota ningún signo o síntoma.

MODO DE ABRIR EL FRASCO:

1. Presionar (empujar) fuertemente la tapa de seguridad hacia abajo.

2. Presionando la tapa, girarla hacia la izquierda.

TAPA DE SEGURIDAD
Evita que sea abierta por los niños.

Nota: Para cerrar el frasco no es necesario presionar la tapa, solo girarla hacia la derecha. Almacénese a temperatura no mayor de 30°C. Una vez abierto el frasco, el contenido debe utilizarse durante un plazo máximo de 6 meses. Venta sin receta médica. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías HALEON. ©2024 grupo de compañías HALEON o licenciante.

Fabricado por: Pharmatiqae S.A. Colombia. **Para:** HALEON PERU S.R.L., Av. Jorge Basadre 347, oficina 05W109, San Isidro 15073, Perú. RUC 20607649937. R.S. N° EE-09339.

0-800-51-475
mystory.pe@haleon.com
www.panadol.com.pe



Cada 5 mL contienen: paracetamol 160 mg, excipientes c.s.

Contiene sorbitol.

EFECTOS SECUNDARIOS INDICADOS:
Reduce la fiebre y alivia temporalmente dolores y molestias menores debidos al resfriado común, gripe, dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor dental.

CÓMO TOMAR:
Este producto no contiene instrucciones o advertencias completas para su uso en adultos. Solo para administración oral. No administre más de la dosis indicada. Busque la dosis correcta en la tabla de dosis. Si es posible, utilice el peso para la dosis, de lo contrario use la edad.

Peso aprox. (kg)	Edad (años)	Dosis (mL)*
Debajo de 11.0	Menor de 2 años	Consulte al médico
11.0 - 15.9	2 - 3 años	5 mL
16.0 - 21.9	4 - 5 años	7.5 mL
22.0 - 26.9	6 - 8 años	10 mL
27.0 - 31.9	9 - 10 años	12.5 mL
32.0 - 43.9	11 años	15 mL

*o como indique su médico

Repetir la dosis cada 4 horas mientras persistan los síntomas. No administre más de 4 dosis en 24 horas (Dosis máxima diaria: 60mg/kg en dosis divididas de 10 - 15mg/kg). **Siempre administrar la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto.** No usar por más de tres días para la fiebre sin consultar al médico. No es recomendable su uso por más de siete días. Puede causar daño hepático y renal. **Atención:** use el vaso dosificador incluido en el envase.

CONTRAINDICACIONES:
Advertencia de daño hepático: contiene paracetamol, puede causar grave daño hepático si su niño toma más de 4 dosis en 24 horas (dosis máxima diaria) o con otros medicamentos que contengan paracetamol. **Alerta de reacción alérgica:** el paracetamol puede causar serias reacciones en la piel, pero estas son muy poco comunes. Los síntomas incluyen erupción, picazón, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel. Si esto ocurre, detenga el uso y busque ayuda médica de inmediato. **Advertencia en caso de dolor de garganta:** si el dolor de garganta es severo, persiste por más de 2 días, está acompañado o seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupciones, náuseas o vómitos, consulte a su médico inmediatamente. **No usar el producto:** con otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol (consulte a un médico o farmacéutico si no está seguro si un medicamento contiene paracetamol), si su niño es alérgico al paracetamol o a los excipientes.

Consulte a su médico antes de usar, si su niño tiene enfermedad hepática.

