

Formulario- maestro	WORKING-common-spc-APAP-syrup-clean-proposed-22Abr2026 - PANADOL JARABE
	RIM-LBL-0071322 Version number 1
	24 Jul 2025

ROTULADO MEDIATO: Caja

[Logo Haleon]

PANADOL

Paracetamol 160 mg/5 mL

Para Niños de

2 a 11 años

Antipirético – Analgésico

Sabor a Frambuesa

Jarabe

60 mL

Incluye vaso dosificador

[Imagen de vaso dosificador]

Alivio contra la fiebre y el dolor

Suave con el estómago

No contiene azúcar

[FÓRMULA O INGREDIENTES]

Cada 5 mL contienen: paracetamol 160 mg, excipientes c.s. Contiene sorbitol.

[INDICACIONES]

PARA QUÉ ESTÁ INDICADO: *Reduce la fiebre y alivia temporalmente dolores y molestias menores debidos al resfrío común, gripe, dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor dental.*

[DOSIS O MODO DE USO]

CÓMO TOMAR

Este producto no contiene instrucciones o advertencias completas para su uso en adultos. Solo para administración oral. No administre más de la dosis indicada. Busque la dosis correcta en la tabla de dosis. Si es posible, utilice el peso para la dosis, de lo contrario use la edad.

Peso aprox. (Kg)	Edad (años)	Dosis (mL)*
Debajo de 11.0	Menor de 2 años	Consulte al médico
11.0 – 15.9	2 – 3 años	5 mL
16.0 – 21.9	4 – 5 años	7.5 mL
22.0 – 26.9	6 – 8 años	10 mL

Formulario- maestro	WORKING-common-spc-APAP-syrup-clean-proposed-22Abr2026 - PANADOL
	JARABE
	RIM-LBL-0071322 Version number 1
24 Jul 2025	

27.0 – 31.9	9 – 10 años	12.5 mL
32.0 – 43.9	11 años	15 mL

* o como indique su médico

Repetir la dosis cada 4 horas mientras persistan los síntomas. No administre más de 4 dosis en 24 horas (Dosis máxima diaria: 60mg/kg en dosis divididas de 10 - 15mg/Kg).

Siempre administre la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto. No usar por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico. No es recomendable su uso por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. **Atención:** use el vaso dosificador incluido en el envase.

[ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES]

ADVERTENCIAS:

Advertencia de daño hepático: contiene paracetamol, puede causar grave daño hepático si su niño toma más de 4 dosis en 24 horas (dosis máxima diaria) o con otros medicamentos que contengan paracetamol.

Alerta de reacción alérgica: el paracetamol puede causar serias reacciones en la piel, pero estas son muy poco comunes. Los síntomas incluyen erupción, picazón, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas, ampollas y desprendimiento de la capa superior de la piel. Si esto ocurre, detenga el uso y busque ayuda médica de inmediato.

Advertencia en caso de dolor de garganta: si el dolor de garganta es severo, persiste por más de 2 días, está acompañado o seguido de fiebre, dolor de cabeza, erupciones, náuseas o vómitos, consulte a su médico inmediatamente.

Consulte a su médico antes de usar, si su hijo: toma otros medicamentos, tiene afecciones subyacentes, tiene problemas hepáticos o renales, tiene bajo peso o malnutrición. Puede ser necesario limitar la dosis de paracetamol parcial o completamente.

Durante el tratamiento informe a su médico inmediatamente si su niño tiene: enfermedades graves como insuficiencia renal grave o sepsis, malnutrición, alcoholismo crónico o si toma flucloxacilina. Se ha notificado acidosis metabólica (una alteración de la sangre y los fluidos) en pacientes en estas situaciones cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina, los síntomas pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

[INTERACCIONES]

Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de usar, si su niño toma warfarina o medicamentos similares utilizados como anticoagulantes; o flucloxacilina (antibiótico), debido a un riesgo grave de acidosis metabólica que requiere tratamiento urgente.

[CONTRAINDICACIONES]

Formulario- maestro	WORKING-common-spc-APAP-syrup-clean-proposed-22Abr2026 - PANADOL
	JARABE
	RIM-LBL-0071322 Version number 1
	24 Jul 2025

No usar el producto: con otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol (consulte a un médico o farmacéutico si no está seguro si un medicamento contiene paracetamol); si su niño es alérgico al paracetamol o a los excipientes.

[REACCIONES ADVERSAS]

Cuando su niño use este producto, no exceda la dosis recomendada. Contiene ácido benzoico, que puede aumentar la ictericia (coloración amarillenta de la piel y ojos) en bebés.

Detenga el uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 5 días; la fiebre empeora o dura más de 3 días; ocurren nuevos síntomas; se presenta hinchazón o enrojecimiento, los cuales pueden ser signos de una enfermedad grave.

De frecuencia desconocida: acidosis metabólica en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol.

[SOBREDOSIS]

Advertencia de sobredosis: consulte inmediatamente a su médico. La atención médica rápida es crítica tanto para niños y adultos, incluso si no nota ningún signo o síntoma.

[INFORMACIÓN ADICIONAL]

MODO DE ABRIR EL FRASCO:

TAPA DE SEGURIDAD

Evita que sea abierta por los niños.

[Imagen de apertura del frasco]

1. Presionar (empujar) fuertemente la tapa de seguridad hacia abajo.
2. Presionando la tapa, girarla hacia la izquierda.

Nota: Para cerrar el frasco no es necesario presionar la tapa, solo girarla hacia la derecha.



Almacénese a temperatura no mayor de 30°C. Una vez abierto el frasco, el contenido debe utilizarse durante un plazo máximo de 6 meses. Venta sin receta médica.

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.

[FABRICANTE Y TITULAR]

Formulario- maestro	WORKING-common-spc-APAP-syrup-clean-proposed-22Abr2026 - PANADOL JARABE
	RIM-LBL-0071322 Version number 1
	24 Jul 2025

Fabricado por: Pharmetique S.A., Colombia. **Para:** HALEON PERU S.R.L., Av. Jorge Basadre 347, oficina 05W109, San Isidro 15073, Perú. RUC 20607649937. R.S. N° EE-09339.

 0-800-51-475
 mystory.pe@haleon.com

[LEGALES]

R.S. N° EE-009339.

Lote N°:

Exp.:

Nota:

La información entre corchetes “[]” solo es de guía y referencia, no será transcrito en el texto del diseño final del producto.