

3 5 9

PHARMA CODE REF. IS:

- 215,50 mm

24 mm

10003782

ampollas y estrocamiento de la capa superior de la piel. Si esto ocurre, detenga el uso y busque ayuda médica de inmediato. **Advertencia en caso de dolor de garganta:** si el dolor de garganta es persistente, acompañado de fiebre, dolor de cabeza, erupciones, náuseas o vómitos, consulte a su médico inmediatamente. **Consulte a su médico antes de usar, o su niño:** toma otros medicamentos, especialmente antibióticos, antifúngicos, diuréticos, hepáticos o renales, tiene bajo peso o malnutrición. Puede ser necesario limitar la dosis de paracetamol o completamente. **Durante el tratamiento de enfermedades graves como insuficiencia renal grave o sepsis, malnutrición, alcoholismo crónico o si toma fluoxalocina.** Se ha notificado acidosis metabólica (una alteración de la sangre y los fluidos corporales) en estas situaciones cuando se utilizaba paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con fluoxalocina; los síntomas pueden incluir: dificultad respiratoria grave con o sin hinchazón de la cara, náuseas, vómitos, somnolencia, náuseas y vómitos.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No usar el producto: con otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol o con otros medicamentos, como coagulantes, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, o si su niño es alérgico a cualquier medicamento (si su niño es alérgico a cualquier medicamento, consulte a los expertos).

Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de usar de: su niño toma warfarina o medicamentos que contengan warfarina, coagulantes, anticoagulantes, medicamentos para la presión arterial, fluoxalocina (antibiótico), debido a un riesgo grave de acidosis metabólica que requiere tratamiento urgente.

Cuando su niño use este producto, no exceda la dosis recomendada. Contiene ácido bórico, el cual puede aumentar la lacticia (coloración amarillenta de la piel y ojos) en bebés.

Detenga el uso y consulte a su médico si: el dolor empeora o dura más de 5 días, la fiebre empeora o dura más de 3 días, ocurren nuevos síntomas, se presenta hinchazón o enrojecimiento, los cuales pueden ser signos de una enfermedad grave. **De frecuencia desconocida:** acidosis metabólica en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol.

Advertencia de sobredosis: consulte inmediatamente a su médico. La atención médica rápida es crítica tanto para niños y adultos, incluso si no nota ningún signo o síntoma.

MODO DE ABRIR EL FRASCO:

1. Presionar (empujar) fuertemente la tapa de seguridad hacia abajo.
2. Presionando la tapa, girarla hacia la izquierda.

TAPA DE SEGURIDAD
Evita que sea abierta por los niños.

Nota: Para cerrar el frasco no es necesario presionar la tapa, solo girarla hacia la derecha. Almacénese a temperatura no mayor de 30°C. Una vez abierto el frasco, el contenido debe utilizarse durante un plazo máximo de 6 meses. Venta sin receta médica. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupos de compañías farmacéuticas ©2025 grupo de compañías farmacéuticas licenciantes.

Fábrica: Pharmaceutique S.A., Colombia.
Pack: HALEON PER S.R.L., Ave. Jorge Basadre 747, oficinas 05W109 San Andrés, Bogotá, Colombia. Teléfono: +57 (0)21 5073-73. Email: ventas@haledon.com

347, oficina 05W109, San Isidro 15073, Peru.
RUC 20607649937. R.S. N° EE-09339.
✉ mystory.pe@haleon.com
☎ 0-800-51-475



7 759277 000185

Panadol

Para **Niños**
de **2 a 11 años**

Alivio contra la fiebre y el dolor
Suave con el estómago
No contiene azúcar

Incluye vaso dosificador

Sabor a Frambuesa
Antipirético - Analgésico

Jarabe 60 mL
Paracetamol 160 mg/5 mL

Cada 5 mL contienen: paracetamol 160 mg, excipientes c.s. Contiene sorbitol.

PARA QUÉ ESTÁ INDICADO:

Reduce la fiebre y alivia temporalmente dolores y molestias menores debidos al resfrío común, gripe, dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor dental.

CÓMO TOMAR:

Este producto no contiene instrucciones o advertencias completas para su uso en adultos. Solo para administración oral. No administre más de la dosis indicada. Busque la dosis correcta en la tabla de dosis. Si es posible, utilice el peso para la dosis, de lo contrario use la edad.

Peso aprox. (Kg)	Edad (años)	Dosis (mL)*
Debajo de 11.0	Menor de 2 años	Consulte al médico
11.0 - 15.9	2 - 3 años	5 mL
16.0 - 21.9	4 - 5 años	7.5 mL
22.0 - 26.9	6 - 8 años	10 mL
27.0 - 31.9	9 - 10 años	12.5 mL
32.0 - 43.9	11 años	15 mL

* o como indique su médico

Repetir la dosis cada 4 horas mientras persistan los síntomas. No administrar más de 4 dosis en 24 horas (Dosis máxima diaria: 60mg/kg en dosis divididas de 10 - 15mg/kg). **Siempre administre la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto.** No usar por más de 3 días para la fiebre sin consultar al médico. No es recomendable su uso por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. **Atención:** use el vaso dosificador incluido en el envase.

ADVERTENCIAS:

Advertencia de daño hepático: contiene paracetamol, puede causar grave daño hepático si su niño toma más de 4 dosis en 24 horas (dosis máxima diaria) o con otros medicamentos que contengan paracetamol. **Alerta de reacción alérgica:** el paracetamol puede causar serias reacciones en la piel, pero estas son muy poco comunes. Los síntomas incluyen erupción, picazón, enrojecimiento de la piel, formación de vesículas,

PHARMA CODE REF. IS:
3 5 9