

INSERTO PARA EL PACIENTE

[Logo Haleon]

Panadol

para Niños

2+ Años

Antipirético – Analgésico

Sabor a cereza

[FÓRMULA O INGREDIENTES]

Cada tableta masticable de **Panadol para Niños** contiene: paracetamol 80 mg, excipientes c.s.

[INDICACIONES]

PARA QUÉ ESTÁ INDICADO: Panadol para Niños Tableta masticable reduce la fiebre y alivia temporalmente los dolores leves a moderados, incluyendo: dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de la dentición, dolor dental, dolor y fiebre asociados con la vacunación/inmunización, dolores debido al resfrío común y la gripe.

[DOSIS O MODO DE USO]

CÓMO TOMAR PANADOL PARA NIÑOS TABLETA MASTICABLE:

Peso (Kg)	Edad (años)	Dosis (tabletas)
11.0 – 15.9	2 – 3	2
16.0 – 21.9	4 – 5	3
22.0 – 26.9	6 – 8	4
27.0 – 31.9	9 – 10	5
32.0 – 43.9	11 – menores de 12	6

Solo para administración oral. Administrar de acuerdo al peso del niño, según la tabla de dosis. No administre más de la dosis indicada. **No exceda la dosis máxima diaria: 4 dosis** (60mg/kg, en dosis divididas de 10 - 15mg/Kg). La dosis puede repetirse cada 4 horas, nunca en menos de este intervalo. No administre el producto por más de 3 días sin consultar al médico. **Siempre administre la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto. No recomendado en menores de 2 años.**

[ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES]

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: CONTIENE PARACETAMOL: la dosis máxima diaria es 4 dosis en 24 horas (ver tabla de dosis), puede causar grave daño hepático o posiblemente mortal si toma más de la dosis recomendada en 24 horas o si se toma junto a otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol para el dolor, fiebre, síntomas del resfrío y la gripe, o para ayudarlo a dormir. Los síntomas de daño hepático pueden incluir coloración amarillenta de la piel/ojos, orina oscura, sudoración, náuseas, vómitos, dolor de estómago, cansancio inusual y/o pérdida del apetito.

SIEMPRE LEA Y SIGA LO INDICADO EN ESTE INSTRUCTIVO.

CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR SI SU NIÑO: toma otros medicamentos, tiene afecciones subyacentes, tiene problemas hepáticos o renales, tiene bajo peso o malnutrición. Puede ser necesario limitar la dosis de paracetamol parcial o completamente. **Durante el tratamiento informe a su médico inmediatamente si su niño:** tiene enfermedades graves, como insuficiencia renal grave o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daño en los órganos), o padece malnutrición, alcoholismo crónico o si también está tomando flucloxacilina (un antibiótico). Se ha notificado de una afección grave denominada acidosis metabólica (una anomalía de la sangre y los fluidos) en pacientes en estas situaciones cuando se usa paracetamol en dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina. Los síntomas de la acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos.

CUANDO SU NIÑO USE ESTE PRODUCTO: consulte a su médico si sus síntomas no mejoran. **Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.**

[INTERACCIONES]

ANTES DE ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO DÍGALE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO SI SU NIÑO ESTÁ TOMANDO OTROS MEDICAMENTOS, PARTICULARMENTE: warfarina o anticoagulantes similares; o flucloxacilina (antibiótico), debido al riesgo grave de alteración de la sangre y los fluidos (denominada acidosis metabólica) que requiere tratamiento urgente (ver advertencias y precauciones).

[CONTRAINDICACIONES]

NO ADMINISTRE EL PRODUCTO SI SU NIÑO: es alérgico al paracetamol o a los excipientes.

[REACCIONES ADVERSAS]

DETENGA LA ADMINISTRACIÓN Y CONSULTE INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO SI SU NIÑO EXPERIMENTA: reacciones alérgicas (erupción cutánea, picazón o hinchazón de labios, lengua, garganta o cara); descamación de la piel o úlceras en la boca; moretones o sangrado inexplicables; problemas respiratorios, más probables si los ha tenido al tomar antiinflamatorios no esteroideos o aspirina.

De frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): Afección grave que puede aumentar la acidez de la sangre (acidosis metabólica) en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol (ver advertencias y precauciones).

[SOBREDOSIS]

SI SU NIÑO TOMA MÁS MEDICAMENTO DEL QUE DEBERÍA: consulte inmediatamente a su médico, incluso si no tiene ningún síntoma, debido al riesgo de daño hepático.

[INFORMACIÓN ADICIONAL]

Conservar a una temperatura no mayor de 30°C. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.

 0-800-51-475
 mystory.pe@haleon.com

Nota:

La información entre corchetes “[]” solo es de guía y referencia, no será transcrito en el texto del diseño final del producto.