



HALEON

para **Niños  
2+Años**

Antipirético - Analgésico  
Sabor a cereza

Cada tableta masticable de **Panadol para Niños** contiene: paracetamol 80 mg, excipientes c.s.

**PARA QUÉ ESTÁ INDICADO:** **Panadol para Niños** Tableta masticable reduce la fiebre y alivia temporalmente los dolores leves a moderados, incluyendo: dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de la dentición, dolor dental, dolor y fiebre asociados con la vacunación/ inmunización, dolores debido al resfriado común y la gripe.

**CÓMO TOMAR PANADOL PARA NIÑOS**  
TABLETA MASTICABLE:

Peso (Kg)	Edad (años)	Dosis (tabletas)
11.0 - 15.9	2 - 3	2
16.0 - 21.9	4 - 5	3
22.0 - 26.9	6 - 8	4
27.0 - 31.9	9 - 10	5
32.0 - 43.9	11 - menores de 12	6

**Solo para administración oral.** Administrar de acuerdo al peso del niño, según la tabla de dosis. No administre más de la dosis indicada. **No exceda la dosis**

**máxima diaria: 4 dosis** (60mg/kg, en dosis divididas de 10 - 15mg/Kg). La dosis puede repetirse cada 4 horas, nunca en menos de este intervalo. No administre el producto por más de 3 días sin consultar al médico.

**Siempre administre la menor dosis efectiva y por el tiempo más corto. No recomendado en menores de 2 años.**

**NO ADMINISTRE EL PRODUCTO SI SU NIÑO:** es alérgico al paracetamol o a los excipientes.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:**

**CONTIENE PARACETAMOL:** La dosis máxima diaria es 4 dosis en 24 horas (ver tabla de dosis), puede causar grave daño hepático o posiblemente mortal si toma más de la dosis recomendada en 24 horas o si se toma junto a otros medicamentos, con o sin receta médica, que contengan paracetamol para el dolor, fiebre, síntomas del resfriado y la gripe, o para ayudarlo a dormir. Los síntomas de daño hepático pueden incluir coloración amarillenta de la piel/ojos, orina oscura, sudoración, náuseas, vómitos, dolor de estómago, cansancio inusual y/o pérdida del apetito.

6200000223521

**SIEMPRE LEA Y SIGA LO INDICADO EN ESTE INSTRUCTIVO.**

**CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE USAR SI SU NIÑO:** toma otros medicamentos, tiene afecciones subyacentes, tiene problemas hepáticos o renales, tiene bajo peso o malnutrición. Puede ser necesario limitar la dosis de paracetamol parcial o completamente. **Durante el tratamiento informe a su médico inmediatamente si su niño:** tiene enfermedades graves, como insuficiencia renal grave o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daño en los órganos), o padece malnutrición, alcoholismo crónico o si también está tomando flucloxacilina (un antibiótico). Se ha notificado de una afección grave denominada acidosis metabólica (una anomalía de la sangre y los fluidos) en pacientes en estas situaciones cuando se usa paracetamol en dosis regulares durante un periodo prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina. Los síntomas de la acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos.

**CUANDO SU NIÑO USE ESTE PRODUCTO:** consulte a su médico si sus síntomas no mejoran. **Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.**

**ANTES DE ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO DÍGALE A SU MÉDICO YO FARMACÉUTICO SI SU NIÑO ESTÁ TOMANDO OTROS MEDICAMENTOS, PARTICULARMENTE:** warfarina o anticoagulantes similares; o flucloxacilina (antibiótico), debido al riesgo grave de alteración de la sangre y los

fluidos (denominada acidosis metabólica) que requiere tratamiento urgente (ver advertencias y precauciones).

**DETENGA LA ADMINISTRACIÓN Y CONSULTE INMEDIATAMENTE A SU MÉDICO SI SU NIÑO EXPERIMENTA:** reacciones alérgicas (erupción cutánea, picazón o hinchazón de labios, lengua, garganta o cara); descamación de la piel o úlceras en la boca; moretones o sangrado inexplicables; problemas respiratorios, más probables si los ha tenido al tomar antiinflamatorios no esteroideos o aspirina. **De frecuencia desconocida** (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): Afección grave que puede aumentar la acidez de la sangre (acidosis metabólica) en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol (ver advertencias y precauciones).

**SI SU NIÑO TOMA MÁS MEDICAMENTO DEL QUE DEBERÍA:** consulte inmediatamente a su médico, incluso si no tiene ningún síntoma, debido al riesgo de daño hepático.

Conservar a una temperatura no mayor de 30°C. Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.

✉ [mystory.pe@haleon.com](mailto:mystory.pe@haleon.com)  
☎ 0-800-51-475

62000000223521



PHARMA CODE REF. IS: 1340