

INSERTO PARA EL PACIENTE

[Logo Hialeon]

Panadol

Paracetamol 500 mg

Tabletas

Por favor, lea completamente este inserto antes de comenzar a usar este medicamento.

Este medicamento está disponible sin receta médica, pero aún así necesita usar Panadol 500 mg tableta con cuidado para obtener los mejores resultados.

- Conserve este inserto, puede que necesite leerlo de nuevo.

¿Qué contiene este inserto:

1. Qué es Panadol 500mg tableta y para qué se utiliza
2. Verifique antes de tomar Panadol 500mg tableta
3. Cómo tomar Panadol 500mg tableta
4. Posibles efectos secundarios
5. Cómo almacenar y desechar Panadol 500mg tableta
6. Contenido del paquete y otra información

1. Qué es Panadol 500mg tableta y para qué se utiliza

Panadol 500mg tableta contiene la sustancia activa paracetamol, que es un analgésico y también reduce su temperatura cuando tiene fiebre.

Panadol 500mg tableta se utiliza para el alivio rápido y efectivo del dolor de cabeza, dolor dental, dolor de espalda, dolor muscular y dolor menstrual. También alivia el dolor de garganta y la fiebre, dolores y malestares del resfrío y la gripe.

2. Verifique antes de tomar Panadol 500mg tableta

Contiene paracetamol. No tome con ningún otro producto que contenga paracetamol. No tome Panadol 500mg tableta:

- **si alguna vez ha tenido una reacción alérgica** al paracetamol o a cualquiera de los otros ingredientes (listados en la Sección 6).
- **si tiene menos de 10 años.**

Consulte con su médico antes de usar si usted:

- toma otros medicamentos
- tiene afecciones subyacentes

- tiene problemas de hígado o riñón, incluyendo enfermedad hepática alcohólica
- tiene bajo peso o está malnutrido
- bebe alcohol regularmente

Durante el tratamiento informe a su médico inmediatamente si:

- tiene enfermedades graves, como insuficiencia renal grave o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daño en los órganos), o padece malnutrición, alcoholismo crónico o si también está tomando flucloxacilina (un antibiótico). Se ha notificado de una afección grave denominada acidosis metabólica (una anomalía de la sangre y los fluidos) en pacientes en estas situaciones cuando se usa paracetamol en dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con flucloxacilina. Los síntomas de la acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración rápida y profunda, somnolencia, náuseas y vómitos. Póngase en contacto con un médico de inmediato si presenta una combinación de estos síntomas. Es posible que necesite evitar el uso de este producto o limitar la cantidad de paracetamol que toma.

Debe consultar a un médico si la fiebre empeora o persiste después de 3 días o el dolor durante 5 días.

Si está tomando otros medicamentos

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento si está tomando algún medicamento recetado; particularmente **metoclopramida** o **domperidona** (para náuseas [sensación de malestar] o vómitos [estar enfermo]); **colestiramina** (para reducir el colesterol en sangre); **flucloxacilina** (antibiótico), debido al riesgo grave de alteración de la sangre y los fluidos (denominada acidosis metabólica) que requiere tratamiento urgente (ver advertencias y precauciones). Si toma **medicamentos anticoagulantes** (por ejemplo, warfarina) y necesita tomar un analgésico a diario, consulte con su médico debido al riesgo de sangrado. Sin embargo, aún puede tomar dosis ocasionales de Panadol 500 mg tableta al mismo tiempo que los anticoagulantes.

Embarazo y lactancia

Si es necesario, Panadol 500 mg tableta puede usarse durante el embarazo. Debe usar la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible. Comuníquese con su médico si el dolor y/o la fiebre no se reducen. Puede tomar este producto durante la lactancia.

3. Cómo tomar Panadol 500mg tableta

Panadol 500mg tableta es para administración oral.

Adultos y niños mayores de 16 años:

Tome de 1 a 2 tabletas cada 4 a 6 horas según sea necesario, sin exceder de 6 tabletas ó 3 g en 24 horas.

Niños de 10 a 15 años:

Administre 1 tableta cada 4 a 6 horas según sea necesario, sin exceder de 4 tabletas en 24 horas.

No administre a los niños durante más de 3 días sin consultar a un médico.

No administre a niños menores de 10 años.

- **Contiene paracetamol.**
- **No tome con más frecuencia que cada 4 horas.**
- No tome más de la dosis recomendada.
- Si los síntomas persisten consulte a su médico.
- El uso prolongado, excepto bajo supervisión médica puede ser perjudicial.
- Siempre use la dosis efectiva más baja para aliviar sus síntomas.

Si toma demasiadas tabletas:

Se debe buscar asesoramiento médico inmediato en caso de sobredosis, debido al riesgo de daño hepático irreversible.

4. Posibles efectos secundarios

Como todos los medicamentos, Panadol 500mg tableta puede tener efectos secundarios, pero no todos los experimentan. Deje de tomar el medicamento y avise a su médico inmediatamente si experimenta:

- Reacciones alérgicas que pueden ser graves, como erupción cutánea y picazón, a veces con hinchazón de la boca o la cara o dificultad para respirar
- Erupción cutánea o descamación de la piel, o úlceras en la boca
- Problemas respiratorios. Estos son más probables si los ha experimentado antes al tomar otros analgésicos como ibuprofeno y aspirina
- Moretones o sangrado sin explicación
- Náuseas, pérdida repentina de peso, pérdida de apetito y coloración amarillenta de los ojos y la piel.
- De frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): Afección grave que puede aumentar la acidez de la sangre (acidosis metabólica) en pacientes con enfermedad grave que toman paracetamol (ver sección #2. Verifique antes de tomar Panadol 500mg tableta).

Si experimenta cualquier efecto secundario, consulte con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario que no esté listado en este inserto.

También puede informar directamente los efectos secundarios a través del correo mystory.pe@haleon.com o al teléfono 0-800-51-475.

Al informar sobre los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Cómo almacenar y desechar el Panadol 500mg tableta

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar a una temperatura no mayor de 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y en el sobre después de EXP.

La fecha de caducidad se refiere al último día del mes.

No tire ningún medicamento a través de los desagües o la basura doméstica. Pregunte a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no utiliza. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del paquete y otra información

La sustancia activa es paracetamol. Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol.

Los otros ingredientes son: Almidón de maíz, Almidón pregelatinizado, Povidona, Talco, Sorbato de potasio, Ácido esteárico, Agua purificada.

Fabricado por: Haleon Panamá S.A. Panamá.

Importado por: HALEON PERU S.R.L.

Marcas registradas son propiedad o licenciadas por grupo de compañías Haleon. ©2025 grupo de compañías Haleon o licenciante.

Fecha de revisión de la Información para el paciente: Irlanda – Noviembre 2025