

HALEON



PARACETAMOL 600MG - CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 10MG

Sabor a Limón y Miel

Polvo Granulado Efervescente

COMPOSICIÓN

Cada sachet contiene:

Ingredientes Activos: Paracetamol 600mg, Clorhidrato de Fenilefrina 10mg.

Excipientes: Ácido Ascórbico, Sacarosa, Citrato de Sodio, Ácido Cítrico Anhídrido, Almidón de Maíz, Mentol, Sabor a Miel, Sabor a Miel F7624/P, Sabor a Limón, Caramelo SCS (E 150), Aspartame, Sacarina Sódica.

INDICACIONES

Este medicamento es utilizado para el alivio a corto plazo de los síntomas de la gripe, el resfrió, y los escalofríos. Estos síntomas incluyen: dolor de cabeza, escalofríos, dolores, nariz tapada y senos paranasales dolorosos, catarro y dolor de garganta. Este medicamento

contiene dos ingredientes activos. El Paracetamol es un analgésico y reduce su temperatura cuando Ud. tiene fiebre. El Clorhidrato de Fenilefrina es un descongestivo que destapa su nariz y senos paranasales ayudándolo a respirar más fácilmente. Este medicamento contiene 40 mg de Ácido Ascórbico (Vitamina C).

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Vía de Administración: Oral.

Adultos y niños de 16 años y mayores:

Vaciar el contenido de un sachet en una taza. Llenar a la mitad con agua muy caliente. Agitar bien. Agregar agua fría según sea necesario y azúcar si lo desea.

Tomar un sachet cada 4 horas, según sea necesario.

No tomar más frecuentemente que cada 4 horas.

No tomar más de 6 sachets en 24 horas.

No tomar más que la dosis recomendada.

No tomar por más de 7 días, sin consultar con su médico.

No administrar a niños menores a 16 años.

CONTRAINDICACIONES

No tomar este medicamento si Ud.:

- ha tenido alguna vez una reacción alérgica al Paracetamol, al Clorhidrato de Fenilefrina, al Ácido Ascórbico o a cualquiera de los otros ingredientes listados en la sección Composición.
- tiene problemas de hígado o riñones, tiroides hiperactiva, diabetes, presión alta o enfermedad cardíaca o circulatoria.
- tiene feocromocitoma o glaucoma.
- está tomando antidepresivos tricíclicos (ej: Imipramina o Amitriptilina) o si está tomando o ha tomado en las últimas dos semanas algún inhibidor de la Monoamino Oxidasa (IMAOs) (ej: Moclobemida) recetados para la depresión.
- está tomando beta-bloqueantes.

No tome nada más que contenga Paracetamol mientras utilice este medicamento.

No utilice con cualquier otro producto para la gripe, el resfrió o descongestivo.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Tenga especial cuidado con este medicamento

- Este producto puede causar mareos. Si se ve afectado, no maneje u opere maquinaria.
- Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a algunos azúcares, póngase en contacto con él antes de tomar este medicamento.
- Este medicamento contiene 120 mg de sodio (principal componente de la sal común/de mesa) en cada sobre. Esto equivale al 5% de la ingesta diaria máxima recomendada de sodio para un adulto.
- Este medicamento contiene 50 mg de Aspartame en cada sobre. El Aspartame es una fuente de Fenilalanina. Puede ser perjudicial si padece Fenilceturia (PKU), un raro trastorno genético en el que la Fenilalanina se acumula porque el organismo no puede eliminarla correctamente.

62000000210274

Consulte con su médico antes de tomar este medicamento:

- si Ud. tiene una enfermedad de vasos sanguíneos como el Fenómeno de Raynaud.
- si Ud. tiene hipertrofia prostática.
- si Ud. tiene Diabetes Mellitus. Cada sachet contiene 3.8 g de Sacarosa.
- si Ud. sigue una dieta controlada en Sodio. Cada sachet contiene 0.12 g de Sodio.

INTERACCIONES

Si está tomando otros medicamentos:

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está tomando otros medicamentos de prescripción; particularmente Metoclopramida o Domperidona (para náuseas o vómitos) o Ergotamina o Metilsergida (para la migraña) o Colestiramina (para disminuir el colesterol sanguíneo) o medicamentos para disminuir la presión sanguínea; supresores o estimulantes del apetito; medicamentos para tratar la depresión como antidepresivos tricíclicos (ej: Amitriptilina) o enfermedad cardíaca (ej: Digoxina) o si está tomando medicamentos para anticoagular la sangre (anticoagulantes, ej: Warfarina).

EMBARAZO Y LACTANCIA

No tome este medicamento si está embarazada o en período de lactancia a menos que sea recomendado por su médico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos adversos, pero no todo el mundo los tiene. Un pequeño número de personas ha tenido efectos adversos. Deje de tomar este medicamento y consulte a su médico inmediatamente si Ud. experimenta:

- Reacciones alérgicas que pueden ser severas como erupciones cutáneas y picazón, algunas veces con hinchazón de la boca o la cara o falta de aire.
- Erupciones cutáneas o descamaciones, o úlceras en la boca.
- Problemas para respirar. Estos son más probables si Ud. los ha experimentado antes tomando otros analgésicos como Ibuprofeno o Aspirina.
- Moretones o sangrados sin explicación.
- Fiebres o infecciones recurrentes.
- Náuseas, pérdida de peso repentina, pérdida del apetito y coloración amarilla de la piel y los ojos.

- Alteraciones visuales. Esto es raro, pero es más probable en individuos con glaucoma.
- Pulso inusualmente rápido o una sensación de ritmo cardíaco inusualmente rápido o irregular.
- Dificultad para orinar. Esto es más probable que ocurra en hombres con hipertrofia prostática.

Los siguientes efectos adversos pueden ocurrir.

Consulte con su médico si los tiene:

- Presión sanguínea elevada, dolor de cabeza, mareos, dificultad para dormir, nerviosismo, ansiedad, diarrea o náuseas.

Si usted tiene cualquier efecto adverso, consulte con su médico, farmacéutico o nurse.

Esto incluye cualquier efecto adverso posible no listado en este prospecto.

SOBREDOSIS

Consulte un médico inmediatamente si ha tomado demasiado de este medicamento, incluso si se siente bien. Esto se debe a que un exceso de paracetamol puede causar un serio daño hepático retrasado. Si sus síntomas persisten, vea a su médico.

En caso de sobredosis comunicarse al CIAT – Teléfono: 1722.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente menor a 30°C. Consérvese fuera de la vista y alcance de los niños. No usar este medicamento luego de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

PRESENTACIONES

Envases por 5 sobres.

Importado, distribuido y representado por:

Epolyt S.A., Costa Rica 1720 Local 102 P.1 Torre 2, Montevideo, Uruguay. Preguntas 08002266. Reg. MSP 45553. Ley 15443. Vía oral. Dir. Téc. QF Lucia Landeira. Control médico recomendado.

Fabricado por: Haleon Alcalá S.A.;

Carretera de Ajalvir, Km. 2,500, Alcalá de Henares (Madrid), E-28806, España, para Haleon UK Trading Limited; Norreys Drive, Maidenhead, Berkshire, SL6 4BL, United Kingdom.

"Marcas Registradas de propiedad o licenciadas por Haleon. ©2023 Haleon o licenciante"