

**Voltaren Emulgeli**

diklofenaakkidietyyliamiini

11,6 mg/g

Geeli

**Lue tämä pakkauseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkauselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on neuvonut sinulle.
- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
  - Kysy tarvittaessa lääkäristä tai apteekista lisätietoja ja neuvooja.
  - Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.
  - Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

**Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Voltaren Emulgeli -geeli on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltaren Emulgeli -geeliä
3. Miten Voltaren Emulgeli -geeliä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Voltaren Emulgeli -geelin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

**1. Mitä Voltaren Emulgeli -geeli on ja mihin sitä käytetään**

Voltaren Emulgelin sisältämä vaikuttava aine diklofenaakki kuuluu tulehduskipulääkkeiden (NSAID) ryhmään. Voltaren Emulgeli on erityisesti kehitetty ihoon hierottavaksi.

Voltaren Emulgeliä käytetään lievittämään kipua ja vähentämään tulehdusta ja turvotusta niveliin ja lihaksiin liittyvissä kiputiloissa.

**Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:**

Voltaren Emulgeliä voidaan käyttää nyrrähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarituskuesta johtuvan lihas- ja nivelkiven hoitoon kauemmin kuin 2 viikon ajan.

**Aikuiset (18 vuotta täyttäneet):**

Voltaren Emulgeli soveltuu myös polvien ja sormien niveliikosta johtuvan kiven lyhytaikaiseen paikallishoitoon niille potilaille, joilla lääkäri on todennut kyseisen sairauden.

Lääkäri voi määrättää valmistetta käytettäväksi myös muuhun käyttöaiheeseen.

Käännä lääkärin puoleen, ellei tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

**2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltaren Emulgeli -geeliä****Älä käytä Voltaren Emulgeliä**

– jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (diklofenaakille) tai muille tulehduskipulääkkeille, joita käytetään kiven, kuumeen tai tulehdusken hoitoon, kuten ibuprofeenille tai asetyylisalisylihapolle (lääke, jota käytetään myös estämään veren hyytymistä) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luetteltu kohdassa 6). Jos olet epävarma, kysy lääkäristä tai apteekkienkilökunnalta.

Allergisen reaktion oireita voivat olla: hengityksen vinkuminen tai hengitysvaikeudet (astma), rakkulainen ihottuma tai nokkosihottuma, kasvojen tai kielen turvotus, nuhaisuus.

– raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.

– jos olet alle 14-vuotias.

**Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä Voltaren Emulgeliä.****Varoitus ja varotoimet**

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Emulgeliä.

– Älä käytä Voltaren Emulgeliä viltto- tai avohaavoihin tai iholle, jossa on ihottumaa.

– Hoito on lopetettava, jos valmisteen käytön jälkeen kehittyy ihottumaa.

– Älä käytä enempää valmistetta kuin on suositeltu, äläkä käytä sitä suositeltua pidempään, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

– Voltaren Emulgeli on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön. Älä laita sitä suuhun äläkä niele sitä.

– Varo Voltaren Emulgelin joutumista silmiin. Jos sitä on päässyt silmiin, huuhtele silmät hyvin puhtaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkienkilökuntaan, jos haittaa silmissä jatkuu.

– Tukisiteitä tai muita suojuksia, joita käytetään nyrrähdysteen kaltaisissa vammoissa, voidaan käyttää Voltaren Emulgelin kanssa, mutta älä käytä Voltaren Emulgeliä ilmatiiviiden (muovi)sidosten alla.

**Jos sinulla on kysytävästä, keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Emulgeliä.**

**Lapset ja alle 14-vuotiaat nuoret**

Tämän valmisteen tehosta ja turvallisuudesta lapsille ja alle 14-vuotiaalle nuorille on niukasti tietoja (katso kohtaa Älä käytä Voltaren Emulgeliä).

Jos 14 vuotta täyttänyt nuori tarvitsee Voltaren Emulgeliä kiven lievitykseen kauemmin kuin

7 vuorokautta tai jos oireet pahenevat, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.

**Muut lääkevalmisteet ja Voltaren Emulgeli**

Kerro lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä.

**Raskaus, imetys ja hedelmällisyys**

Jos olet raskaana tai imettä, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoo ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Voltaren Emulgeli ei saa käyttää raskauden viimeisten kolmen kuukauden aikana, koska se voi aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapselleesi ja voi haitata synnytystä.

Voltaren Emulgeli saa käyttää ensimmäisten kuuden raskauskuukauden aikana vain, jos lääkäri neuvoo sinua tekemään niin. Annoksen on oltava mahdollisimman pieni ja hoidon keston mahdollisimman lyhyt.

Suun kautta otettavat diklofenaakkia sisältävät lääke-muodot (esim. tabletit) voivat aiheuttaa haittavaikutuksia syntymättömälle lapselleesi. Ei tiedetä, aiheuttaako Voltaren Emulgeli -valmiste saman riskin myös, kun sitä käytetään ihan kautta.

Voltaren Emulgeli ei saa käyttää imetysaikana, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin, koska pieni määriä diklofenaakkia erittyy rintamaitoon. Voltaren Emulgeli ei saa levittää imettävien naisten rinnolle eikä muille laajoille ihoalueille, eikä sitä saa käyttää pitkiä aikojia.

**Ajaminen ja koneiden käyttö**

Iholle käytetty Voltaren Emulgeli ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

**Voltaren Emulgeli sisältää propyleeniglykolia**

Geeli sisältää propyleeniglykolia, joka voi aiheuttaa ihoärsytystä.

**Voltaren Emulgeli sisältää hajustetta**

Voltaren Emulgeli -geeli sisältää hajustetta, jossa on bentsyylibentsoaattia, bentsyylialkoholia, sitraalia, sitronellolia, kumariinia, d-limoneenia, eugenolia, farnesolia, geraniolia ja linalolia, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

**3. Miten Voltaren Emulgeli -geeliä käytetään**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkauselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on määritellyt. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

**Kuinka paljon Voltaren Emulgeliä käytetään****Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:**

Voltaren Emulgeliä hierotaan kipeytyneelle alueelle kevyesti 3–4 kertaa päivässä.

**Miten Voltaren Emulgeliä levitetään**

1. Avaamattomat Voltaren Emulgeli -tuubit on suljettu sinetillä, joka on murrettava ennen ensimmäistä käyttöä. Alumiinituubin sinettikalvo puhkaistaan tuubin kierrekorkissa olevalla kärjellä ja muovituubin sinetti kierretään irti ja poistetaan kierrekorkin pään avulla.

2. Purista pieni määriä Voltaren Emulgeliä tuubista ja levitä sitä hitaasti hieroon ihoon sille alueelle, missä sinulla on kipua tai turvotusta. Tarvittavaan geelimääriin vaikuttaa kipeytyneen tai turvonneen alueen suuruus. Yleensä peukalonpään kokoinen geelimääri on riittävä. Saatat huomata viilentävän vaikutuksen, kun hierot geelia iholle.

Käytä Voltaren Emulgeliä ainoastaan iholle.

**Annostelun jälkeen:**

- Kädet on pyyhittää esim. imukyysisellä paperipyöhkeellä ja sitten ne pestää, elleivät kädet ole hoidettava alue. Imukykyinen paperi on heittettävä roskiaan käytön jälkeen.
- Odota, että Voltaren Emulgeli kuivuu iholla ennen suihkuun tai kylpyyn menoaa.

**Kuinka kauan Voltaren Emulgeliä käytetään****Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:**

- Älä käytä Voltaren Emulgeliä nyrrähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarituskuesta johtuvan lihas- ja nivelkiven hoitoon kauemmin kuin 2 viikon ajan.

**Aikuiset (18 vuotta täyttäneet):**

- Älä käytä Voltaren Emulgeliä niveliikosta johtuvan kiven hoitoon kauemmin kuin 3 viikon ajan.

Lääkäri voi suositella pidempää hoitoa.

Jolleivät kipu ja turvotus lievity tai jos ne pahenevat viikon kuluessa geelin käytön aloittamisesta, ota yhteytsi lääkäriin.

**Jos käytät enemmän Voltaren Emulgeliä kuin sinun pitäisi**

Jos pursoitat tuubista enemmän geelia kuin sinun pitäisi, pyhi ylimääräisen geeli pois imukyysisellä paperilla, ennen kuin hierot sen ihoon.

Jos olet vahingossa niellyt tai lapsi on niellyt Voltaren Emulgeliä, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

**Jos unohtat käyttää Voltaren Emulgeliä**

Jos olet unohtanut käyttää Voltaren Emulgeliä oikeaan aikaan, hiero sitä iholle niin pian kuin mahdollista ja jatka sitten käyttää tavalliseen tapaan. Älä käytä kaksinkertaista määriä korvatakseen unohtuneen kerran.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käännä lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

**4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

**Jotkut harvinaiset tai hyvin harvinaiset haittavaikutukset saattavat olla vakavia.**

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergioireista, LOPETA Voltaren Emulgelin käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai apteekkienkilökuntaan:

- Rakkulainen ihottuma; nokkosihottuma (saattaa esiintyä 1–10 käyttäjällä 10 000:sta).
- Hengityksen vinkuminen, hengenahdistus tai puristava tunne rinnassa (astma) (saattaa esiintyä harvemmassa kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta).
- Kasvojen, hultten, kielen tai nielun turpoaminen (saattaa esiintyä harvemmassa kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Muut mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimenevia (jos olet huolissasi jostakin haittavaikutuksesta, ota yhteytsi lääkäriin tai apteekkienkilökuntaan).

**Yleisiä haittavaikutuksia**

(saattaa esiintyä 1–10 käyttäjällä 100:sta)

– Ihottuma, ihan kutina, punoitus ja kirvelty.

**Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia**

(saattaa esiintyä harvemmassa kuin 1 käyttäjällä 10 000:sta)

– Iho saattaa tulla herkemäksi auringonvalolle. Mahdollisia oireita ovat kutiseva, auringon polttama iho, turvotus ja rakkulat.

**Haittavaikutuksista ilmoittaminen**

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

**5. Voltaren Emulgeli -geelin säilyttäminen****Ei lasten ulottuville eikä näkyville.**

Älä käytä tätä lääkettä pakkausessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärään (Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämääri tarjoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 25 °C. Ei saa jäätää.

Älä heitä lääkeitä viemäriin (esim. WC:n tai pesulataan kautta). Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämistä apteekista. Näin menetellen autat suojelemaan luontoa.

**6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa****Mitä Voltaren Emulgeli sisältää**

– Vaikuttava aine on diklofenaakkidietyyliamiini. Yksi gramma geeliä sisältää 11,6 mg diklofenaakkidietyyliamiinia, mikä vastaa 10 mg diklofenaakkinatriumia.

– Apuaaineet: yksi gramma geeliä sisältää 50 mg propyleeniglykolia ja 1 mg bentsyylibentsoaattia.

– Muut apuaaineet ovat dietyliliamiini, isopropylialkoholi, karbomeeri (akryylihappopolymeeri), kokoyylkaprylokappaatti, makrogolisetostearyleetteri, nestemäinen parafysi, parfyymi (Perfume Crème 45) ja puhdistettu vesi. Katso lisätietoja tämän selosteesta kohdasta 2.



### Läs nog i genom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till läkaren eller apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

### I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Voltaren Emulgel gel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren Emulgel gel
3. Hur du använder Voltaren Emulgel gel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Voltaren Emulgel gel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### 1. Vad Voltaren Emulgel gel är och vad det används för

Den aktiva substansen i Voltaren Emulgel, diklofenak, hör till en grupp läkemedel som kallas antiinflammatoriska värvärmmediciner (NSAID). Voltaren Emulgel har utvecklats speciellt för att masseras in i huden.

Voltaren Emulgel används för att lindra smärta och minska inflammation och svullnad vid olika värtillstånd i ledar och musklar.

### Vuxna och ungdomar som fyllt 14 år:

Voltaren Emulgel kan användas för kortvarig lokal behandling av muskel- och ledvärv som förorsakats av stukningar, försträckningar, idrottsskador eller överansträngning.

### Vuxna (personer över 18 år):

Voltaren Emulgel lämpar sig också för kortvarig lokal behandling av smärta till följd av artros i knän och fingrar hos patienter där läkare säkerställt diagnosen.

En läkare kan även ordnara preparatet för något annat användningsområde.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

### 2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren Emulgel gel

#### Använd inte Voltaren Emulgel

- om du är allergisk mot aktiv substans (diklofenak) eller mot andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som används för behandling av värk, feber eller inflammation, så som ibuprofen eller acetilsalicylsyra (ett läkemedel som även används för att förhindra koaguleringen av blodet), eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du är osäker, fråga läkare eller apotekspersonal. Symtom på en allergisk reaktion kan vara: pipande andning, andnöd (astma), utslag med blåsor eller nässelutslag, svullnad i ansikte eller tunga, snuvighet.
- under den sista tredjedelen av en graviditet.
- om du är yngre än 14 år.

#### Använd inte Voltaren Emulgel om något av de ovan nämnda gäller för dig.

#### Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren Emulgel.

- Använd inte Voltaren Emulgel på skär- eller öppna sår eller på hud med utslag.
- Avsluta behandlingen om hudutslag uppkommer efter applikation av preparatet.
- Använd inte mer gel än rekommenderat eller under längre tid än rekommenderas, såvida inte läkaren ordinerat detta.

- Voltaren Emulgel är avsedd endast för utvärtes bruk. Sätt det inte i munnen och svälj det inte.

- Undvik att få Voltaren Emulgel i ögonen. Om du får gel i ögonen, skölj dem noggrant med rent vatten. Kontakta läkare eller apotekspersonal om ögonbesvärerna inte går över.

- Stödförband eller andra skydd som används vid skador förknippade med försträckningar kan användas med Voltaren Emulgel men använd inte Voltaren Emulgel under lufttätta (plast) förband.

#### Om du har några frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren Emulgel.

#### Barn och ungdomar under 14 år

Information gällande säkerhet och effekt hos barn och ungdomar under 14 år är begränsad (se avsnitt Använd inte Voltaren Emulgel).

Om en ungdom som fyllt 14 år behöver Voltaren Emulgel för behandling av smärta i mer än 7 dagars tid, eller om symtomen förvärras, ska läkare kontaktas.

#### Andra läkemedel och Voltaren Emulgel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Orrala former (t.ex. tablett) av diklofenak kan ha negativa effekter på ditt ofödda barn. Det är inte känt om samma risk gäller för Voltaren Emulgel när det används på huden.

Voltaren Emulgel får användas endast på läkarordination under amning, eftersom diklofenak går över i bröstmjölken i små mängder. Voltaren Emulgel ska dock inte appliceras på brösten hos ammande kvinnor eller på större hudområden och ska inte heller användas under längre tider.

#### Körförmåga och användning av maskiner

Voltaren Emulgel, som ju används på huden, påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

#### Voltaren Emulgel innehåller propylenglykol

Gelen innehåller propylenglykol, vilket kan ge hudirritation.

#### Voltaren Emulgel innehåller parfym

Voltaren gel innehåller doftämnen med bensylbensoat, bensylalkohol, citral, citronellol, kumarin, limonen, eugenol, farnesol, geraniol, linalol, vilka kan orsaka allergiska reaktioner.

#### 3. Hur du använder Voltaren Emulgel gel

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

#### Hur mycket Voltaren Emulgel ska man använda?

Vuxna samt ungdomar som fyllt 14 år: Voltaren Emulgel masseras lätt in i området där det gör ont 3–4 gånger per dag.

#### Hur ska Voltaren Emulgel appliceras?

1. Voltaren Emulgel tuberna är stängda med en försegling, som måste brytas före den första användningsgången. Förseglingsmembranet på aluminiumtuben perforeras med skruvkorkens spets och förseglingen på plasttuben vrids av med hjälp av skruvkorkens baksida.

2. Tryck ut en liten mängd Voltaren Emulgel ur tuben och massera den lätt in på det ömma eller svullna hudområdet. Mängden som behövs beror på det smärtande eller svullna områdets storlek. En gelmängd av tumspetsstorlek räcker vanligtvis till. Det är möjligt att du observerar en lätt svallande verkan då du masserar in gelen i huden. Voltaren Emulgel ska endast användas på huden.

#### Efter applicering:

- Händerna ska torkas med t.ex. absorberande pappershandduk och sedan tvättas om inte händerna är det område som behandlas. Pappershandduken ska kastas i papperskorgen efter användning.
- Vänta tills Voltaren Emulgel gel har torkat innan du badar eller duschar.

#### Hur länge ska Voltaren Emulgel användas

##### Vuxna och ungdomar som fyllt 14 år:

- Använd inte Voltaren Emulgel längre än i 2 veckors tid vid behandling av muskel- och ledvärv förorsakad av stukningar, sträckningar, idrottsskador eller överansträngning.

##### Vuxna (personer över 18 år):

- Använd inte Voltaren Emulgel längre än i 3 veckors tid vid behandling av smärta till följd av artros.

En läkare kan eventuellt rekommendera en längre behandlingstid.

Kontakta läkare om inte smärtan och svullnaden har lindrats, eller om de har blivit värre inom en vecka efter att du påbörjat behandlingen.

#### Om du har använt för stor mängd av Voltaren Emulgel

Om du av misstag tryckt en större mängd gelen ur tuben än du borde, stryk bort extra gelen med absorberande pappershandduk innan du masserar den in i huden.

Om du eller ett barn av misstag har svalt Voltaren Emulgel, alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

#### Om du har glömt att använda Voltaren Emulgel

Om du har glömt att använda Voltaren Emulgel vid den tidpunkt du borde, applicera gel på hudområdet så snart som möjligt och fortsätt sedan att använda preparatet som vanligt. Använd inte dubbel mängd för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

#### 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

#### Vissa sällsynta eller mycket sällsynta biverkningar kan vara allvarliga.

Om du drabbas av något av följande allergiska symptom, AVBRYT användningen av Voltaren Emulgel och kontakta genast läkare eller apotekspersonal:

- Hudutslag med blåsor; nässelutslag (kan förekomma hos 1–10 av 10 000 användare).
- Pipande andning, andnöd eller tryckande känsla i bröstet (astma) (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare).
- Svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare).

Andra möjliga biverkningar är i allmänhet lindriga och övergående (om du oroar dig över någon biverkning, kontakta läkare eller apotekspersonal).

#### Vanliga biverkningar

(kan förekomma hos 1–10 av 100 användare)

- Utslag, klåda, rodnad och sveda i huden.

#### Mycket sällsynta biverkningar

(kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare)

- Huden kan bli känsligare för solljus. Möjliga symptom är kliande, solbränd hud; svullnad och blåsor.

#### Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

#### 5. Hur Voltaren Emulgel gel ska förvaras

#### Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter "Utg.dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet (t.ex. via toaletten eller lavoaren). Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

#### 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

#### Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin. Ett gram gel innehåller 11,6 mg diklofenakdietylamin, som motsvarar 10 mg diklofenaknatrium.
- Hjälpämnen: ett gram gel innehåller 50 mg propylenglykol och 1 mg bensylbensoat.
- Övriga innehållsämnen är dietylamin, isopropylalkohol, karbomer (akrylsyrapolymer), kokoylkapryloksyrat, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, parfym (Perfume Crème 45) och renat vatten. För ytterligare information, se avsnitt 2 av denna bipacksedel.

#### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

##### Utseende

En vit eller nästan vit, icke-fet gel som känns svallande på huden och som inte lämnar fläckar.

##### Förpackningsstorlekar

Aluminiumtuber: 30 g, 50 g, 100 g eller 120 g

Plasttuber: 30 g, 50 g, 75 g, 100 g, 120 g eller 150 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

#### Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: [mystery.nd@haleon.com](mailto:mystery.nd@haleon.com)

Denna bipacksedel ändrades senast 29.08.2024

#### Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi).

Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon-koncernen.

©2024 Haleon-koncernen eller dess licensgivare.