



Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käytämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä uudelleen.
- Kysy tarvittaessa lääkäristä tai apteekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännä lääkärin puoleen, ellei olosi parane 7 päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Voltaren Forte -geeli on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltaren Forte -geelia
3. Miten Voltaren Forte -geeliä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Voltaren Forte -geelin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Voltaren Forte -geeli on ja mihin sitä käytetään

Voltaren Forten sisältämä vaikuttava aine diklofenaakkikuuluu ryhmään, jota sanotaan ei-steroidisiksi tulehduskipulääkkeiksi (NSAID). Voltaren Forte on erityisesti kehitetty ihoon hierottavaksi.

Voltaren Fortea käytetään lievittämään kipua ja vähentämään tulehdusta ja turvotusta monissa niveliin ja lihaksiin liittyvissä kiputiloissa.

Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:

Voltaren Fortea voidaan käyttää nyrrähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasisuudesta johtuvan lihas- ja niveliivin hoidossa kauemmin kuin 2 viikon ajan.

Aikuiset (18 vuotta täyttäneet):

Voltaren Forte soveltuu myös polvien ja sormien niveliikosta johtuvan kiven lyhytaikaiseen paikallishoitoon niille potilaille, joilla lääkäri on todennut kyseisen sairauden.

Lääkäri voi määrätkin valmistetta käytettäväksi myös muuhun käyttöaiheeseen.

Käännä lääkärin puoleen, ellei tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 7 päivän jälkeen.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Voltaren Forte -geelia

Älä käytä Voltaren Fortea

- jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (diklofenakkileille) tai muille tulehduskipulääkkeille, joita käytetään kivun, kuumeen tai tulehuksen hoitoon, kuten ibuprofeenille tai asetyylisalisylihapolle (lääke, jota käytetään myös estämään veren hyytymistä) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (luettelut kohdassa 6). Jos olet epävarma, kysy lääkäristä tai apteekkienkilökunnalta.

Allergisen reaktion oireita voivat olla: hengityksen vinkuminen tai hengitysvaiseudet (astma), rakkulainen ihottuma tai nikkosihottuma, kasvojen tai kielen turvotus, nuhaisuuksia.

- jos olet raskaana viimeisellä kolmanneksella.

- jos olet alle 14-vuotias.

Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä Voltaren Fortea.

Varoitus ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Fortea.

- Älä käytä Voltaren Fortea viiltö- tai avohaaivoihin tai iholle, jossa on ihottumaa.

- Hoito on lopettava, jos valmisteen käytön jälkeen kehittyy ihottumaa.

- Älä käytä enempää valmistetta kuin on suositeltu, äläkä käytä sitä suositeltua pidempää, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

- Voltaren Forte on tarkoitettu ainoastaan iholle.

Älä laita sitä suuhun äläkä niele sitä. Varo Voltaren Forten joutumista silmiin. Jos sitä on päässyt silmiin, huuhtele silmät hyvin puhtaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkienkilökuntaan, jos haittaa silmissä jatkuu.

- Tukisiteitä tai muita suojuksia, joita käytetään nyrrähdysten kaltaisissa vammoissa, voidaan käyttää Voltaren Forte -geelin kanssa, mutta älä käytää Voltaren Forte -geeliä ilmatiiviiden (muovi) sidosten alla.

Jos sinulla on kysyttyä, keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Voltaren Fortea.

Lapset ja alle 14-vuotiaat nuoret

Tämän valmisten tehosta ja turvallisuudesta lapsille ja alle 14-vuotialle nuorille on niukasti tietoja (katso kohdalla Älä käytä Voltaren Fortea).

Jos 14 vuotta täyttänyt nuori tarvitsee Voltaren Fortea kiven lievitykseen kauemmin kuin 7 vuorokautta tai jos oireet pahenevat, tulee ottaa yhteyttä lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Voltaren Forte

Kerro lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käytänyt tai saatat käytävä muidut lääkevalmisteet.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäristä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Voltaren Fortea ei saa käyttää raskauden viimeisten kolmen kuukauden aikana, koska se voi aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapselle ja voi haitata synnytystä. Voltaren Fortea saa käyttää ensimmäisten kuuden raskauskuukauden aikana vain, jos lääkäri neuvoo sinua tekemään niin. Annoksen on oltava mahdollisimman pieni ja hoidon keston mahdollisimman lyhyt.

Suun kautta otettavat diklofenaakkia sisältävät lääke-muodot (esim. tabletit) voivat aiheuttaa haittavaikutuksia syntymättömälle lapselle. Ei tiedetä, aiheuttaako Voltaren Forte -valmiste saman riskin myös, kun sitä käytetään ihon kautta.

Voltaren Fortea ei saa käyttää imetysaikana, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin, koska pieni määriä diklofenaakkia erittyy rintamaitoon. Voltaren Fortea ei saa levittää imettävien naisten rinnolle eikä muille laajolle ihoalueille, eikä sitä saa käyttää pitkiä aikoja.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Iholle käytetty Voltaren Forte -geeli ei vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

Voltaren Forte -geeli sisältää propyleeniglykolia ja butylyhydroksitolueenia

- propyleeniglykoli voi aiheuttaa ihoärsytystä
- butylyhydroksitolueeni voi aiheuttaa paikallisia ihortreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.

Voltaren Forte -geeli sisältää hajustetta

Voltaren Forte -geeli sisältää hajustetta, jossa on bent-syylialkoholia, sitronellolia, kumariinia, d-limoneenia, eugenolia, geraniolia ja linalolia, jotka saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita.

3. Miten Voltaren Forte -geeliä käytetään

Käytä tätä läkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkienkilökunta on määritellyt. Tarkista ohjeet lääkäristä tai apteekista, jos olet epävarma.

Kuinka paljon Voltaren Fortea käytetään

Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret

Voltaren Fortea hierotaan kipeytynelle alueelle kevyesti 2 kertaa päivässä 12 tunnin välein (mieluiten aamulla ja illalla).

Miten Voltaren Fortea levitetään

1. Avaamattomat Voltaren Forte -tuubit on suljettu sinettiillä, joka on murrettava ennen ensimmäistä käytötä. Sinetti kierretään irti ja poistetaan kierrekorkin pään avulla.
2. Levitä kevyesti hieroon pieni määri geeliä ihoon sille alueelle, missä sinulla on kipua tai turvotusta. Tarvittaavaan geelin määriin vaikuttaa kipeytynneen tai turvonneen alueen suuruus. Noin 5 cm geeliä yleensä

riittää esimerkiksi nilkan hoitamiseen; suurempien alueiden hoitamiseen voi tarvita kerralla 10 cm geeliä. Saatavat huomata viilentävän vaikutuksen, kun hierot geeliä iholle.

Käytä Voltaren Forte -geeliä ainoastaan iholle.

Annostelun jälkeen:

- Kädet on pyyhittää esim. imukykyisellä paperipyynnellä ja sitten ne pestäään, elleivät kädet ole hoidettava alue. Imukykyinen paperi on heittettävä roskiin käytön jälkeen.
- Odota, että Voltaren Forte -geeli kuivuu iholla ennen suihkuun tai kylpyyn menoaa.

Kuinka kauan Voltaren Fortea käytetään

Aikuiset ja 14 vuotta täyttäneet nuoret:

- Älä käytä Voltaren Fortea nyrrähdyksistä, venähdyksistä, urheiluvammoista tai liikarasisuudesta johtuvan lihas- ja niveliivin hoidossa kauemmin kuin 2 viikon ajan.

Aikuiset (18 vuotta täyttäneet)

- Älä käytä Voltaren Fortea niveliikosta johtuvan kiven hoidossa kauemmin kuin 3 viikon ajan.

Lääkäri voi suosittela pitempää hoitoa.

Jolleivät kipu ja turvotus lievity tai jos ne pahenevat viikon kuluessa geelin käytön aloittamisesta, ota yhteys lääkäriin.

Jos käytät enemmän Voltaren Fortea kuin sinun pitäisi

Jos pursotat tuubista enemmän geelia kuin sinun pitäisi, pyyhi ylimääräinen geeli pois imukykyisellä paperilla, ennen kuin hierot sen ihoon.

Jos olet vahingossa niellet tai lapsi on niellet Voltaren Forte -geelia, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkystystokeskuseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohtat käyttää Voltaren Fortea

Jos olet unohtanut käyttää Voltaren Fortea oikeaan aikaan, hiero sitä iholle niin pian kuin mahdollista ja jatka sitten käytööä tavalliseen tapaan. Älä käytä kak sinkertaista määrää korvatakseen unohtuneen kerran.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käännä lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jotkut harvinaiset tai hyvin harvinaiset haittavaikutukset saattavat olla vakavia.

Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergioireista, LOPETA Voltaren Forten käytössä ja ota heti yhteyttä lääkäriin tai apteekkienkilökuntaan:

- Rakkulainen ihottuma: nokkosihottuma (saattaa esiintyä 1–10 käyttäjällä 10 000:sta).
- Hengityksen vinkuminen, hengenahdistus tai puristava tunne rinnassa (astma) (saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä 10 000:sta).
- Kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoaminen (saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä 10 000:sta).

Mut mahdolliset haittavaikutukset ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä (jos olet huolissasi jostakin haittavaikutuksesta, ota yhteys lääkäriin tai apteekkienkilökuntaan).

Yleisiä haittavaikutuksia

(saattaa esiintyä 1–10 käyttäjällä 100:sta)

- Ihottuma, ihon kutina, punoitus ja kirvelly.
- Ihottuma, ihon kutina, punoitus ja kirvelly.

Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia

(saattaa esiintyä alle 1 käyttäjällä 10 000:sta)

- Iho saattaa tulla herkemäksi auringonvalolle. Mahdollisia oireita ovat kutiseva, auringon polttama iho, turvotus ja rakkulat.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkäriille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55, 00034 FIMEA

5. Voltaren Forte -geelin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä läkettä pakkaussessä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolojanteita.

Älä heitä lääkevalmisteiä viemäriin (esim. WC:n tai pesualtaan kautta). Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämestä apteekista. Näin menetellen autat suojelemaan luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Voltaren Forte -geeli sisältää

- Vaikuttava aine on diklofenaakkidietyyliamiini. Yksi gramma geeliä sisältää 23,2 mg diklofenaakkidietyyliamiinia, mikä vastaa 20 mg diklofenaakkinatriumia.

- Apuaineet: yksi gramma geeliä sisältää 50 mg propyleeniglykolia ja 0,2 mg butylylihydroksitolueenia.

- Muut aineet ovat dietyliliamiini, isop

Voltaren Forte

diklofenakdietylamin

23,2 mg/g

gel



Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till läkaren eller apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Voltaren Forte gel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren Forte gel
3. Hur du använder Voltaren Forte gel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Voltaren Forte gel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Voltaren Forte gel är och vad det används för

Den aktiva substansen diklofenak i Voltaren Forte hör till en grupp läkemedel som kallas icke-steroida anti-inflammatoriska (NSAID) värvärmecinier. Voltaren Forte har utvecklats speciellt för att masseras in i huden.

Voltaren Forte används för att lindra smärta och att minska inflammation och svullnad vid många värtillstånd i lederna och musklerna.

Vuxna och ungdomar som fyllt 14 år:

Voltaren Forte gel kan användas vid lokal behandling av muskel- och ledvärv förorsakade av stukningar, försträckningar, idrottsskador eller av överansträngning.

Vuxna (personer över 18 år):

Voltaren Forte gel lämpar sig också för kortvarig lokal behandling av smärta till följd av artros i knän och fingrar hos patienter där läkare säkerställt diagnosen.

Kan även ordinaras av läkare för annat användningsområde.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Voltaren Forte gel**Använd inte Voltaren Forte gel**

- om du är allergisk mot aktiv substans (diklofenak) eller mot andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som används för behandling av värk, feber eller inflammation, så som ibuprofen eller acetilsalicylsyra (läkemedel som används också för att förhindra koagulering av blodet) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du är osäker, fråga läkare eller apotekspersonal. Symtom av en allergisk reaktion kan vara: vinande andning, andnöd (astma), utslag med blåsor, nässelutslag, svullnad av ansiktet eller tungan och snuvighet.
- om du är gravid i den sista tredjedelen av graviditeten.
- om du är yngre än 14 år.

Använd inte Voltaren Forte, om någon av detta gäller dig.**Varningar och försiktighet**

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren Forte.

- Använd inte Voltaren Forte gel på skär- eller öppna sår eller på hud med utslag.
- Avsluta behandlingen om hudutslag uppkommer efter applikation av preparatet.
- Använd inte mer gel än rekommenderat eller under längre tid än rekommenderas, såvida inte läkaren ordinerat detta.

Voltaren Forte gel är avsedd endast för användning på huden. Sätt den inte i munnen och svälj den inte. Undvik att få Voltaren Forte gel i ögonen. Om du får gel i ögonen, skölj ögonen noggrant med rent vatten. Kontakta läkare eller apotekspersonal, om besväret i ögonen fortsätter.

– Stödförband eller andra skydd som används vid skador förknippade med försträckningar kan användas med Voltaren Forte men använd inte Voltaren Forte under lufttäta (plast) förband.

Om du har några frågor, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du använder Voltaren Forte.

Barn och ungdomar under 14 år

Information gällande säkerhet och effekt hos barn och ungdomar under 14 år är begränsad (se avsnitt Använd inte Voltaren Forte).

Om en ungdom som fyllt 14 år behöver Voltaren Forte för behandling av smärta i mer än 7 dagars tid, eller om symtomen förvärras, bör läkare kontaktas.

Andra läkemedel och Voltaren Forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyttjar har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Voltaren Forte gel får inte användas under de tre sista graviditetsmånaderna, eftersom det kan skada ditt ofödda barn eller orsaka problem under förlossningen. Voltaren Forte gel får användas endast på läkarordination under de sex första graviditetsmånaderna och dosen ska vara så låg som möjligt och behandlingen så kort som möjligt.

Orala former (t.ex. tabletter) av diklofenak kan ha negativa effekter på ditt ofödda barn. Det är inte känt om samma risk gäller för Voltaren Forte när det används på huden.

Voltaren Forte gel får användas endast på läkarordination under amning, eftersom diklofenak går över i bröstmjölken i små mängder. Voltaren Forte gel ska dock inte appliceras på brösten hos ammande kvinnor eller på större hudområden och ska inte heller användas under längre tider.

Körförstående och användning av maskiner

Voltaren Forte gel, som används på huden påverkar inte förstående att köra bil eller använda maskiner.

Voltaren Forte innehåller propylenglykol och butylhydroxitoluen

- propylenglykol kan ge hudirritation.
- butylhydroxitoluen kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller irritation i ögon och på slemhinnor.

Voltaren Forte innehåller parfym

Voltaren gel innehåller doftämnen med bensylalkohol, citronellol, kumarin, limonen, eugenol, geraniol, linalol, vilka kan orsaka allergiska reaktioner.

3. Hur du använder Voltaren Forte gel

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Hur mycket Voltaren Forte ska man använda?**Vuxna samt ungdomar som fyllt 14 år:**

Voltaren Forte gelens masseras försiktigt in i området där det gör ont 2 gånger per dag med 12 timmars mellanrum (helst på morgonen och på kvällen).

Hur ska Voltaren Forte gel appliceras

1. Voltaren Forte tuber är stängda med försegling, som måste brytas före första användningsgången. Förseglingen på plasttuben vrids av med hjälp av skruvkorkens baksida.
2. Massera en liten mängd gelen försiktigt in på det ömma eller svullna hudområdet. Mängden som behövs beror på det smärtsamma eller svullna områdets storlek. I regel cirka 5 cm gelsträng är tillräckligt t.ex. för behandling av en vrist; för behandling av

större områdena kan 10 cm gelsträng vara nödvändigt med en gång. Det är möjligt att du märker en mild, svälvande verkan, då du gnider in gelen i huden. Voltaren Forte ska endast användas på huden.

Efter applicering:

- Händerna ska torkas med t.ex. absorberande pappershandduk och sedan tvättas om inte händerna är det område som behandlas. Pappershandduken ska kastas i papperskorgen efter användning.
- Vänta tills Voltaren Forte gel har torkat innan du badar eller duschar.

Hur länge ska Voltaren Forte användas**Vuxna och ungdomar som fyllt 14 år:**

- Använd inte Voltaren Forte längre än 2 veckor vid behandling av muskel- och ledvärv förorsakade av stukningar, sträckningar, idrottsskador eller av överansträngning.

Vuxna (personer över 18 år):

- Använd inte Voltaren Forte längre än i 3 veckors tid vid behandling av smärta till följd av artros.

En läkare kan eventuellt rekommendera en längre behandlingstid.

Om inte smärtan och svullnaden har lindrats eller om den har blivit värre under en vecka efter påbörjad behandling, kontakta läkare.

Om du har använt för stor mängd av Voltaren Forte

Om du av misstag tryckt en större mängd gelen ur tuben än du borde, stryk bort extra gelen med absorberande pappershandduk innan du masserar den in i huden.

Om du eller ett barn har av misstag svalt Voltaren Forte, alltid kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Voltaren Forte

Om du har glömt att använda Voltaren Forte vid den tidpunkt du borde, applicera den på hudområdet så snart som möjligt och fortsätt sedan att använda den som vanligt. Använd inte dubbel mängd för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.**4. Eventuella biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa sällsynta eller mycket sällsynta biverkningar kan vara allvarliga.

Om du drabbas av någon av följande allergiska symtom, AVBRYT användningen av Voltaren Forte och kontakta läkare eller apotekspersonal:

- Hudutslag med blåsor; nässelutslag (*kan förekomma hos 1–10 av 10 000 användare*).
- Vinande andning, andnöd eller tryckande känsla i bröstet (astma) (*kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare*).
- Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (*kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare*).
- Andra möjliga biverkningar är i allmänhet lindriga och övergående (*om du är orolig över någon biverkning, kontakta läkare eller apotekspersonal*).

Vanliga biverkningar

(*kan förekomma hos 1–10 av 100 användare*)

- Utslag, klåda, rodnad och sveda på huden.

Mycket sällsynta biverkningar

(*kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare*)

- Hudens kan bli känsligare för solljus. Möjliga symtom är kliande, solbränd hud, svullnad och blåsor.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

5. Hur Voltaren Forte gel ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet (t.ex. via toaletten eller lavoaren). Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar**Innehållsdeklaration**

– Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin. Ett gram gel innehåller 23,2 mg diklofenakdietylamin, som motsvarar 20 mg diklofenaknatrium.

– Hjälpämnen: ett gram gel innehåller 50 mg propylenglykol och 0,2 mg butylhydroxitoluen.

– Övriga innehållsämnen är dietylamin, isopropylalkohol, karbomer (akrylyrapolymer), kokoylkapryolkaprat, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, oleylalkohol, parfym (Perfume eucalyptus sting) och renat vatten. För ytterligare information, se avsnitt 2 av denna bipacksedel.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar**Utseende**

En vit eller nästan vit, mjuk, homogen, icke-fet, krämliknande gel som känns svälvande på huden och som inte lämnar fläckar.

Förpackningsstorlekar**Plasttuber:**

Utan recept: 30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g eller 150 g.

Receptbelagt: 180 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Haleon Denmark ApS

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmark

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tel: 0800 77 40 80

E-mail: mystery.nd@haleon.com

Denna bipacksedel ändrades senast 29.08.2024

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas webbplats www.fimea.fi.

Varumärken ägs av eller licensieras till Haleon-k