

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

## RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

# Advil

**HALEON**

## Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort

**Caplets d'ibuprofène, de chlorhydrate de pseudoéphédrine et de maléate de chlorphéniramine**

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre **Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort** et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur **Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort** sont disponibles.

### Mises en garde et précautions importantes

- Les patients atteints de diabète, de glaucome ou qui ont de la difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate ne doivent pas prendre ce médicament, sauf sur l'avis d'un médecin.
- La prudence est de mise chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, d'hypertension ou d'une affection pouvant entraîner une accumulation excessive de liquide dans les tissus.
- La prudence est de mise chez les patients sujets aux irritations du tube digestif, en particulier ceux ayant des antécédents d'ulcère gastroduodéal, de diverticulose ou d'autres maladies inflammatoires du tube digestif comme la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Les symptômes peuvent comprendre une sensation d'évanouissement, le vomissement de sang et des selles sanguinolentes ou noirâtres. Le risque de saignement dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hémorragiques, celles qui prennent un anticoagulant, des corticostéroïdes, des médicaments qui contiennent un AINS comme l'acide acétylsalicylique (AS), l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance, et celles qui consomment 3 verres d'alcool ou plus par jour en même temps que ce produit.
- Utiliser avec prudence chez les patients présentant un risque de problèmes rénaux, notamment les personnes qui souffrent d'une insuffisance cardiaque ou d'une dysfonction hépatique, les personnes âgées ou les personnes qui prennent des diurétiques.
- Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort ne doit pas être utilisé pendant le troisième trimestre de la grossesse.
- Parler à votre médecin si vous tentez de concevoir un enfant, êtes au premier ou au deuxième trimestre de la grossesse, ou vous allaitez.
- Cesser l'emploi immédiatement en cas d'hématurie (sang dans l'urine), de douleur à la miction, de difficulté à uriner ou d'envies fréquentes et urgentes d'uriner.

### Pourquoi utilise-t-on Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort?

• Soulagement temporaire rapide des symptômes mixtes du rhume et de la grippe, y compris la congestion nasale, la fièvre, les courbatures légères, le mal de gorge, les maux de tête, l'écoulement nasal, les éternuements, la démangeaison des yeux, le larmoieiment et la douleur sinusale.

### Comment Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort agit-il?

L'ibuprofène réduit la douleur et abaisse la fièvre. Le chlorhydrate de pseudoéphédrine est un décongestionnant nasal. Le maléate de chlorphéniramine est un antihistaminique.

### Quels sont les ingrédients d'Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort?

Ingrédients médicinaux : ibuprofène, chlorhydrate de pseudoéphédrine et maléate de chlorphéniramine.

Ingrédients non médicinaux : cire de carnauba, amidon de maïs, croscarmellose sodique, bêhénate de glycérol, hypromellose, oxyde de fer noir, oxyde de fer jaune, cellulose microcristalline, polydexrose, amidon prégélatinisé, propylèneglycol, dioxyde de silicium et dioxyde de titane.

### Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort se présente sous la forme posologique suivante :

Chaque caplet contient 400 mg d'ibuprofène, 60 mg de chlorhydrate de pseudoéphédrine et 4 mg de maléate de chlorphéniramine.

### Ne prenez pas Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort si :

- vous êtes allergique ou hypersensible à l'acide acétylsalicylique (AAS), à l'ibuprofène, à d'autres salicylates, à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), à la pseudoéphédrine, à d'autres amines sympathomimétiques, au maléate de chlorphéniramine ou à l'un des ingrédients d'Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort (voir les ingrédients non médicinaux dans le présent feuillet);
- vous présentez un ulcère de l'estomac actif ou récurrent, des saignements gastro-intestinaux ou une maladie intestinale inflammatoire active (p. ex. maladie de Crohn, colite);
- vous prenez un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO), entre autres contre la dépression ou la maladie de Parkinson ou avez cessé de prendre un IMAO dans les 14 derniers jours, ou si vous prenez de l'AAS ou un autre AINS, y compris un autre produit renfermant de l'ibuprofène;
- vous avez des polypes nasaux (enflure de l'intérieur du nez);
- vous êtes asthmatique;
- vous présentez une manifestation allergique, telle que l'anaphylaxie (réaction allergique soudaine et grave, pouvant être mortelle), l'urticaire, la rhinite (congestion nasale ou écoulement nasal pouvant être causé par des allergies), les éruptions cutanées ou d'autres symptômes d'allergies;
- vous êtes déshydraté (importante perte de liquides) en raison de vomissements, de diarrhée ou d'une ingestion insuffisante de liquides;
- vous avez reçu un diagnostic d'hypertension grave ou souffrez d'une maladie du cœur;
- vous êtes sur le point de subir ou avez récemment subi une chirurgie cardiaque;
- vous êtes atteint d'une maladie grave du foie;
- vous avez une maladie grave des reins;
- vous avez un taux élevé de potassium dans le sang;
- vous êtes atteint d'une maladie de la glande thyroïde;
- vous êtes atteint du syndrome de Raynaud (un trouble du système circulatoire);
- vous souffrez de lupus érythémateux disséminé;
- vous êtes dans les 3 derniers mois de votre grossesse.

### Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort, afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment :

- si vous avez un trouble de la coagulation (comme l'hémophilie);
- si vous avez des troubles respiratoires ou une maladie pulmonaire chronique (comme l'asthme, l'emphysème ou la bronchite chronique);
- si vous êtes diabétique;
- si vous avez de la difficulté à uriner en raison d'une hypertrophie de la prostate ou d'une obstruction du col vésical;
- si vous avez un glaucome;
- si vous souffrez d'hypertension artérielle;
- si vous avez une maladie des reins légère ou modérée;
- si vous avez une maladie du foie légère ou modérée;
- si vous avez une autre maladie grave;
- si vous êtes sous surveillance médicale pour un problème grave;
- si vous tentez de concevoir un enfant, êtes enceinte ou vous allaitez;
- À partir de la 20<sup>e</sup> semaine de grossesse, votre prise d'AINS peut devoir être surveillée par un professionnel de la santé en raison du risque rare de troubles rénaux chez l'enfant à naître, ce qui peut entraîner une réduction de la quantité de liquide amniotique ou d'autres complications.
- si vous prenez des sédatifs ou des tranquillisants (ils peuvent accroître la somnolence), ou d'autres médicaments, y compris ceux en vente libre;
- Faire preuve de prudence chez les personnes âgées;
- L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

### Autres mises en garde à connaître :

- L'utilisation d'AINS comme Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort pendant le deuxième trimestre de la grossesse doit être limitée à la dose la plus faible requise pour la plus courte période possible.
- Évitez de fumer ou de boire de l'alcool pendant l'utilisation de ce produit. L'alcool peut accroître la somnolence.

**Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé**

que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

**Les produits ci-dessous pourraient interagir avec Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort :**

- l'acétaminophène;
- l'acide acétylsalicylique (AAS);
- les médicaments contre les allergies;
- les anticoagulants (médicaments qui éclaircissent le sang);
- les antidépresseurs;
- les antihypertenseurs (médicaments contre l'hypertension);
- les antibiotiques (lévofloxacine et quinolone);
- les benzodiazépines;
- les médicaments contre le rhume;
- les corticostéroïdes;
- la cyclosporine;
- les inhibiteurs du CYP2C9 (fluconazole et voriconazole);
- les médicaments contre le diabète (y compris l'insuline et les antidiabétiques oraux);
- la digoxine;
- les diurétiques (médicaments qui aident à uriner);
- le lithium;
- le méthotrexate;
- les inhibiteurs de la monoamine-oxydase;
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris le naproxène et l'ibuprofène;
- la phénytoïne;
- le probénécide;
- la thyroxine;
- les tranquillisants ou d'autres sédatifs;
- la zidovudine.

### Comment Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort se prend-il?

#### Dose habituelle :

- Adultes et enfants (de 12 à 65 ans) : Prendre 1 caplet toutes les 4 à 6 heures au besoin. Ne prenez pas plus de 3 caplets en 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.
- Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

#### Surdose

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris trop d'Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

#### Dose omise

Continuer de prendre 1 caplet toutes les 4 à 6 heures, au besoin, après l'oubli d'une dose. Si vous oubliez de prendre une dose, ne doublez pas la dose recommandée.

#### Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort?

#### Cessez d'utiliser et consultez un médecin si :

- vous présentez des signes de saignement dans l'estomac;
- les maux de gorge durent plus de 2 jours;
- les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 5 jours;
- la fièvre dure plus de 3 jours;
- vous êtes nerveux, étourdi ou n'arrivez pas à dormir;
- tout nouveau symptôme se manifeste.

Lorsque vous prenez Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Prenez ce médicament avec de la nourriture ou du lait en cas de maux d'estomac.

Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort peut occasionnellement causer des effets secondaires indésirables, comme des brûlures d'estomac, de la constipation, des nausées, des ballonnements, de la sécheresse buccale, de la nervosité ou de l'insomnie. Cessez d'utiliser ce médicament et communiquez avec un professionnel de la santé si ces symptômes s'aggravent ou persistent.

Ce produit peut causer de la somnolence. Veuillez faire preuve de prudence si vous devez conduire, un véhicule ou manœuvrer de la machinerie lourde.

On peut diminuer le risque d'effets secondaires en prenant la plus petite dose pour la plus courte période possible.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
<b>PEU COURANT</b>			
Apparition soudaine de maux de tête sévères accompagnés de confusion, de convulsions, de nausées ou de changements dans la vision. Ces signes pourraient indiquer un problème grave.			✓
Symptômes d'une réaction allergique, y compris <span> </span> : éruption cutanée, démangeaisons/rougeurs importantes, ampoules, enflure ou difficulté à respirer			✓
Vomissement de sang, selles sanguinolentes ou noirâtres			✓
Douleur abdominale, vomissements, diarrhée		✓	
Acouphène ou bourdonnements		✓	
d'oreilles/étourdissements		✓	
Changement de la vision		✓	
Rétention d'eau		✓	

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodat qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### Conservation

Conserver à la température ambiante (de 15 à 30 °C).

Garder hors de la portée et de la vue des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant.

#### Pour en savoir plus sur Advil Rhume, Sinus et Grippe Extra Fort :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), le site Web du fabricant (www.advil.ca), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-788-8181.

Haleon Canada SRI, Mississauga, ON L5R 4B2

Le présent feuillet a été rédigé par Haleon Canada SRI.

Date de l'autorisation : 16 mai 2025

6200000220458 6200000220459