



**IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT**

**PARTIE III - RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR**

**Advil<sup>MD</sup> Extra Fort – LIQUI-GELS<sup>MD</sup>**  
**Capsules d'ibuprofène à 400 mg**  
**(sous forme d'acide libre et de sel de potassium)**

Le présent document constitue le troisième et dernière partie de la monographie de produit publiée par suite de l'homologation des LIQUI-GELS Advil Extra Fort pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent document n'est ni un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet des LIQUI-GELS Advil Extra Fort. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**AU SUJET DE CE MÉDICAMENT**

**Les raisons d'utiliser ce médicament :**

Pour le soulagement temporaire de migraines légères ou modérées et des symptômes qui y sont associés tels que les nausées et le sensibilité à la lumière et au bruit.  
Pour le soulagement rapide, efficace et temporaire des douleurs et courbatures légères d'origine musculaire et articulaire, des douleurs en général, des maux de dos, des entorses et foulures, des douleurs inflammatoires associées à l'arthrite et au surmenage physique et athlétique (p. ex., entorses et foulures), des maux de tête comme les céphalées de tension, des maux de dents, des crampes menstruelles, des douleurs et courbatures associées au rhume balal ou à la grippe, ainsi qu' pour alléger la fièvre. Des études cliniques ont démontré un soulagement de longue durée de la douleur allant jusqu'à 8 heures.

**Les effets de ce médicament :**

Les LIQUI-GELS Advil Extra Fort contiennent de l'ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui peut réduire la production par l'organisme de substances chimiques qui provoquent la douleur et l'inflammation.

**Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :**

- Ne pas utiliser les LIQUI-GELS Advil Extra Fort si :
  - vous présentez un ulcère de l'estomac actif ou récurrent ou saignements gastro-intestinaux ou une maladie intestinale inflammatoire active (p. ex., maladie de Crohn, colite),
  - vous prenez de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou un autre AINS, ou un autre produit renfermant de l'ibuprofène,
  - vous avez une hypersensibilité ou une allergie à l'AAS, à l'ibuprofène, à d'autres salicylates, à d'autres AINS ou à l'un ou l'autre des ingrédients des LIQUI-GELS Advil Extra Fort (voir la section des ingrédients non médicamenteux de la boîte ou la section sur la composition),
  - vous souffrez de polyarthrose (enflure de l'intérieur du nez), ou de manifestations allergiques comme l'asthme, l'anaphylaxie (réaction allergique soudaine et grave, pouvant être causée par des allergies), les éruptions cutanées ou d'autres symptômes d'allergie,
  - vous souffrez de déshydratation (importante perte de liquide) causée par des vomissements, de la diarrhée, une absorption insuffisante de liquides ou de saignements,
  - vous avez reçu un diagnostic d'hypertension grave ou de maladie coronarienne grave,
  - vous êtes sur le point de subir ou venez de subir une chirurgie du cœur,
  - vous souffrez d'une maladie grave du foie ou des reins,
  - vous avez un taux élevé de potassium dans le sang,
  - vous souffrez de lupus érythémateux disséminé,
  - vous êtes au troisième trimestre de votre grossesse.

Les LIQUI-GELS Advil Extra Fort NE doivent PAS être pris par des personnes de moins de 12 ans, car la sûreté et l'efficacité de ce produit N'ont PAS été établies dans ce groupe d'âge. Les enfants de moins de 12 ans doivent prendre Advil pour enfants.

**L'ingrédient médicamenteux :**

Ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium).

**Les ingrédients non médicamenteux importants :**

Gélatine, lactine (soja), triglycérides à chaîne moyenne, encre pharmaceutique, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol.

**La présentation :**

Chacun des dix (10) sachets de LIQUI-GELS Advil Extra Fort contient 400 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium).

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

**Mises en garde et précautions importantes**

- La prudence est de mise chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, d'hypertension ou d'une affection pouvant entraîner une accumulation excessive de liquide dans les tissus. • La prudence est de mise chez les patients prédisposés aux infections du tractus gastro-intestinal, y compris ceux qui ont des antécédents d'ulcères gastro-intestinaux. Le risque de saignement dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hématologiques, celles qui prennent un anticoagulant (médicament qui fluidifie le sang), un agent sédatif, des médicaments qui contiennent un AINS comme l'acide acétylsalicylique (AAS), l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance, et celles qui consomment 3 verres d'alcool ou plus par jour en même temps que ce produit. • La prudence est de mise chez les patients présentant un risque de problèmes rénaux, notamment les personnes âgées et ceux utilisant des diurétiques. • Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de difficultés ou de douleurs lorsque vous urinez. • L'utilisation des LIQUI-GELS Advil Extra Fort doit être évitée.

**Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre les LIQUI-GELS Advil Extra Fort si :**

- vous souffrez ou avez déjà souffert d'ulcères de l'estomac, de diabète, d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, de maladie cardiaque, de maladie thyroïdienne, d'asthme, d'une maladie ou foie ou des reins, de glaucome, d'un trouble de la coagulation (comme l'hémophilie) ou de toute autre maladie grave, vous êtes sous surveillance médicale pour tout problème grave, vous venez de concevoir un enfant, vous êtes au premier ou, au deuxième trimestre de votre grossesse, vous allaitez ou vous prenez d'autres médicaments, y compris des médicaments en vente libre.

Faire preuve de prudence chez les personnes âgées.

**L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.**

**Cessez d'utiliser et consultez un médecin si :** • vous avez des signes de saignement dans l'estomac, • la douleur s'aggrave ou persiste plus de 3 jours, • la fièvre s'aggrave ou persiste plus de 3 jours, • tout nouveau symptôme se manifeste.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

**Ne prenez pas les LIQUI-GELS Advil Extra Fort si vous prenez :**

- de l'acide acétylsalicylique à faible dose tous les jours (AAS, 81-325 mg), Consultez un médecin ou un pharmacien, car l'ibuprofène peut interférer avec les bénéfices préventifs de l'AAS,
- de l'AAS ou un autre médicament anti-inflammatoire.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez aussi un médicament sur ordonnance ou en vente libre appartenant à l'une des catégories suivantes (liste non exhaustive) :  
• médicaments à l'usage préventif de la thrombose (médicaments qui épaississent le sang),  
• digoxine, antidiabétiques oraux et insuline,  
• diurétiques,  
• méthotrexate,  
• lithium,  
• médicaments à l'usage préventif de la thrombose (médicaments qui fluidifient le sang),  
• la cyclosporine, la phénytoïne, les corticostéroïdes ou les benzodiazépines, autres AINS, ou médicaments contre l'hypertension. Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, discutez-les avec votre médecin ou votre pharmacien.

**UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT**

**Psychologie habituelle :**

Pour les migraines : Adultes et enfants de 12 ans ou plus : Prendre 1 Liqui-Gel Extra Fort dès l'apparition des symptômes, puis toutes les 6 à 8 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de 3 LIQUI-GELS en 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.

Pour tout autre usage : Adultes et enfants de 12 ans ou plus : Prendre 1 LIQUI-GEL Extra Fort toutes les 6 à 8 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de 3 LIQUI-GELS en 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.

Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur. Ne pas donner à des enfants de moins de 12 ans, Les enfants de moins de 12 ans doivent prendre Advil pour enfants.

**Surdose :**

En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison, même en l'absence de symptômes.

**Dose oubliée :**

Prenez la dose oubliée dès que vous y pensez. Si l'heure de votre prochaine dose approche, attendez jusqu'à ce moment pour prendre votre médicament et ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Ne prenez pas deux doses à la fois.

**EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE**

En cas de maux d'estomac, prenez les comprimés avec du lait ou des aliments.

Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des frissons ou des bouffées de chaleur dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des fourmillements ou tout changement de la vision, des démangeaisons, de la rétention liquidienne, des essoufflements, une respiration sifflante, de la difficulté à respirer ou une sensation de serrement dans la poitrine, de l'urticaire, de l'enflure, des démangeaisons, des éruptions cutanées, des rougeurs, des cloques, du sang dans les vomissements ou dans les selles, des selles noires, une jaunisse (jaunissement du blanc des yeux ou de la peau causé par des problèmes de foie) ou tout autre effet secondaire ou symptôme inhabituel se manifestent pendant la prise des LIQUI-GELS Advil Extra Fort, cessez immédiatement l'utilisation du produit et communiquez avec un médecin.

On peut réduire au minimum le risque d'effets secondaires en prenant la plus petite dose pour la plus courte période possible.

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise des LIQUI-GELS Advil Extra Fort, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

**Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En visitant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/hp-mvs/mv/medef/rapport-badstar/ov/index-fra.php>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courriel ou par télécopieur, ou

Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

**REMARQUE :** Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseil médical.

**COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT**

Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Protéger de la lumière. Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. Les LIQUI-GELS Advil Extra Fort en format de 24 sont munis d'un bouton à l'épreuve des enfants.

**POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS**

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, présente pour les professionnels de la santé, en communiquant avec le promoteur : **GlaxoSmithKline** Soins de santé aux consommateurs SR, Mississauga, ON L5R 4B2, au 1-888-275-9938 ou à l'adresse [www.advil.ca](http://www.advil.ca).

**GlaxoSmithKline** Soins de santé aux consommateurs SR a rédigé ce document. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés SKK.

©2021 Groupe de sociétés SKK ou son concédant de licence.

Monographie offerte sur demande aux médecins et aux pharmaciens.

LIQUI-GELS<sup>MD</sup> est une marque de commerce ou une marque déposée de Catalyst Pharma Solutions.

Dernière révision : 7 mai 2020



PA1171667 PA1171668