

IMPORTANT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

PARTIE III - RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR



Capsules d'ibuprofène à 200 mg (sous forme d'acide libre et de sel de potassium)

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de la « monographie de produit » publiée par suite de l'homologation des **LIQUI-GELS Advil** pour la vente au Canada et s'adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents au sujet des **LIQUI-GELS Advil**. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

Pour le soulagement temporaire des migraines légères ou modérées et des symptômes qui y sont associés tels que les nausées et la sensibilité à la lumière et au bruit.
Pour le soulagement rapide, efficace et temporaire des douleurs et courbatures légères d'origine musculaire et articulaire, des douleurs en général, des maux de dos, des entorses et foulures, des douleurs inflammatoires associées à l'arthrite et au surmenage physique et athlétique (i.e., ex., entorses et foulures), des maux de tête comme les céphalées de tension, des maux de dents, des crampes menstruelles, des douleurs et courbatures associées au rhume (mal de la grippe), ainsi que pour abaisser la fièvre.

Les effets de ce médicament :

Les **Liqui-Gels Advil** contiennent de l'ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui peut réduire la production par l'organisme de substances chimiques qui provoquent la douleur et l'inflammation.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament :

Ne pas utiliser les Liqui-Gels Advil si :

- vous présentez un ulcère de l'estomac actif ou récurrent, des saignements gastro-intestinaux ou une maladie intestinale inflammatoire active (i.e., ex., maladie de Crohn, colite);
- vous prenez de l'acide acétylsalicylique (AAS) ou un autre anti-inflammatoire non stéroïdien, y compris un autre produit renfermant de l'ibuprofène;
- vous avez une hypersensibilité ou une allergie à l'AAS, à l'ibuprofène, à d'autres salicylés, à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou à l'un ou l'autre des ingrédients des **Liqui-Gels Advil** (voir la section des ingrédients non médicamenteux de la boîte ou la section sur la composition);
- vous souffrez de douleurs nasales (enflure de l'intérieur du nez), ou de manifestations allergiques comme l'asthme, l'angioedème (réaction allergique soudaine et grave, pouvant être mortelle), l'urticaire, la hémorragie nasale ou écoulement nasal pouvant être causés par des allergènes, les éruptions cutanées ou d'autres symptômes allergiques;
- vous souffrez de déshydratation (importante perte de liquide) causée par des vomissements, de la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides;
- vous avez reçu un diagnostic d'hypertension grave ou de maladie coronarienne grave;
- vous êtes sur le point de subir ou venez de subir une chirurgie ou une;
- vous souffrez d'une maladie grave du foie ou des reins;
- vous avez un taux élevé de potassium dans le sang;
- vous souffrez de liquides érythrocytaires épaissies;
- vous êtes au troisième trimestre de votre grossesse.

Les **Liqui-Gels Advil NE doivent PAS** être pris par des personnes de moins de 12 ans, car la sécurité et l'efficacité de ce produit **LIQUI-GELS Advil** établies dans ce groupe d'âge. Les enfants de moins de 12 ans doivent prendre **Advil** pour enfants.

L'ingrédient médicamenteux :

Ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium).

Les ingrédients non médicamenteux importants :

Voit **MP 3 FDC**, phtaline, lactose, polyéthylène glycol, hydroxyde de chaux moyenne, entre autres : carboxyméthylcellulose, polyéthylène glycol, hydroxyde de potassium, eau purifiée, sorbitane, sorbitol.

La présentation :

Chaque capsule remplit de liquide contient 200 mg d'ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Mises en garde et précautions importantes

- La prudence est de mise chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, d'hypertension ou d'une affection pouvant entraîner une accumulation excessive de liquide dans les tissus. • La prudence est de mise chez les patients prédisposés aux migraines du tractus gastro-intestinal, y compris ceux qui ont des antécédents d'ulcères gastro-intestinaux. Le risque de saignement dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hémorragiques, celles qui prennent un anticoagulant (médicament qui éclaircit le sang), un agent séroïdien, des médicaments qui contiennent un AINS comme l'acide acétylsalicylique (AAS), l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et celles qui consomment 2 verres d'alcool ou plus par jour en même temps que ce produit. • La prudence est de mise chez les patients présentant un risque de problèmes rénaux, notamment les personnes âgées et ceux utilisant des diurétiques. • Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de difficultés ou de douleurs lorsque vous urinez. • L'utilisation lors de la grossesse ou de l'allaitement doit être évitée.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT de prendre les Liqui-Gels Advil si :

- vous souffrez ou avez déjà souffert d'ulcères de l'estomac, de diabète, d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, de maladie cardiaque, de maladie thyroïdienne, d'asthme, d'une maladie du foie ou des reins, de glaucome, d'un trouble de la coagulation (comme l'hémophilie) ou de toute autre maladie grave, vous êtes sous surveillance médicale pour tout problème grave, vous tentez de concevoir un enfant, vous êtes au premier

ou deuxième trimestre de votre grossesse, vous allaitez ou vous prenez d'autres médicaments, y compris des médicaments en vente libre.

Faire preuve de prudence chez les personnes âgées.
L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si : vous avez des signes de saignement dans l'estomac • la douleur s'aggrave ou persiste plus de 5 jours • la fièvre s'aggrave ou persiste plus de 3 jours • tout nouveau symptôme se manifeste.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Ne prenez pas les Liqui-Gels Advil si vous prenez :

- de l'acide acétylsalicylique à faible dose tous les jours (AAS, 81-325 mg). Consultez un médecin ou un pharmacien, car l'ibuprofène peut interférer avec les bienfaits préventifs de l'AAS;
 - de l'IMS ou un autre médicament anti-inflammatoire.
- Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez aussi un médicament (sur ordonnance ou en vente libre) appartenant à l'une des catégories suivantes (certe liste n'est PAS complète) : acétaminophène, anticoagulants (médicaments qui éclaircissent le sang), digoxine, antidiabétiques oraux et insuline, diurétiques, méthotrexate, lithium (médicaments à liaison protéique comme le probenécide, la thyroxine, les antibiotiques, la cyclosporine, la phénytoïne, les corticostéroïdes ou les benzodiazépines, autres AINS, ou médicaments contre l'hypertension. Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, dites-le à votre médecin ou à votre pharmacien.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Possibilité habituelle :

Pour les migraines : Adultes et enfants de 12 ans ou plus : Prendre 1 **Liqui-Gel** toutes les 4 heures ou 2 **Liqui-Gels** toutes les 6 à 8 heures dès l'apparition des symptômes, au besoin, ne pas prendre plus de 6 **Liqui-Gels** en 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.
Pour tout autre usage : Adultes et enfants de 12 ans ou plus : Prendre 1 **Liqui-Gel** toutes les 4 heures ou 2 **Liqui-Gels** toutes les 6 à 8 heures, au besoin, ne pas prendre plus de 6 **Liqui-Gels** en 24 heures, sauf sur l'avis d'un médecin.

Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur. Ne pas donner à des enfants de moins de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent prendre **Advil** pour enfants.

Surdose :

En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Prenez la dose oubliée dès que vous y pensez. Si l'heure de votre prochaine dose approche, attendez jusqu'à ce moment pour prendre votre médicament et ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Ne prenez pas deux doses à la fois.

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE

En cas de maux d'estomac, prenez les comprimés avec du lait ou des aliments.
Si des douleurs abdominales, des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, des tintements ou des bourdonnements dans les oreilles, de la nervosité, de l'insomnie, des étourdissements ou tout changement de la vision, des démanagements, de la rétention urinaire, des essoufflements, une respiration sifflante, de la difficulté à respirer ou une sensation de serrement dans la poitrine, de l'urticaire, de l'urticaire, des démangeaisons, des éruptions cutanées, ces rougeurs, des cloques, ou sang dans les vomissements ou dans les selles, des selles noires, une jaunisse (jaunissement du blanc des yeux ou de la peau) causés par des problèmes de foie) ou tout autre effet secondaire ou symptôme inhabituel se manifestant pendant la prise des **Liqui-Gels Advil**, cessez immédiatement l'utilisation du produit et communiquez avec un médecin.

Ce peut diminuer le risque d'effets secondaires en prenant la plus petite dose pour le plus court période possible.

Cette liste d'effets secondaires n'est pas complète. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise des **Liqui-Gels Advil**, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets indésirables soupçonnés associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des langues suivantes :

- En visitant la page Web sur la déclaration des effets indésirables (<http://www.hc-sc.gc.ca/htp-mpe/mdeff/rapport-declaration/index-eng.php>) pour savoir comment déclarer un effet indésirable en ligne, par courriel ou par télécopieur, ou;
- Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conservé à la température ambiante (15-30 °C). Protéger de la lumière.

Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. Les **Liqui-Gels Advil** en format de 32 sont munis d'un bouchon à l'encre des enfants.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Vous pouvez obtenir ce document et la monographie complète du produit, préparée pour les professionnels de la santé, en communiquant avec le promoteur, **GlaxoSmithKline** Soins de santé aux consommateurs SRI, Mississauga, ON L5R 4B2, au : 1-888-273-0939 ou à l'adresse www.advil.ca.

GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs SRI, a rédigé ce dépliant. Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.

©2021 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence. Monographie offerte sur demande aux médecins et aux pharmaciens. **Liqui-Gels MD** est une marque de commerce ou une marque déposée de **Catalent Pharma Solutions**.

Dernière révision : 7 mai 2020

PA1160501 PA1160502

