

PATIENT MEDICATION INFORMATION
READ THIS FOR SAFE AND EFFECTIVE USE OF YOUR MEDICATION
ADVI[®] MIGRAINE & HEADACHE

Ibuprofen Capsules, 400mg (as free acid and potassium salt)

Read this carefully before you start taking Advi Migraine & Headache and each time you get a refill. This leaflet is a summary and will not tell you everything about this drug. Talk to your healthcare professional about your medical condition and treatment and ask if there is any new information about Advi Migraine & Headache.

- Serious Warnings and Precautions**
- Caution in those with heart failure, high blood pressure or other conditions that may cause excess fluid collecting in tissues.
 - Caution in patients prone to gastrointestinal tract irritation, including those with a history of peptic ulcer. The chance of stomach bleeding is higher if you are age 60 or older, have had stomach ulcers or bleeding problems, take a blood thinner or steroid drug, take with other drugs containing an NSAID like acetylsalicylic acid (ASA), ibuprofen, naproxen, or prescription anti-inflammatory drugs, have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product.
 - Caution in patients at risk of kidney problems, including the elderly or those using diuretics.
 - Stop use and contact a doctor if you observe blood in the urine or you develop urgent, frequent, painful or difficult urination.
 - Advi Migraine & Headache should not be used during third trimester of pregnancy.
 - Talk to your doctor if you are trying to conceive, in your first or second trimester of pregnancy or if breastfeeding.

What is Advi Migraine & Headache used for?

• Migraine: Fast and effective temporary relief of mild to moderate migraine headaches including associated symptoms of nausea, and sensitivity to light and sound. • Also used for fast and effective temporary relief of muscle aches and pain, joint and body pain, backache, muscle sprains and strains, pain of inflammation associated with conditions including arthritis and physical or athletic overexertion (e.g. sprains or strains), headache including tension headache, dental pain, menstrual pain, aches and pain due to the common cold and flu and for reduction of fever.

Clinical studies show long lasting pain relief for up to 8 hours.

How does Advi Migraine & Headache work?

Advi Migraine & Headache is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that can reduce the chemicals produced by your body which cause pain and inflammation.

What are the ingredients in Advi Migraine & Headache?

Medicinal ingredient: Ibuprofen (present as free acid and potassium salt).
 Non-medical ingredients: DSC Yellow No. 10, FD&C Green No. 3, FD&C Red No. 40, gelatin, lecithin (soy), medium chain triglycerides, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, potassium hydroxide, purified water, sorbitan, sorbitol.

Advi Migraine & Headache comes in the following dosage forms: ibuprofen 400 mg capsules.

Do not use Advi Migraine & Headache if: You have or are • active or recurrent stomach ulcer, gastrointestinal (GI) bleeding, or active inflammatory bowel disease (e.g. Crohn's, colitis), • taking acetylsalicylic acid (ASA) or any NSAIDs including any other ibuprofen product, • allergic/hypersensitive to ASA, Ibuprofen, other salicylates, other NSAIDs or any of Advi Liqui-Gels ingredients (Refer to the nonmedicinal ingredients on outer carton or composition section), • nasal polyps (swelling of the inside of the nose), or allergic manifestations such as asthma, anaphylaxis (sudden severe life threatening allergic reaction), urticaria/hives, rhinitis (stuffed or runny nose that may be due to allergies), skin rash or other allergic symptoms, • dehydrated (significant fluid loss) due to vomiting, diarrhea or lack of fluid intake, • diagnosed with severe high blood pressure or have severe coronary artery disease, • right before or after heart surgery, • serious liver or kidney disease, • high potassium in the blood, • Systemic Lupus Erythematosus, • in your third trimester of pregnancy.

Advi Migraine & Headache should NOT be used in patients under 12 years of age since the safety and effectiveness have NOT been established. Children under 12 should use Children's Advi.

To help avoid side effects and ensure proper use, talk to your healthcare professional before you take Advi Migraine & Headache. Talk about any health conditions or problems you may have, including if you: • have previous or current stomach ulcers, diabetes, high blood pressure, heart failure, heart disease or thyroid disease, asthma, kidney or liver disease, trauma, blood clotting disorder (such as hemophilia), any other serious disease, • are under doctor's care for any serious condition, • are trying to conceive, pregnant or breastfeeding, • are taking any other drug including over the counter drugs.

Use with caution in the elderly.

Long-term continuous use may increase the risk of heart attack or stroke.

The use of NSAIDs, like Advi Migraine & Headache, in the second trimester of pregnancy should be restricted to the lowest dose necessary for the shortest possible duration.

At 20 weeks or later in pregnancy, your use of NSAIDs may need to be monitored by a doctor due to the rare risk of kidney problems in the unborn baby which may result in decreased amniotic fluid volume and other complications.

Other warnings you should know about:

When using this product: • take with food or milk if upset stomach occurs • risk of heart attack or stroke may increase if you use more than directed or for longer than directed.

Stop use and ask a doctor if: • you show signs of stomach bleeding (see Serious Warnings and Precautions, Stomach bleeding warning) • pain worsens or lasts more than 5 days • heart gets worse or lasts more than 3 days • any new symptoms appear.

Tell your healthcare professional about all the medicines you take, including any drugs, vitamins, minerals, natural supplements or alternative medicines.

The following may interact with Advi Migraine & Headache (NOT a complete list): • antiarrhythmics • anticoagulants (blood thinners) • digoxin • oral antidiabetic agents and insulin • diuretics • methotrexate • lithium • protein-bound drugs including probenecid • thioxane • antiplatelets • cyclosporine • phenytoin • corticosteroids or benzodiazepines • other NSAIDs • medications for high blood pressure

Tell your doctor or pharmacist what prescription drugs you are taking or plan to take.

How to take Advi Migraine & Headache: Take the lowest dose of this medication for the shortest time period. Taking too much Advi Migraine & Headache may increase your chances of unwanted and sometimes dangerous side effects, especially if you are elderly, have other diseases or take other medications.

Usual dose: For migraine headaches: Adults and children 12 years and over: Take 1 Advi Migraine & Headache liqui-gel at the first sign of symptoms and every 6-8 hours as needed. Do not exceed 3 Liqui-gels in 24 hours, unless directed by a doctor.

For all other uses: Adults and children 12 years and over: Take 1 Advi Migraine & Headache liqui-gel every 6-8 hours as needed. Do not exceed 3 Liqui-gels in 24 hours, unless directed by a doctor.

Do not use longer than 3 days for a fever or 5 days for pain relief. Do not give to children under 12. Children under 12 should use Children's Advi.

Overdose:

If you think you, or a person you are caring for have taken too much Advi Migraine & Headache, contact a healthcare professional, hospital emergency department, or regional poison control centre immediately, even if there are no symptoms.

Missed Dose:

Take the missed dose as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, wait until then to take your medicine and skip the missed dose. Do not take two doses at the same time.

What are possible side effects from using Advi Migraine & Headache? These are not all the possible side effects you may have when taking Advi Migraine & Headache. If you experience any side effects not listed here, tell your healthcare professional.

Symptom / effect	Talk to your healthcare professional	
	Only if severe	In all cases
COMMON		
Dizziness	✓	
UNCOMMON		
Abdominal pain	✓	
Body or black stools		✓
Changes in vision		✓
Ringing or buzzing in the ears		✓
Skin rashes, skin redness		✓
RARE		
Fluid retention (e.g. swelling in the hands or feet)		✓
Shortness of breath, wheezing		✓
Vomiting blood or dark coloured vomit		✓
VERY RARE		
Serious skin reactions (blisters, redness, peeling)		✓
Severe allergic reactions (trouble breathing or chest tightness, hives, swelling or itching)		✓
Jaundice (yellowing of the eyes or skin due to liver problems)		✓
Low blood cell count		✓

Advi Migraine & Headache may occasionally produce unwanted side effects such as heartburn, nausea or vomiting, bloating, diarrhea or constipation, nervousness, sleeplessness or itching. Stop use and contact a healthcare professional if these symptoms worsen or persist.

Side effects may be minimized by using the smallest dose for the shortest duration of time.

If you have a troublesome symptom or side effect that is not listed here or becomes bad enough to interfere with your daily activities, tell your healthcare professional.

Reporting Side Effects

You can report any suspected side effects associated with the use of health products to Health Canada by:

- Visiting the Web page on Adverse Reaction Reporting (<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medeffect-canada.html>) for information on how to report online, by mail or by fax; or
- Calling toll-free at 1-866-234-2345.

NOTE: Contact your health professional if you need information about how to manage your side effects. The Canada Vigilance Program does not provide medical advice.

Storage:

Store at room temperature (15°-30°C). Protect from light.

Keep out of reach and sight of children. This package contains enough medicine to seriously harm a child. Advi Migraine & Headache is not child-resistant.

If you want more information about Advi Migraine & Headache: • Talk to your healthcare professional • Find the full product monograph that is prepared for healthcare professionals and includes this Patient Medication Information by visiting the Health Canada website (<http://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/drug-product-salibase.html>); the manufacturer's website www.hcl.ca, or by calling 1-888-788-6161.

This leaflet was prepared by Haleson Canada LLC

Trademarks are owned by or licensed to the Haleson group of companies.

©2025 Haleson group of companies or its licensee.

Liqui-Gels[®] is a trademark or registered trademark of Cabotell Pharms Solutions.

Date of Authorization: Aug14, 2025

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT
LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION
SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

ADVL^{MD} MIGRAINES ET MAUX DE TÊTE

Capoules d'ibuprofène à 400 mg (sous forme d'acide libre et de sel de potassium)
Lisez attentivement ce qui suit avant de prendre Advil Migraines et maux de tête et chaque fois que vous commencez un nouvel emballage. Le présent dépliant n'est qu'un résumé et ne donne donc pas les renseignements pertinents au sujet de ce médicament. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre état de santé et de votre traitement et demandez s'il possède de nouveaux renseignements au sujet d'Advil Migraines et maux de tête.

- Mises en garde et précautions importantes**
- La prudence est de mise chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, d'hypertension ou d'une affection pouvant entraîner une accumulation excessive de liquide dans les tissus.
 - La prudence est de mise chez les patients prédisposés aux irritations du tractus gastro-intestinal, y compris ceux qui ont des antécédents d'ulcères gastroduodénaux. Le risque de saignement dans l'estomac est plus élevé chez les personnes de 60 ans et plus, celles qui ont déjà eu des ulcères d'estomac ou des troubles hématologiques, celles qui prennent un anticoagulant (médicament qui adoucit le sang), un agent stéroïdien, des médicaments qui contiennent un ANS comme l'acide acétylsalicylique (IAS), l'ibuprofène ou le naproxène, ou des anti-inflammatoires sur ordonnance et celles qui consomment 3 verres d'alcool ou plus par jour en même temps que ce produit.
 - La prudence est de mise chez les patients présentant un risque de problèmes rénaux, notamment les personnes âgées et ceux utilisant des diurétiques.
 - Cessez l'emploi et consultez un médecin en cas d'hémorragie, de douleur à la miction ou de difficulté à uriner, si vous avez des maux de tête et/ou des douleurs et courbatures légères d'origine musculaire et articulaire, des douleurs en général, des maux de dos, des entorses et foulures, des douleurs inflammatoires associées à l'arthrite et au surmenage physique et athlétique (p. ex., entorses et foulures), des maux de tête comme les diphtériques de tension, des maux de dents, des crampes menstruelles, des douleurs et courbatures associées au rhume banal ou à la grippe, ainsi que pour abaisser la fièvre.
 - Parce à votre médecin si vous tentez de concevoir un enfant, vous êtes au premier ou au deuxième trimestre d'une grossesse ou vous allaitez.

Pourquoi utiliser-t-on Advil Migraines et maux de tête?

- Migraine - Pour le soulagement rapide, efficace et temporaire des migraines légères ou modérées et des symptômes qui y sont associés tels que les nausées et la sensibilité à la lumière et au bruit. • Également pour le soulagement rapide, efficace et temporaire des douleurs et courbatures légères d'origine musculaire et articulaire, des douleurs en général, des maux de dos, des entorses et foulures, des douleurs inflammatoires associées à l'arthrite et au surmenage physique et athlétique (p. ex., entorses et foulures), des maux de tête comme les diphtériques de tension, des maux de dents, des crampes menstruelles, des douleurs et courbatures associées au rhume banal ou à la grippe, ainsi que pour abaisser la fièvre.

Des études cliniques ont démontré un soulagement de longue durée de la douleur, allant jusqu'à 8 heures.

Comment Advil Migraines et maux de tête agit-il?
Advil Migraines et maux de tête est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui peut réduire la production par l'organisme de substances chimiques qui provoquent la douleur et l'inflammation.

Quels sont les ingrédients d'Advil Migraines et maux de tête?

Ingrédient médicamenteux : Ibuprofène (sous forme d'acide libre et de sel de potassium)
Ingrédients non médicamenteux : eau purifiée, amylométhane, gélatine, hydroxyde de potassium, jaune # 10 D&C, lecitine (soja), polyéthylène glycol, rouge # 40 FD&C, sorbitane, sorbitol, triglycérides à chaîne moyenne, vert # 3 FD&C.

Advil Migraines et maux de tête se présente sous la forme posologique suivante :
capoules d'ibuprofène à 400 mg

Ne prenez pas Advil Migraines et maux de tête si :

- vous présentez un ulcère de l'estomac, actif ou récurrent, un saignement gastro-intestinal ou une maladie inflammatoire active de l'intestin (p. ex., maladie de Crohn, colite);
- vous prenez de l'acide acétylsalicylique (IAS) ou un autre AINS, y compris un autre produit renfermant de l'ibuprofène; vous avez une hypersensibilité ou une allergie à l'IAS, à l'ibuprofène, à d'autres salicylates, à d'autres AINS ou à l'un ou l'autre des ingrédients des Liqui-Gels Advil (voir la section des ingrédients non médicamenteux de la boîte ou la section sur la composition);
- vous souffrez de polyarthrite noueuse (inflammation du noeud) ou de manifestations allergiques comme l'asthme, l'angioedème (injection allergique soudaine et grave, pouvant être mortelle), l'urticaire, la migraine (longueurs nasales ou écoulement nasal) pouvant être causé par des allergies, les éruptions cutanées ou d'autres symptômes d'allergie; vous souffrez de déshydratation (importante perte de liquides) causée par des vomissements, de la diarrhée ou une absorption insuffisante de liquides;
- vous avez reçu un diagnostic d'hypertension grave ou de maladie coronarienne grave;
- vous êtes sur le point de subir ou venez de subir une chirurgie du cœur; vous souffrez d'une maladie grave du foye ou des reins; vous avez eu un taux élevé de potassium dans le sang; vous souffrez de lésion rythmique discontinue; vous êtes au troisième trimestre d'une grossesse.

Advil Migraines et maux de tête NE doit PAS être pris par des personnes de moins de 12 ans, car l'efficacité et l'efficacité de ce produit n'ont PAS été établies dans ce groupe d'âge.
Les enfants de moins de 12 ans doivent prendre Advil pour enfants.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Advil Migraines et maux de tête afin d'éviter à éviter les effets secondaires et d'assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment si :

- vous souffrez ou avez déjà souffert d'ulcères de l'estomac, de diabète, d'hypertension, d'insuffisance cardiaque, de maladie coronarienne, de maladie thyroïdienne, d'asthme, d'une maladie du foye ou des reins, de glaucome, d'un trouble de la coagulation (comme l'hémophilie) ou de toute autre maladie grave;
- vous êtes sous surveillance médicale pour un problème grave;
- vous tentez de concevoir un enfant, vous êtes enceinte ou vous allaitez;
- vous prenez d'autres médicaments, y compris des médicaments en vente libre.

Faire preuve de prudence chez les personnes âgées.
L'emploi prolongé continu peut accroître le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

L'utilisation d'AINS comme Advil Migraines et maux de tête pendant le deuxième trimestre de la grossesse doit être limitée à la dose la plus faible requise pour la plus courte période possible.

À partir de la 29^e semaine de grossesse, votre prise d'AINS peut devoir être surveillée par un professionnel de la santé en raison du risque rare de troubles rénaux chez l'enfant à naître, ce qui peut entraîner une réduction de la quantité de liquide amniotique ou d'autres complications.

Autres mises en garde à connaître : Lorsque vous utilisez ce produit :

- prenez les comprimés avec du lait ou des aliments en cas de maux d'estomac; • le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral peut augmenter si vous dépensez la dose ou la durée de traitement indiquées.

Cessez d'utiliser ce médicament et consultez un médecin si :

- vous présentez des signes de saignement d'estomac (voir Mises en garde et précautions importantes) - Risque de saignement dans l'estomac; • la douleur s'aggrave ou persiste pendant plus de 3 jours;
- la fièvre monte ou persiste plus de 3 jours; • tout nouveau symptôme se manifeste.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

Les médicaments suivants peuvent interagir avec Advil Migraines et maux de tête (cette liste n'est PAS exhaustive) :

- ischémiques; • les anticoagulants médicamenteux qui éclaircissent le sang; • la dopamine; • les agents antibactériens ou antifongiques; • les diurétiques; • le méthotrexate; • le lithium; • les médicaments qui se lient aux protéines (comme le probololol); • les myrines; • les antibiotiques; • la cyclosporine; • la phénylène; • les corticostéroïdes ou les benzodiazépines; • d'autres AINS; • les médicaments contre l'hypertension.

Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d'ordonnance, dites-le à votre médecin ou à votre pharmacien.

Comment prendre Advil Migraines et maux de tête : Prenez la plus faible dose de ce médicament, sur la durée la plus courte possible. La prise d'une quantité excessive d'Advil Migraines et maux de tête peut augmenter le risque d'effets secondaires indésirables et parfois dangereux, surtout si vous êtes âgé, souffrez d'autres maladies ou prenez d'autres médicaments.

Dose habituelle : Pour les migraines : Adultes et enfants de 12 ans ou plus : Prendre 1 Advil Migraines et maux de tête dès l'apparition des symptômes, puis toutes les 6 à 8 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de 3 Liqui-Gels en 24 heures, sauf sur lavis d'un médecin.

Pour tout autre usage : Adultes et enfants de 12 ans ou plus : Prendre 1 Advil Migraines et maux de tête toutes les 6 à 8 heures, au besoin. Ne pas prendre plus de 3 Liqui-Gels en 24 heures, sauf sur lavis d'un médecin.

Ne pas utiliser plus de 3 jours pour la fièvre ou plus de 5 jours pour soulager la douleur. Ne pas utiliser ce médicament à des enfants de moins de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent prendre Advil pour enfants.

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous occupez avez pris trop d'Advil Migraines et maux de tête, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Prenez la dose oubliée dès que vous y pensez. Si l'heure de votre prochaine dose approche, attendez jusqu'à ce moment pour prendre votre médicament et ne prenez pas la dose que vous avez oubliée. Ne prenez pas deux doses à la fois.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à la prise d'Advil Migraines et maux de tête? Cette liste ne comprend pas tous les effets secondaires possibles que vous pourriez présenter pendant que vous prenez Advil Migraines et maux de tête. Si vous remarquez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Uniquement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
FREQUENTS			
Ebourdements	✓		
PEU COURANTS			
Douleur abdominale	✓		
Sang dans les selles ou selles noires			✓
Changement de la vision		✓	
Tintement ou bourdonnement des oreilles			✓
Eruptions cutanées, rougeurs			✓
RARES			
Réaction d'eau (rougeur des mains ou des pieds)			✓
Essoufflement, respiration sifflante			✓
Vomissements de sang ou de couleur foncée			✓
TRÈS RARES			
Réactions cutanées graves (loges, éruptions, desquamation)			✓
Réactions allergiques graves (difficulté à respirer ou serrement à la poitrine, urticaire, enflure ou dimérgation)			✓
Boursoir (gonflement de la peau ou des yeux causé par des problèmes de tige)			✓
Table numération globulaire			✓

Advil Extra fort Liqui-Gel peut occasionnellement causer des effets secondaires indésirables, comme des brûlures d'estomac, des nausées ou des vomissements, des ballonnements, de la diarrhée ou de la constipation, de la nervosité, de l'insomnie ou des dimérgations. Cessez d'utiliser ce médicament et communiquez avec un professionnel de la santé si ces symptômes s'aggravent ou persistent.

On peut réduire au minimum le risque d'effets secondaires en prenant la plus petite dose possible pendant la plus courte période possible.

En cas de symptôme ou d'effet secondaire n'ayant pas mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit Santé Canada en :

- visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-santé/médicaments-declaration-effets-indésirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur; ou
- téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage : Température ambiante (15 à 30 °C). Protéger de la lumière.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour faire convenablement à un enfant. Advil Migraines et maux de tête n'est pas dans un contenant à l'épreuve des enfants.

Pour en savoir plus sur Advil Migraines et maux de tête :

- Consultez votre professionnel de la santé; • Consultez le monographe intégré rédigé à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/boites-medicaments-produits-santé/medicaments-base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (www.advil.ca/fr), ou peut être obtenu en composant le 1-888-788-8181.

Le présent dépliant a été rédigé par Helion Canada SR.

Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés Helion.

©2025 Groupe de sociétés Helion ou son concédant de licence.

Liqui-Gel^{MD} est une marque de commerce ou une marque déposée de Côté Pharmas Solutions.

Date d'autorisation : 14 août 2025