Contains Acetaminophen
and other Ingredients

Contient de l'acétaminophène
et d'autres ingrédients

Robax peat dual

PHARMACIST RECOMMENDED BRAND #1

EFFECTIVE RELIEF FROM:

Back & Muscle Pain
Tense Neck Muscles
Strains & Sprains

CAPLETS 40

DIN 02026805

Robax peat dual

MARQUE RECOMMANDÉE PAR LES PHARMACIENS #1

SOULAGEMENT EFFICACE DES :

Maux de dos et douleurs musculaires
Muscles tendus du cou
Entorses et foulures

CAPLETS 40

DIN 02026805

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare U.C.
Mississauga, ON L5R 4H7
©2023 GSK or licensor. GSK ou son concédant en licence.

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in each caplet) **Purposes**
Acetaminophen (APAP) 325 mg ..... Pain reliever
Methocarbamol 400 mg..... Muscle relaxant

Ingrédients actifs (dans chaque caplet) **Utilités**
325 mg d'acétaminophène (APAP) ..... Analgésique
400 mg de méthocarbamol..... Relaxant musculaire

Uses • For temporary relief of pain associated with muscle spasm such as • back pain • tense neck muscles • strains and sprains.

Usages • Pour le soulagement temporaire des douleurs associées aux spasmes musculaires telles que • les maux de dos • la tension dans les muscles du cou • les foulures et les entorses.

Warnings **Liver warning** Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take: • more than the recommended dose in 24 hours • with other drugs containing acetaminophen • while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include: • yellow skin or eyes • dark urine • sweating • nausea • vomiting • stomach pain • unusual tiredness • loss of appetite.

Allergy alert Acetaminophen may cause serious skin reactions. Stop use and get medical help right away if you have: • skin reddening • blisters • rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.**

Do not use • with any other drugs containing **acetaminophen** or other ingredients in this product • if allergic to acetaminophen or other ingredients in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. ▶

0 62107 39140 5

60000000101294

Robax peat dual

Will Dissolve Quick
This Solution is not dissolved
in liquid - swallow and go!
Bisolvon, do not use.

Avec Solution
SÉCHE-RAPIDE
C'est intéressant de l'ingérer
des comprimés. Ne pas dissoudre
le bisolvon, ainsi cela est bien.

Contains Acetaminophen
and other Ingredients

Contient de l'acétaminophène
et d'autres ingrédients

Robax peat duet

Robax peat duet

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare U.C.
Mississauga, ON L5R 4H7
©2023 GSK or licensor. GSK ou son concédant en licence.

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in each caplet) **Purposes**
Acetaminophen (APAP) 325 mg ..... Pain reliever
Methocarbamol 400 mg..... Muscle relaxant

Ingrédients actifs (dans chaque caplet) **Utilités**
325 mg d'acétaminophène (APAP) ..... Analgésique
400 mg de méthocarbamol..... Relaxant musculaire

Uses • For temporary relief of pain associated with muscle spasm such as • back pain • tense neck muscles • strains and sprains.

Usages • Pour le soulagement temporaire des douleurs associées aux spasmes musculaires telles que • les maux de dos • la tension dans les muscles du cou • les foulures et les entorses.

Warnings **Liver warning** Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take: • more than the recommended dose in 24 hours • with other drugs containing acetaminophen • while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include: • yellow skin or eyes • dark urine • sweating • nausea • vomiting • stomach pain • unusual tiredness • loss of appetite.

Allergy alert Acetaminophen may cause serious skin reactions. **Stop use and get medical help right away if you have:** • skin reddening • blisters • rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.**

Do not use • with any other drugs containing **acetaminophen** or other ingredients in this product • if allergic to acetaminophen or other ingredients in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. ▶



Robax peat duet

VOIR DE L'AUTRE CÔTÉ
(Tête-bêche et de l'intérieur)
Lisez attentivement avant d'utiliser.
Avant boisson
SECOUE-L'ENFANT
C'est indispensable si l'étiquette des médicaments ne pas obéissez si le flacon scellé est brisé.

42 mm

80 mm

Ingrédients inactifs Acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, bleu n° 1 FD&C, croscarmellose, dioxyde de silicium, dicétate de d'α-tocophérolyle, hypromellose, jaune n° 10 D&C, laurylsulfate de sodium, méthylcellulose, polyéthylèneglycol, povidone, stéarate de magnésium.

Questions? 1-888-275-8939 www.rxbaa.ca

T2018 Kirkfield Produced by Rockstar Remedies
1 Source: Pharmacist Survey for Oral contre les maux de dos de la classe d'IDAA 2018

Ask a doctor or pharmacist before use if you
• have liver or kidney disease • like to take blood thinning drug and/or anti-coagulants • drink alcohol, reasons or flight-headedness may occur • do not drive or operate machinery • drugs for depression, psychosis or anxiety • any other drug • are pregnant or breastfeeding.

When using this product • drowsiness, dizziness, case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical for adults as well as children.

Stop use and ask a doctor if • symptoms worsen or persist for more than 2 days or get worse or new symptoms appear • you get a rash or itchy skin.

Keep out of reach of children. This package contains enough drug to seriously harm a child. In

Mises en garde Avertissement – Foie
L'utilisation prolongée peut causer des **dommages sévères au foie qui peuvent être mortels** si vous

Ne pas utiliser • avec d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris ceux vendus sans ordonnance ou **plus** chaque jour. Symptômes possibles de dommages au foie : • jaunissement de la peau ou des yeux • urines foncées • intoxication • nausées • vomissements • douleurs abdominales • perte d'appétit, irritabilité • perte d'appétit.

PAA133114 **Peel Here / Tirez Ici**

Ask your allergist Vaccinations/shots prior to pharmacist. Les réactions cutanées graves. Cessez de prendre ce produit et consultez un médecin immédiatement si l'un ou l'autre de ces symptômes apparaît : • rougeur de la peau • cloques

Ne pas utiliser • avec d'autres médicaments contenant du paracétamol, y compris ceux vendus sans ordonnance ou **plus** chaque jour. Symptômes possibles de dommages au foie : • jaunissement de la peau ou des yeux • urines foncées • intoxication • nausées • vomissements • douleurs abdominales • perte d'appétit, irritabilité • perte d'appétit.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous • avez une maladie du foie • prenez un médicament qui **éclaircit le sang** • êtes

Lorsque vous utilisez ce produit • vous pourriez ressentir des étourdissements, des vertiges ou des nausées ou un vertige • ne conduisez pas de tables pas fonctionner de machines • ne buvez pas d'alcool.

Cesser d'utiliser et consultez un médecin si • les symptômes s'aggravent ou **ils** durent plus de 2 jours • de nouveaux symptômes apparaissent • une éruption cutanée ou des démangeaisons se manifestent.

Garder hors de la portée des enfants. Ce produit contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Il est essentiel de consulter sans tarder, même en l'absence de signes et de symptômes.

Directions **Adults** and children 12 years & over: • take 2 caplets every 6 hours • do not take more than 8 caplets in 24 hours, or as directed by a doctor.

Mode d'emploi Adultes et enfants de 12 ans et plus : • Prendre 2 caplets toutes les 6 heures • Ne pas prendre plus de 8 caplets en 24 heures, sauf sur ordonnance d'un médecin.

Other Information Store at room temperature (15-30 °C).

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C).

Inactive Ingredients Corn starch, croscarmellose, D&C yellow no. 10, FD&C Blue No. 1, hypromellose, magnesium stearate, methylcellulose, polyethylene glycol, povidone, prejelatinized starch, silicon dioxide, sodium lauryl sulfate, sodium stearic glycolate, stearic acid.

81 mm