

Purposes / Utilités	Actives ingredients / Ingrédients actifs (dans chaque capsule)
Analgésique et antipyrétique Pain reliever & fever inducer Ougryt Ammissal Décongestionnant nasal Nasal decongestant	Acétaminophène 325 mg Acetaminophen 325 mg Bromophédrine hydrochloride 15 mg Bromophedrine hydrochloride 15 mg Pseudoéphédrine hydrochloride 30 mg Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 30 mg

Contains acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Liquid Gels
Gélules liquides



Sinus and nasal congestion
Sinus and nasal congestion

Sinus pressure
Pression sinusale

Sore throat pain and dry cough
Maux de gorge et toux sèche

Minor aches and pain
Courbatures et douleurs légères

Fever and chills
Fièvre et frissons

Headache
Maux de tête

COLD & SINUS

NON DROWSY DAY

RHUME ET SINUS

JOUR SANS SOMNOLENCE

24 CAPSULES

Warnings / Mise en garde - courbatures et douleurs légères • fièvre et frissons • congestion nasale et des sinus • pression sinusale • maux de gorge • toux sèche.

Other information / Autres renseignements • Keep and consult carton for important information before each use. • Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. Do not use if child-resistant sealed blister unit is broken. / Ne pas utiliser si la pastille à dose scellée a l'air brisée ou si le blister a l'air brisé.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol and water / Eau, sucre pharmaceutique, gomme, glycérine, polyéthylène glycol, povidone, propylène glycol, sorbitol et eau.

Questions? Call / Contactez 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

Warnings / Mise en garde - Take 2 capsules every 4-6 hours. Do not take more than 8 capsules in 24 hours. Children under 12: Do not use. • Prendre 2 capsules toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 8 capsules en 24 heures. Enfants de moins de 12 ans: Ne pas utiliser. • Ne pas dépasser la quantité indiquée (emballage).
 - Keep and consult carton for important information before each use. • Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. Do not use if child-resistant sealed blister unit is broken. / Ne pas utiliser si la pastille à dose scellée a l'air brisée ou si le blister a l'air brisé.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol and water / Eau, sucre pharmaceutique, gomme, glycérine, polyéthylène glycol, povidone, propylène glycol, sorbitol et eau.

Questions? Call / Contactez 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

Warnings / Mise en garde - Take 2 capsules every 4-6 hours. Do not take more than 8 capsules in 24 hours. Children under 12: Do not use. • Prendre 2 capsules toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 8 capsules en 24 heures. Enfants de moins de 12 ans: Ne pas utiliser. • Ne pas dépasser la quantité indiquée (emballage).
 - Keep and consult carton for important information before each use. • Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. Do not use if child-resistant sealed blister unit is broken. / Ne pas utiliser si la pastille à dose scellée a l'air brisée ou si le blister a l'air brisé.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol and water / Eau, sucre pharmaceutique, gomme, glycérine, polyéthylène glycol, povidone, propylène glycol, sorbitol et eau.

Questions? Call / Contactez 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

Warnings / Mise en garde - Take 2 capsules every 4-6 hours. Do not take more than 8 capsules in 24 hours. Children under 12: Do not use. • Prendre 2 capsules toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 8 capsules en 24 heures. Enfants de moins de 12 ans: Ne pas utiliser. • Ne pas dépasser la quantité indiquée (emballage).
 - Keep and consult carton for important information before each use. • Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. Do not use if child-resistant sealed blister unit is broken. / Ne pas utiliser si la pastille à dose scellée a l'air brisée ou si le blister a l'air brisé.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol and water / Eau, sucre pharmaceutique, gomme, glycérine, polyéthylène glycol, povidone, propylène glycol, sorbitol et eau.

Questions? Call / Contactez 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The Buckley's Company Message: On 10/1/14, 2014
 ©2014 USA group of companies of the Kanesborough de sociétés
 USA en son consistant de France.



P10483