

Drug Facts (continued) / Info-médicament (suite)

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •are pregnant or breastfeeding •have liver, kidney, heart or thyroid disease •high blood pressure •diabetes •glucoma •difficulty urinating •are taking blood thinning drug warfarin •have a persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •have a cough with excessive phlegm (mucus) •have difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •are taking medication for weight control •have any other serious medical condition / •êtes enceinte ou allaitez •avez une maladie du foie, des reins, du cœur ou de la thyroïde, une tension artérielle élevée, un glaucome, le diabète ou de la difficulté à uriner •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •avez une toux persistante comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou une autre maladie pulmonaire chronique (vos symptômes pourraient indiquer un problème grave) •prenez des médicaments pour perdre du poids •souffrez d'un autre problème de santé grave

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •new symptoms appear •symptoms worsen or last for more than 7 days •pain lasts for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •stomach tests for more than 2 days •you develop a high fever (>38°C), rash or a headache that won't go away •you are nervous, dizzy, can't sleep / •de nouveaux symptômes apparaissent •vos symptômes s'aggravent ou durent plus de 7 jours •le douleur dure plus de 5 jours •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •vous avez de la fièvre (>38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste •vous êtes nerveux, étourdi ou incapable de dormir

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire

Drug Facts (continued) / Info-médicament (suite)

gravement à la santé d'un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi •Adults and children 12 years and over: Take 2 caplets every 4 - 6 hours as required •Do not take more than 8 caplets in 24 hours (see liver warnings) •Use only on the advice of a doctor •Children under 12: Do not use. •This is not a standard dosage unit. / •Adultes et enfants de 12 ans ou plus : Prendre 2 caplets toutes les 4 à 6 heures, au besoin. •Ne pas prendre plus de 8 caplets en 24 heures (voir Avertissement - foie). •A utiliser que sur l'avis d'un médecin. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ce n'est pas la teneur standard.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 20 - 25°C. •Do not use if seal under child resistant cap is broken. / •Garder la boîte et de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (20 - 25 °C). •Ne pas utiliser si le sceau sous le bouchon à l'épreuve des enfants est brisé.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Corn starch, FD&C yellow #5, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, povidone, silicon dioxide, stearic acid / Acide stéarique, amidon de maïs, cellulose microcristalline, colorant FD&C jaune n° 5, dioxyde de silicium, povidone, stéarate de magnésium.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

Contains acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Caplets

Sinus and nasal congestion ■ Congestion nasale et des sinus
Sinus pressure ■ Pression dans les sinus

Sore throat pain ■ Maux de gorge and dry cough ■ et toux sèche
Minor aches ■ Courbatures et and pain ■ douleurs légères

Fever and chills ■ Fièvre et frissons
Headache ■ Maux de tête

Buckley's

COMPLETE EXTRA-STRENGTH Cough, Cold & Flu | **COMPLET EXTRA-FORT Toux, rhume et grippe**

DAY NON DROWSY | **JOUR SANS SOMNOLENCE**

DIN 02241593 | 40 CAPLETS

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients / Ingrédients actifs (in each caplet / dans chaque caplet)	Purposes / Utilités
Acetaminophen 500 mg (Extra strength)	Pain reliever, fever reducer
Acetaminophen 500 mg (Extra-fort)	Analgésique, antipyrétique
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg	Cough suppressant
Bronchitolide de dextrométhorphan 15 mg	Nécessaire
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg	Nasal decongestant
Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 30 mg	Décongestionnant nasal

Uses / Usages •Temporary relief from the following symptoms due to cold and flu: •headache •minor aches and pain •fever and chills •sinus and nasal congestion •sinus pressure •sore throat pain •dry cough / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •maux de tête •courbatures et douleurs légères •fièvre et frissons •congestion nasale et des sinus •pression dans les sinus •mal de gorge •toux sèche

Warnings / Mises en garde
Liver warning / Avertissement - foie Acetaminophen may cause severe or possibly fatal

OPEN FLAP AND READ / OUVRIR LE RABAT ET LIRE

Drug Facts (continued) / Info-médicament (suite)

liver damage if you take •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •swelling •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite / L'acétaminophène peut causer de graves lésions au foie pouvant entraîner la mort si vous prenez ce médicament •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre • jaunissement de la peau ou des yeux • urines foncées • gonflement • nausées • vomissements • douleur à l'estomac • fatigue inhabituelle • perte d'appétit.

Allergy alert / Alerte aux allergies Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include •skin redness •hives •rash. If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away. / L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Les symptômes peuvent comprendre • rougeur • éruptions • éruption cutanée. Si l'un ou l'autre de ces symptômes se manifeste, cessez d'utiliser le produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.

Do not use / Ne pas utiliser •with any other drug containing acetaminophen or any other cough and cold product •if you are allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. / avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène ou d'autres médicaments contre la toux ou le rhume •en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAOI) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines après avoir cessé de prendre un MAOI.

The Buckley Company, Mississauga, ON L4X 1A4
Tous droits réservés. Les marques de commerce sont détenues et utilisées par Buckley's. ©2020 GSK group of companies or its licensee/ Groupe de sociétés F28866-04

