Buckley's

0 58478 10776 9

Contains acetaminophen and other ingredients
Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Get the Mucus Out! Expulsez les mucosités!

Buckley's

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Cough
  la toux
- Mucus & Phlegm
  les mucosités
- Sore Throat Pain
  les maux de gorge
- Nasal & Sinus Congestion
  la congestion nasale et des sinus
- Fever & Chills
  la fièvre et les frissons
- Minor Body Aches & Pains
  les courbatures et les douleurs légères
- Headache
  les maux de tête

COMPLETE
plus Extra Strength
MUCUS Relief

COMPLET
plus anti-MUCOSITÉS
extra-fort

DIN 02357232

250 mL Syrup / Sirop

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (per teaspoon or 5 mL) **/ Ingrédients actifs** (par cuillère à thé ou 5 mL)	**Purposes / Utilités**
Acetaminophen 325 mg / Acétaminophène à 325 mg	Pain reliever and fever reducer / Analgésique et antipyrétique
Guaifenesin 200 mg (Extra strength) / Guaïfénésine à 200 mg (extra-fort)	Cough expectorant / Expectorant
Menthol 20 mg / Menthol à 20 mg	Cough suppressant and Nasal decongestant / Antitussif et décongestionnant nasal

Uses / Usages •Temporarily relieves the following symptoms due to cold and flu: •wet cough or chest congestion •dry cough •nasal and sinus congestion •fever and chills •headache •sore throat pain •minor body aches and pains. Helps loosen phlegm or mucus and thin lung secretions. / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •toux grasse ou congestion de la poitrine •toux sèche •congestion nasale et des sinus •fièvre et frissons •maux de tête •maux de gorge •courbatures et douleurs légères. Aide à déloger et à éclaircir les mucosités des poumons.

Warnings / Mises en garde
Liver warning: / Avertissement – foie : Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite / L'acétaminophène peut causer de **graves lésions au foie pouvant entraîner la mort** si vous prenez ce médicament •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions ▼

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

au foie peuvent comprendre •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit.

Allergy alert: / Alerte aux allergies : Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include •skin reddening •blisters •rash. **If any of these symptoms occur, stop use and seek medical help right away.** / L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Les symptômes peuvent comprendre •rougeur •cloques •éruption cutanée. **Si l'un ou l'autre de ces symptômes se manifeste, cessez d'utiliser le produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.**

Do not use / Ne pas utiliser •with any other drug containing **acetaminophen** or other cough and cold medication •if you are allergic to acetaminophen or other ingredients in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. / •avec un autre médicament contenant de **l'acétaminophène** ou tout autre médicament contre la toux et le rhume •si vous êtes allergique à l'acétaminophène ou à d'autres ingrédients de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •have •liver or kidney disease •a persistent cough that has not gone away •difficulty breathing •asthma or other chronic lung conditions •take the blood thinning drug warfarin •are pregnant or breastfeeding / •êtes enceinte ou allaitez •avez une maladie du foie ou des reins •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •avez une toux persistante •avez de la difficulté à respirer •souffrez d'asthme ou d'une autre maladie pulmonaire chronique.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •pain lasts more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat pain lasts for more than 2 days •symptoms worsen or last for more than 7 days •you have a high fever (>38°C) or a headache that does not go away •you develop a rash •you cough up thick yellow or green mucus / •la douleur dure plus de 5 jours •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez une forte fièvre (> 38 °C) ou des maux de tête qui persistent •vous présentez une éruption cutanée •votre toux s'accompagne d'épaisses mucosités jaunes ou vertes.

● **Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants.** This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à la santé d'un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi
•Adults and children 12 years and over: •Shake well before using. •Take 2 teaspoons (10 mL) every 4 to 6 hours. •Do not take more than 40 mL in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). •If preferred, mix with equal parts honey. / •Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Bien agiter avant d'utiliser. •Prendre 2 cuillères à thé (10 mL) toutes les 4 à 6 heures. •Ne pas prendre plus de 40 mL en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la quantité indiquée (voir la mise en garde concernant les lésions au foie). •Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel. ▼

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use •Store at room temperature 15 – 25°C •Security feature: Do not use if sealed carton ends are broken or torn / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, caramel colour, carrageenan, glycerin, pine needle oil, polyethylene glycol, propylparaben, sodium cyclamate, tincture of capsicum, water. / Baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, colorant caramel, cyclamate de sodium, eau, glycérine, huile d'aiguille de pin, polyéthylèneglycol, propylparabène, teinture de piment sec.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 6L4
Trademarks owned or licensed by GSK./M. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK.
©2020 GSK or licensor./GSK ou son concédant de licence.

PAA144096

Buckley's

0 58478 10776 9

Contains acetaminophen and other ingredients
Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Buckley's

Get the Mucus Out!
Expulsez les mucosités!

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Cough
  la toux
- Mucus & Phlegm
  les mucosités
- Sore Throat Pain
  les maux de gorge
- Nasal & Sinus Congestion
  la congestion nasale et des sinus
- Fever & Chills
  la fièvre et les frissons
- Minor Body Aches & Pains
  les courbatures et les douleurs légères
- Headache
  les maux de tête

COMPLETE
plus Extra Strength MUCUS Relief

COMPLET
plus anti-MUCOSITÉS extra-fort

DIN 02357232

250 mL Syrup / Sirop

PAA144096

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (per teaspoon or 5 mL) **/ Ingrédients actifs** (par cuillère à thé ou 5 mL) — **Purposes / Utilités**

Acetaminophen 325 mg / Acétaminophène à 325 mg	Pain reliever and fever reducer / Analgésique et antipyrétique
Guaifenesin 200 mg (Extra strength) / Guaïfénésine à 200 mg (extra-fort)	Cough expectorant / Expectorant
Menthol 20 mg / Menthol à 20 mg	Cough suppressant and Nasal decongestant / Antitussif et décongestionnant nasal

Uses / Usages •Temporarily relieves the following symptoms due to cold and flu: •wet cough or chest congestion •dry cough •nasal and sinus congestion •fever and chills •headache •sore throat pain •minor body aches and pains. Helps loosen phlegm or mucus and thin lung secretions. / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •toux grasse ou congestion de la poitrine •toux sèche •congestion nasale et des sinus •fièvre et frissons •maux de tête •maux de gorge •courbatures et douleurs légères. Aide à déloger et à éclaircir les mucosités des poumons.

Warnings / Mises en garde

Liver warning: / Avertissement – foie : Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite / L'acétaminophène peut causer de **graves lésions au foie pouvant entraîner la mort** si vous prenez ce médicament •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions ▼

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

au foie peuvent comprendre •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit.

Allergy alert: / Alerte aux allergies : Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include •skin reddening •blisters •rash. **If any of these symptoms occur, stop use and seek medical help right away.** / L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Les symptômes peuvent comprendre •rougeur •cloques •éruption cutanée. **Si l'un ou l'autre de ces symptômes se manifeste, cessez d'utiliser le produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.**

Do not use / Ne pas utiliser •with any other drug containing **acetaminophen** or other cough and cold medication •if you are allergic to acetaminophen or other ingredients in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. / •avec un autre médicament contenant de **l'acétaminophène** ou tout autre médicament contre la toux et le rhume •si vous êtes allergique à l'acétaminophène ou à d'autres ingrédients de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •have •liver or kidney disease •a persistent cough that has not gone away •difficulty breathing •asthma or other chronic lung conditions •take the blood thinning drug warfarin •are pregnant or breastfeeding / •êtes enceinte ou allaitez •avez une maladie du foie ou des reins •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •avez une toux persistante •avez de la difficulté à respirer •souffrez d'asthme ou d'une autre maladie pulmonaire chronique.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •pain lasts more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat pain lasts for more than 2 days •symptoms worsen or last for more than 7 days •you have a high fever (>38°C) or a headache that does not go away •you develop a rash •you cough up thick yellow or green mucus / •la douleur dure plus de 5 jours •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez une forte fièvre (> 38 °C) ou des maux de tête qui persistent •vous présentez une éruption cutanée •votre toux s'accompagne d'épaisses mucosités jaunes ou vertes.

● **Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants.** This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à la santé d'un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi

•Adults and children 12 years and over: •Shake well before using. •Take 2 teaspoons (10 mL) every 4 to 6 hours. •Do not take more than 40 mL in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). •If preferred, mix with equal parts honey. / •Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Bien agiter avant d'utiliser. •Prendre 2 cuillères à thé (10 mL) toutes les 4 à 6 heures. •Ne pas prendre plus de 40 mL en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la quantité indiquée (voir la mise en garde concernant les lésions au foie). •Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel. ▼

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use •Store at room temperature 15 – 25°C •Security feature: Do not use if sealed carton ends are broken or torn / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, caramel colour, carrageenan, glycerin, pine needle oil, polyethylene glycol, propylparaben, sodium cyclamate, tincture of capsicum, water. / Baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, colorant caramel, cyclamate de sodium, eau, glycérine, huile d'aiguille de pin, polyéthylèneglycol, propylparabène, teinture de piment sec.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 6L4
Trademarks owned or licensed by GSK./M. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK.
©2020 GSK or licensor./GSK ou son concédant de licence.