Drug Facts (continued) / Info-médicament (suite)

recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite / L'acétaminophène peut causer de **graves lésions au foie pouvant entraîner la mort** si vous prenez ce médicament •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit.

Allergy alert / Alerte aux allergies Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include •skin reddening •blisters •rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.** / L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Les symptômes peuvent comprendre •rougeur •cloques •éruption cutanée. **Si l'un ou l'autre de ces symptômes se manifeste, cessez d'utiliser le produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.**

Do not use / Ne pas utiliser •with any other drug containing **acetaminophen** or any other cough and cold product •if you are allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug. / •avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène** ou d'autres médicaments contre la toux ou le rhume •en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines après avoir cessé de prendre un IMAO.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •have liver, kidney, heart or thyroid disease, high blood pressure, diabetes, glaucoma, difficulty urinating •are taking blood thinning drug warfarin •are pregnant or breastfeeding •have a persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •have a cough with excessive phlegm (mucus) •have difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •take sedatives or tranquilizers •are taking medication for weight control •have any other serious medical condition. / •avez une maladie du foie, des reins, du cœur ou de la thyroïde; une tension artérielle élevée, un glaucome, le diabète ou de la difficulté à uriner •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •êtes enceinte ou allaitez •avez une toux persistante comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou une autre maladie pulmonaire chronique (ces symptômes pourraient indiquer un problème grave) •prenez des sédatifs ou des tranquillisants •prenez des médicaments pour perdre du poids •souffrez d'un autre problème de santé grave.

When using this product / Lorsque vous utilisez ce produit (Extra Cautions for Night only) •drowsiness may occur •alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness •do not drive or engage in activities requiring alertness •avoid alcoholic drinks •excitability may occur, especially in children / (Mises en garde supplémentaires, Nuit seulement) •vous pourriez éprouver de la somnolence •la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence •abstenez-vous de conduire un véhicule ou d'entreprendre des activités exigeant de la vigilance •évitez les boissons alcoolisées •il existe un risque d'excitabilité, en particulier chez les enfants.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •new symptoms appear, symptoms worsen or last for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat lasts for more than 2 days •you develop a high fever (>38°C), rash or a headache that won't go away •you cough up thick yellow or green mucus •you are nervous, dizzy, can't sleep / •vos symptômes s'aggravent ou durent plus de 5 jours, ou de nouveaux symptômes apparaissent •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •vous avez de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste •votre toux s'accompagne d'épaisses mucosités jaunes ou vertes •vous êtes nerveux, étourdi ou incapable de dormir.

Drug Facts (continued) / Info-médicament (suite)

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à la santé d'un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi
Adults and children 12 years and over: •Take 2 day or night capsules every 4-6 hours. Do not exceed a combined total of any 8 Day or Night capsules in 24 hours. Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). / Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Prendre 2 capsules formule Jour ou Nuit toutes les 4 à 6 heures. Ne pas dépasser une dose totale de 8 capsules formule Jour ou Nuit en 24 heures. Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la quantité indiquée (avertissement - foie).

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 25°C. Do not use if child-resistant, sealed blister unit is broken. / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). Ne pas utiliser si la plaquette alvéolée scellée à l'épreuve des enfants est brisée.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol, water; (Day only): D&C Yellow #10, FD&C Red #40 (Night only): FD&C Blue #1 / Eau, encre pharmaceutique, gélatine, glycérine, polyéthylèneglycol, povidone, propylèneglycol, sorbitol; (Jour seulement) : jaune D&C n° 10, rouge FD&C n° 40; (Nuit seulement) : bleu FD&C n° 1.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

Liquid Gels
Gélules liquides

COMPLETE | COMPLET

24 HOUR PACK
EMBALLAGE POUR 24 HEURES

NON DROWSY DAY
SANS SOMNOLENCE JOUR
24 CAPSULES

NIGHT LETS YOU REST
NUIT VOUS PERMET DE VOUS REPOSER
24 CAPSULES

with MUCUS RELIEF
ANTI-MUCOSITÉS

48 CAPSULES
DIN 02496027

Contains acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Sore throat pain and dry cough
Maux de gorge et toux sèche

Sinus and nasal congestion
Congestion nasale et des sinus

Minor aches and pain
Courbatures et douleurs légères

Fever and chills
Fièvre et frissons

Headache
Maux de tête

Mucus and phlegm
Mucosités

Runny nose and sneezing
Écoulement nasal et éternuements

Itchy and watery eyes
Larmoiement et picotement des yeux

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in each Day capsule) / Ingrédients actifs (dans chaque capsule formule Jour)	Purposes / Utilités
Acetaminophen 250 mg / **Acétaminophène à 250 mg**	Pain reliever, fever reducer / Analgésique et antipyrétique
Dextromethorphan hydrobromide 10 mg	Cough suppressant
Bromhydrate de dextrométhorphane à 10 mg	Antitussif
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg	Nasal decongestant
Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 30 mg	Décongestionnant nasal
Guaifenesin 100 mg	Cough Expectorant
Guaifénésine à 100 mg	Expectorant

Active ingredients (in each Night capsule) / Ingrédients actifs (dans chaque capsule formule Nuit)	Purposes / Utilités
Acetaminophen 325 mg / **Acétaminophène à 325 mg**	Pain reliever, fever reducer / Analgésique et antipyrétique
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg	Cough suppressant
Bromhydrate de dextrométhorphane à 15 mg	Antitussif
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg	Nasal decongestant
Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 30 mg	Décongestionnant nasal
Doxylamine succinate 6.25 mg	Antihistamine
Succinate de doxylamine à 6,25 mg	Antihistaminique

Uses / Usages •Temporary relief from the following symptoms due to cold and flu: •headache •minor aches and pain •fever and chills •sinus and nasal congestion •sinus pressure •sore throat pain •dry cough (Additional uses for day only) •chest congestion •wet cough (Additional uses for night only) •sneezing •runny nose •itchy & watery eyes / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •maux de tête •courbatures et douleurs légères •fièvre et frissons •congestion nasale et des sinus •pression sinusale •maux de gorge •toux sèche; (usages supplémentaires, Jour seulement) •congestion bronchique •toux grasse; (usages supplémentaires, Nuit seulement) •éternuements •écoulement nasal •larmoiement et picotement des yeux.

Warnings / Mises en garde
Liver warning / Avertissement - foie Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take •more than the

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 6J4
©2020 GSK group of companies or its licensor/Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

P104685