Uses / Usages •Temporary relief from the following symptoms due to cold and flu: •headache •minor aches and pain •fever and chills •sinus and nasal congestion •sinus pressure •sore throat pain •dry cough •chest congestion •wet cough. Helps loosen phlegm or mucus and thin lung secretions. / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •maux de tête •courbatures et douleurs légères •fièvre et frissons •congestion nasale et des sinus •pression sinusale •maux de gorge •toux sèche •congestion bronchique •toux grasse. Aide à dégager les mucosités et à éclaircir les sécrétions pulmonaires.

Warnings / Mises en garde

Liver warning / Avertissement - foie Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite / L'acétaminophène peut causer de **graves lésions au foie pouvant entraîner la mort** si vous prenez ce médicament •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit.

Allergy alert / Alerte aux allergies Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include •skin reddening •blisters •rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.** / L'acétaminophène peut causer de graves réactions cutanées. Les symptômes peuvent comprendre •rougeur •cloques •éruption cutanée. **Si l'un ou l'autre de ces symptômes se manifeste, cessez d'utiliser le produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.**

Do not use / Ne pas utiliser •with any other drug containing **acetaminophen** or any other cough and cold product •if you are allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug / •avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène** ou d'autres médicaments contre la toux ou le rhume •en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines après avoir cessé de prendre un IMAO.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •have liver, kidney, heart or thyroid disease, high blood pressure, diabetes, difficulty urinating •are taking blood thinning drug warfarin •are pregnant or breastfeeding •have a persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •have a cough with excessive phlegm (mucus) •have difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •are taking medication for weight control •have any other serious medical condition / •avez une maladie du foie, des reins, du cœur ou de la thyroïde; une tension artérielle élevée, le diabète ou de la difficulté à uriner •prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •êtes enceinte ou allaitez •avez une toux persistante comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou une autre maladie pulmonaire chronique (ces symptômes pourraient indiquer un problème grave) •prenez des médicaments pour perdre du poids •souffrez d'un autre problème de santé grave.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •new symptoms appear, symptoms worsen or last for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat lasts for more than 2 days •you develop a high fever (>38°C), a rash or a headache that won't go away •you cough up thick yellow or green mucus •you are nervous, dizzy, can't sleep / •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 5 jours, ou de nouveaux symptômes apparaissent •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •vous avez de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste •votre toux s'accompagne d'épaisses mucosités jaunes ou vertes •vous êtes nerveux, étourdi ou incapable de dormir.

● **Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants.** This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à la santé d'un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi Adults and children 12 years and over: •Take 2 capsules every 4-6 hours. Do not take more than 8 capsules in 24 hours. Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings) / Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Prendre 2 capsules toutes les 4 à 6 heures. Ne pas prendre plus de 8 capsules en 24 heures. Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la quantité indiquée (avertissement - foie).

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 25°C. Do not use if child-resistant, sealed blister unit is broken. / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). Ne pas utiliser si la plaquette alvéolée scellée à l'épreuve des enfants est brisée.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs D&C Yellow #10, FD&C Red #40, gelatin, glycerin, pharmaceutical ink, polyethylene glycol, povidone, propylene glycol, sorbitol, water / Eau, encre pharmaceutique, gélatine, glycérine, jaune D&C n° 10, polyéthylèneglycol, povidone, propylèneglycol, rouge FD&C n° 40, sorbitol.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

DIN 02335948

24 CAPSULES

NON DROWSY DAY | JOUR SANS SOMNOLENCE

COMPLETE + MUCUS Relief | COMPLET + anti-MUCOSITÉS

Buckley's

Liquid Gels
Gélules liquides

Mucus and phlegm ■ Mucosités
Chest Congestion ■ Congestion de la poitrine
Sore throat pain and dry cough ■ Maux de gorge et toux sèche
Headache ■ Maux de tête
Minor aches and pain ■ Courbatures et douleurs légères
Fever and chills ■ Fièvre et frissons
Sinus and nasal congestion ■ Congestion nasale et des sinus

Contains acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (in each capsule) / **Ingrédients actifs** (dans chaque capsule)	**Purposes / Utilités**
Acetaminophen 250 mg / **Acétaminophène à 250 mg**	Pain reliever & fever reducer / Analgésique et antipyrétique
Dextromethorphan hydrobromide 10 mg / Bromhydrate de dextrométhorphane à 10 mg	Cough suppressant / Antitussif
Guaifenesin 100 mg / Guaifénésine à 100 mg	Cough expectorant / Expectorant
Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg / Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 30 mg	Nasal decongestant / Décongestionnant nasal

P104680

The Buckley's Company Mississauga, ON L5N 6L4
©2020 GSK group of companies or its licensor/Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

0 58478 10697 7