Drug Facts (continued) / Info-médicament (suite)

a persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •have a cough with excessive phlegm (mucus) •have difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •take any other cough and cold medication / •êtes enceinte ou allaitez •avez une toux persistante (comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème) •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou souffrez d'une autre maladie pulmonaire chronique. Ces signes pourraient indiquer un problème grave. •prenez d'autres médicaments contre la toux et le rhume.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days •you develop a high fever (>38°C), rash or a headache that won't go away / •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez une forte fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi
•Adults and children 12 years and over: •Shake well before using •Take 2 teaspoons (10 mL) every 6-8 hours. •Do not take more than 40 mL in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed. •If preferred, mix with equal parts honey. / •Adultes et enfants de 12 ans et plus : •Bien agiter avant d'utiliser •Prendre 2 c. à thé (10 mL) toutes les 6 à 8 heures. •Ne pas prendre plus de 40 mL en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas administrer. •Ne pas dépasser la dose indiquée. •Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 25°C. •Security feature: Do not use if sealed carton ends are broken or torn. / •Gardez la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15-25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, capsicum annuum extract, carrageenan, glycerin, menthol, pine oil purnilio, purified water, sodium saccharin. / Baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, eau purifiée, extrait de Capsicum annuum, glycérine, huile essentielle de pin, menthol, saccharine sodique.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The Buckley's Company
Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks owned or licensed by GSK/
M. de commerce appartenant à GSK ou
licence par GSK
©2021 GSK or licensor/GSK ou son
concédant de licence.

0 60815151397 3

DRY COUGH
EXTRA STRENGTH
Dextromethorphan hydrobromide oral solution, USP

TOUX SÈCHE
EXTRA FORT
Solution orale à base de bromhydrate de dextrométhorphane, USP

250 mL

DIN 02511320

Buckley's

Buckley's

SINCE 1919 DEPUIS

COUGH SUPPRESSANT
ANTITUSSIF

- **Dry hacking cough**
  Toux sèche et quinteuse
- **Dry cough from colds**
  Toux sèche causée par le rhume
- **Cough from irritated throat**
  Toux causée par une gorge irritée

PLUS Soothes throat
PLUS Adoucit la gorge

8h
UP TO 8 HOUR RELIEF
JUSQU'À 8 HEURES DE SOULAGEMENT

NON-DROWSY
SANS SOMNOLENCE

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredient (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédient actif** (dans 1 c. à thé [5 mL]) — **Purpose / Utilité**
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg / Bromhydrate de dextrométhorphane à 15 mg ..... Cough suppressant / Antitussif

Uses / Usages •Temporary relief of dry cough due to minor throat or lung irritation from a cold or inhaled irritants / •Soulagement temporaire de la toux sèche due à l'irritation mineure de la gorge ou des poumons causée par un rhume ou l'inhalation d'irritants

Warnings / Mises en garde
Do not use / Ne pas utiliser •if you are allergic to dextromethorphan hydrobromide or any other ingredient in this product •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug •with other drugs containing dextromethorphan / •si vous êtes allergique au bromhydrate de dextrométhorphane ou à tout autre ingrédient de ce produit •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines après avoir cessé de prendre un IMAO •avec d'autres médicaments contenant du dextrométhorphane.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •are pregnant or breastfeeding •have ▼

620000007689

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

a persistent cough such as occurs with smoking, asthma or emphysema •have a cough with excessive phlegm (mucus) •have difficulty breathing or other chronic lung conditions. These could be signs of a serious condition. •take any other cough and cold medication / •êtes enceinte ou allaitez •avez une toux persistante (comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème) •avez une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •avez de la difficulté à respirer ou souffrez d'une autre maladie pulmonaire chronique. Ces signes pourraient indiquer un problème grave. •prenez d'autres médicaments contre la toux et le rhume.

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days •you develop a high fever (>38°C), rash or a headache that won't go away / •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez une forte fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée ou un mal de tête qui persiste.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms. / En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi
•Adults and children 12 years and over: •Shake well before using •Take 2 teaspoons (10 mL) every 6-8 hours. •Do not take more than 40 mL in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed. •If preferred, mix with equal parts honey. / •Adultes et enfants de 12 ans et plus : •Bien agiter avant d'utiliser •Prendre 2 c. à thé (10 mL) toutes les 6 à 8 heures. •Ne pas prendre plus de 40 mL en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas administrer. •Ne pas dépasser la dose indiquée. •Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 25°C. •Security feature: Do not use if sealed carton ends are broken or torn. / •Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15-25 °C). •Dispositif de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, capsicum annuum extract, carrageenan, glycerin, menthol, pine oil purnilio, purified water, sodium saccharin. / Baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, eau purifiée, extrait de Capsicum annuum, glycérine, huile essentielle de pin, menthol, saccharine sodique.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The Buckley's Company
Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks owned or licensed by GSK/
Marques de commerce appartenant à ou
M. de C. détenues sous licence par GSK
©2021 GSK or licensor/GSK ou son
concédant de licence.

0 60815151397 3

DRY COUGH
EXTRA STRENGTH
Dextromethorphan hydrobromide oral solution, USP

TOUX SÈCHE
EXTRA FORT
Solution orale à base de bromhydrate de dextrométhorphane, USP

250 mL

DIN 02511320

Buckley's

Buckley's
SINCE DEPUIS 1919

COUGH SUPPRESSANT
ANTITUSSIF

- **Dry hacking cough**
  Toux sèche et quinteuse
- **Dry cough from colds**
  Toux sèche causée par le rhume
- **Cough from irritated throat**
  Toux causée par une gorge irritée

PLUS Soothes throat
PLUS Adoucit la gorge

8h
UP TO 8 HOUR RELIEF
JUSQU'À 8 HEURES DE SOULAGEMENT

NON-DROWSY
SANS SOMNOLENCE

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredient (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédient actif** (dans 1 c. à thé [5 mL]) — **Purpose / Utilité**
Dextromethorphan hydrobromide 15 mg / Bromhydrate de dextrométhorphane à 15 mg ..... Cough suppressant / Antitussif

Uses / Usages •Temporary relief of dry cough due to minor throat or lung irritation from a cold or inhaled irritants / •Soulagement temporaire de la toux sèche due à l'irritation mineure de la gorge ou des poumons causée par un rhume ou l'inhalation d'irritants

Warnings / Mises en garde
Do not use / Ne pas utiliser •if you are allergic to dextromethorphan hydrobromide or any other ingredient in this product •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug •with other drugs containing dextromethorphan / •si vous êtes allergique au bromhydrate de dextrométhorphane ou à tout autre ingrédient de ce produit •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines après avoir cessé de prendre un IMAO •avec d'autres médicaments contenant du dextrométhorphane.

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •are pregnant or breastfeeding •have ▼

6200000070899