Do not use / Ne pas utiliser •with any other product containing diphenhydramine, even one used on skin / • avec tout autre produit contenant de la diphenhydramine, même si ce produit est appliqué sur la peau,

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous • are pregnant or nursing • have asthma, glaucoma, emphysema, chronic bronchitis, difficulty in urination • have a persistent cough that lasts or recurs as may occur with smoking, asthma or chronic bronchitis • have a cough that occurs with excessive phlegm (mucus) • have heart disease, high blood pressure, diabetes, thyroid disease • are taking other drugs • are taking sedatives or tranquilizers / • êtes enceinte ou allaitez • souffrez de glaucome • souffrez de problèmes respiratoires comme l'emphysème ou la bronchite chronique • avez de la difficulté à uriner • prenez des sédatifs ou des tranquillisants • prenez d'autres médicaments contre la toux et le rhume.

When using this product / Lorsque vous utilisez ce produit •drowsiness may occur • alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness • avoid alcoholic beverages • marked decrease in alertness may occur • be careful when driving or operating machinery • you may experience an increase in sensitivity to sunlight • excitability may occur, especially in children / • vous pourriez éprouver de la somnolence • la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence • abstenez-vous de conduire un véhicule ou d'entreprendre des activités exigeant de la vigilance • évitez les boissons alcoolisées • il existe un risque d'excitabilité, en particulier chez les enfants.

Stop use and ask a doctor if / Cesser d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days or cough is accompanied by a high fever (>38 °C) or the production of thick, yellow or green mucus / • les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours • la toux s'accompagne d'une forte fièvre (> 38 °C) ou d'épaisses mucosités jaunes ou vertes.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away, / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi
Adults and children 12 years and over: •Shake well before using. •Take 2 to 3 teaspoons (10 to 15 mL) at or before bedtime. •Do not take more than 4 doses (60 mL) in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •If preferred, mix with equal parts honey. / Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Bien agiter avant d'utiliser. •Prendre de 2 à 3 cuillères à thé (de 10 à 15 mL) au coucher ou dans la soirée. •Ne pas prendre plus de 4 doses (60 mL) en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15–25°C. •Close tightly. / •Conserver la boîte pour consulter les renseignements importants avant chaque utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Bien fermer. / •Bien conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Bien fermer. •Dégoût de sécurité : Ne pas utiliser si les extrémités scellées de la boîte sont brisées ou déchirées.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, carrageenan, glycerin, pine needle oil, propylparaben, sodium cyclamate, tincture of capsicum, water, / Baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, cyclamate de sodium, eau, glycérine, huile d'aiguille de pin, propylparabène, teinture de piment sec.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The **Buckley's Company** Mississauga, ON L5N 6L4
Trademarks owned or licensed by GSK. Ma. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK.
©2021 GSK or licensor. GSK ou son concédant de licence.

Buckley's

0 65515 01997 8

Buckley's

MÉLANGE ORIGINAL MIXTURE

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Dry Cough
  la toux sèche
- Congestion
  la congestion
- Sneezing & Runny Nose
  les éternuements et l'écoulement nasal

NIGHTTIME / NUIT

COUGH & CONGESTION
TOUX ET CONGESTION

DIN 02230939

100 mL Syrup / Sirop

PAA175915

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients actifs** (par cuillère à thé ou 5 mL)	**Purposes / Utilités**
Diphenhydramine hydrochloride 12.5 mg	Antihistamine and cough suppressant
Chlorhydrate de diphénhydramine à 12,5 mg	Antihistaminique et antitussif
Menthol 4.2 mg	Nasal decongestant
Menthol à 2,2 mg	Décongestionnant nasal

Uses / Usages • Temporarily relieves the following symptoms due to common cold: •dry cough •sneezing •runny nose •nasal congestion •itchy, watery eyes / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume : •toux sèche •éternuements •écoulement nasal •congestion nasale •démangeaison et picotement des yeux.

Warnings / Mises en garde

Do not use / Ne pas utiliser •with any other product containing diphenhydramine, even one used on skin / •avec tout autre produit contenant de la diphenhydramine, même si ce produit est appliqué sur la peau,

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •are pregnant or nursing •have asthma, emphysema, chronic bronchitis, or persistent cough that may accompany these conditions •have difficulty urinating due to enlargement of prostate gland •have glaucoma •have a cough that occurs with too much phlegm (mucus) •are taking a cough suppressant, expectorant, nasal decongestant or other cold medication / •êtes enceinte ou allaitez •souffrez de glaucome •souffrez de problèmes respiratoires comme l'emphysème ou la bronchite chronique ou toussez avec beaucoup de glaires •avez de la difficulté à uriner •prenez des sédatifs ou des tranquillisants •prenez d'autres médicaments contre la toux et le rhume,

When using this product / Lorsque vous utilisez ce produit •drowsiness may occur •alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness •avoid alcoholic beverages •take only according to directions •marked drowsiness may occur •avoid alcoholic beverages •be careful when driving or operating machinery / •vous pourriez éprouver de la somnolence •la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence •abstenez-vous de conduire un véhicule ou d'entreprendre des activités exigeant de la vigilance •évitez les boissons alcoolisées •il existe un risque d'excitabilité, en particulier chez les enfants,

Stop use and ask a doctor if / Cesser d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days or cough is accompanied by a high fever (>38 °C) or the production of thick, yellow or green mucus / •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •la toux s'accompagne d'une forte fièvre (> 38 °C) ou d'épaisses mucosités jaunes ou vertes,

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away, even if you don't notice any symptoms. / En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement.

Directions / Mode d'emploi
Adults and children 12 years and over: •Shake well before using. •Take 2 to 3 teaspoons (10 to 15 mL) at or before bedtime. •Do not take more than 4 doses (60 mL) in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •If preferred, mix with equal parts honey. / Adultes et enfants de 12 ans ou plus : •Bien agiter avant d'utiliser. •Prendre de 2 à 3 cuillères à thé (de 10 à 15 mL) au coucher ou dans la soirée. •Ne pas prendre plus de 4 doses (60 mL) en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Si désiré, mélanger en parts égales avec du miel.

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15–25°C. •Close tightly. •Protect from excessive heat and humidity. / •Conserver la boîte pour consultation ultérieure de renseignements importants sur l'utilisation. •Conserver à la température ambiante (15 – 25 °C). •Refermer hermétiquement. •Protéger de la chaleur excessive et de l'humidité.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Ammonium carbonate, camphor, Canada balsam, carrageenan, glycerin, pine needle oil, propylparaben, sodium cyclamate, tincture of capsicum, water, / Baume du Canada, camphre, carbonate d'ammonium, carraghénane, cyclamate de sodium, eau, glycérine, huile d'aiguille de pin, propylparaben, teinture de piment sec,

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 www.buckleys.ca

The **Buckley's Company** Mississauga, ON L5N 6L4
Trademarks owned or licensed by GSK. Ma. de c. détenues ou utilisées sous licence par GSK.
©2021 GSK or licensor. GSK ou son concédant de licence.

Buckley's

0 65515 01997 8

Buckley's

MÉLANGE ORIGINAL MIXTURE

Fast relief of:
Soulage rapidement :

- Dry Cough
  la toux sèche
- Congestion
  la congestion
- Sneezing & Runny Nose
  les éternuements et l'écoulement nasal

NIGHTTIME / NUIT

COUGH & CONGESTION
TOUX ET CONGESTION

DIN 02230939

100 mL Syrup / Sirop

PAA175915

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients actifs** (par cuillerée à thé ou 5 mL)	**Purposes / Utilités**
Diphenhydramine hydrochloride 12.5 mg	Antihistamine and cough suppressant
Chlorhydrate de diphénhydramine à 12,5 mg	Antihistaminique et antitussif
Menthol 4.2 mg	Nasal decongestant / Décongestionnant nasal

Uses / Usages • Temporarily relieves the following symptoms due to common cold: •dry cough •sneezing •runny nose •nasal congestion •itchy, watery eyes / •Soulagement temporaire des symptômes suivants causés par le rhume : •toux sèche •éternuements •écoulement nasal •congestion nasale •démangeaison et picotement des yeux.

Warnings / Mises en garde