Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

• des difficultés respiratoires • une maladie pulmonaire chronique (asthme ou emphysème), car ces signes pourraient indiquer un problème grave • une maladie du cœur ou de la glande thyroïde • une hypertension artérielle • un diabète • un glaucome • une diminution de la fonction rénale • tout autre problème de santé grave • prenez tout autre médicament, y compris des produits de santé naturels et des médicaments sur ordonnance ou des médicaments en vente libre

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days •any new symptoms appear •child coughs up thick yellow/green mucus •child has high fever (>38°C) •child has headache that does not go away •allergic reactions such as rash, wheezing or itching develop •Side effects may include allergic reaction, breathing difficulties, convulsions, drowsiness, hallucinations, and rapid heart rate. / •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours • tout nouveau symptôme se manifeste • les crachats de l'enfant sont épais et jaunes ou verdâtres • l'enfant a une forte fièvre (> 38 °C) • l'enfant souffre d'un mal de tête persistant • des symptômes de réaction allergique comme une respiration sifflante, une éruption cutanée ou des démangeaisons apparaissent • Les effets secondaires peuvent inclure des symptômes de réaction allergique, des difficultés respiratoires, des convulsions, de la somnolence, des hallucinations ou une accélération du rythme cardiaque.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. Overdose may result in serious harm. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away, even if you do not notice any signs or symptoms. / Une surdose pourrait avoir des effets nocifs graves. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi Use only the measuring device provided • Children 6 to under 12 years: •Shake well before using •Give 2 teaspoons (10 mL) every 6 hours •Do not give more than 40 mL in 24 hours •Do not use longer than 7 days •Do not exceed the single and maximum daily dose.

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

•Children under 6 years: do not use / Utiliser uniquement le dispositif de mesure fourni. • Enfants de 6 ans à moins de 12 ans : • Bien agiter avant l'utilisation • Administrer 2 cuillères à thé (10 mL) toutes les 6 heures • Ne pas administrer plus de 40 mL en 24 heures • Ne pas utiliser pendant plus de 7 jours •Ne pas dépasser les doses individuelle et quotidienne maximales. • Enfants de moins de 6 ans : ne pas utiliser

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 30°C. If glued carton end flap is broken, do not use. / •Garder la boîte pour consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation • Conserver à la température ambiante (entre 15 et 30 °C) • Ne pas utiliser si le rabat encollé est brisé.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Citric acid, D&C Red No. 33, FD&C Blue No. 1, FD&C Red No. 40, flavour, glycerin, maltol, sodium benzoate, sodium chloride, sodium cyclamate, sodium saccharin, sorbitol and water. / Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, bleu FD&C n° 1, chlorure de sodium, cyclamate de sodium, eau, glycérine, maltol, rouge D&C n° 33, rouge FD&C n° 40, saccharine de sodium, sorbitol.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 ou consultez le site www.buckleys.ca

The Buckley's Company Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies./Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2023 GSK group of companies or its licensor./Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

Jack & Jill

Grape Flavour
Saveur de raisin

Multi-Symptom
Cold & Cough
Rhume et toux
Multisymptômes

DIN 02538606

100 mL

Buckley's

SINCE / DEPUIS 1919

NEW! NOUVEAU

Daytime · Jour
Syrup for ages 6+
Sirop pour les 6 ans et plus

- Dry Cough
  Toux sèche
- Stuffy Nose
  Congestion nasale
- Plus Soothes Throat
  Et apaise la gorge

Up to 6 HR Relief
Jusqu'à 6 h de soulagement

Buckley's Jack & Jill

Grape Flavour
Saveur de raisin

Multi-Symptom
Cold & Cough
Rhume et toux
Multisymptômes

Syrup for ages 6+ • Sirop pour les 6 ans et plus

0 60815403061 9

6936920000029

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (w/v per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients actifs** (p/v dans 1 cuillère à thé ou 5 mL) **Purposes / Utilités**

Dextromethorphan hydrobromide 7.5 mg / Bromhydrate de dextrométhorphane à 7,5 mg ..... Cough suppressant / Antitussif
Pseudoephedrine Hydrochloride 15 mg / Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 15 mg ..... Nasal decongestant / Décongestionnant nasal

Uses / Usages Temporarily relieves the following symptoms due to cold: • dry cough • nasal congestion and stuffiness / Soulagement temporaire des symptômes suivants dus au rhume : • toux sèche • congestion nasale (nez bouché)

Warnings / Mises en garde

Do not use / Ne pas utiliser •with other cough and cold drugs •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), or other drugs for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease, or for 2 weeks after stopping the drug. •if child is allergic to any of the ingredients / • avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume • avec un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO), un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS), ou avec d'autres médicaments employés pour traiter la dépression, les troubles psychiatriques ou émotionnels, ou la maladie de Parkinson, ni dans les 2 semaines suivant l'arrêt du médicament. • si l'enfant est allergique à l'un ou l'autre des ingrédients

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous have a child that has/is •chronic cough •a cough with excessive mucus •difficulty breathing •chronic lung disease (i.e. asthma or emphysema). These could be signs of a serious condition •heart or thyroid disease •high blood pressure •diabetes •glaucoma •decreased kidney function •any other serious medical conditions •taking any other medication including natural health products, prescription drugs or nonprescription drugs / avez un enfant qui a/est • une toux chronique • une toux avec production excessive de mucus

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

• des difficultés respiratoires • une maladie pulmonaire chronique (asthme ou emphysème), car ces signes pourraient indiquer un problème grave • une maladie du cœur ou de la glande thyroïde • une hypertension artérielle • un diabète • un glaucome • une diminution de la fonction rénale • tout autre problème de santé grave • prenez tout autre médicament, y compris des produits de santé naturels et des médicaments sur ordonnance ou des médicaments en vente libre

Stop use and ask a doctor if / Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •symptoms worsen or last for more than 7 days •any new symptoms appear •child coughs up thick yellow/green mucus •child has high fever (>38°C) •child has headache that does not go away •allergic reactions such as rash, wheezing or itching develop •Side effects may include allergic reaction, breathing difficulties, convulsions, drowsiness, hallucinations, and rapid heart rate. / •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours • tout nouveau symptôme se manifeste • les crachats de l'enfant sont épais et jaunes ou verdâtres • l'enfant a une forte fièvre (> 38 °C) • l'enfant souffre d'un mal de tête persistant • des symptômes de réaction allergique comme une respiration sifflante, une éruption cutanée ou des démangeaisons apparaissent • Les effets secondaires peuvent inclure des symptômes de réaction allergique, des difficultés respiratoires, des convulsions, de la somnolence, des hallucinations ou une accélération du rythme cardiaque.

Keep out of reach of children. / Garder hors de la portée des enfants. Overdose may result in serious harm. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away, even if you do not notice any signs or symptoms. / Une surdose pourrait avoir des effets nocifs graves. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement, même en l'absence de signes ou de symptômes.

Directions / Mode d'emploi Use only the measuring device provided • Children 6 to under 12 years: •Shake well before using •Give 2 teaspoons (10 mL) every 6 hours •Do not give more than 40 mL in 24 hours •Do not use longer than 7 days •Do not exceed the single and maximum daily dose.

Drug Facts (continued) / **Info-médicament** (suite)

•Children under 6 years: do not use / Utiliser uniquement le dispositif de mesure fourni. • Enfants de 6 ans à moins de 12 ans : • Bien agiter avant l'utilisation • Administrer 2 cuillères à thé (10 mL) toutes les 6 heures • Ne pas administrer plus de 40 mL en 24 heures • Ne pas utiliser pendant plus de 7 jours •Ne pas dépasser les doses individuelle et quotidienne maximales. • Enfants de moins de 6 ans : ne pas utiliser

Other information / Autres renseignements •Keep and consult carton for important information before each use. •Store at room temperature 15 – 30°C. If glued carton end flap is broken, do not use. / •Garder la boîte pour consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation • Conserver à la température ambiante (entre 15 et 30 °C) • Ne pas utiliser si le rabat encollé est brisé.

Inactive ingredients / Ingrédients inactifs Citric acid, D&C Red No. 33, FD&C Blue No. 1, FD&C Red No. 40, flavour, glycerin, maltol, sodium benzoate, sodium chloride, sodium cyclamate, sodium saccharin, sorbitol and water. / Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, bleu FD&C n° 1, chlorure de sodium, cyclamate de sodium, eau, glycérine, maltol, rouge D&C n° 33, rouge FD&C n° 40, saccharine de sodium, sorbitol.

Questions? Call / Composez le 1-800-434-1034 ou consultez le site www.buckleys.ca

The Buckley's Company Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies./Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2023 GSK group of companies or its licensor./Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.



Jack & Jill

Grape Flavour
Saveur de raisin

Multi-Symptom
Cold & Cough
Rhume et toux
Multisymptômes

DIN 02538606

100 mL

Buckley's

SINCE 1919 DEPUIS

NEW NOUVEAU

Daytime · Jour
Syrup for ages 6+
Sirop pour les 6 ans et plus

- Dry Cough
  Toux sèche
- Stuffy Nose
  Congestion nasale
- Plus Soothes Throat
  Et apaise la gorge

Up to 6 HR Relief
Jusqu'à 6 h de soulagement

Buckley's Jack & Jill

Grape Flavour
Saveur de raisin

Multi-Symptom
Cold & Cough
Rhume et toux
Multisymptômes

Syrup for ages 6+ • Sirop pour les 6 ans et plus

Drug Facts / Info-médicament

Active ingredients (w/v per teaspoon or 5 mL) / **Ingrédients actifs** (p/v dans 1 cuillère à thé ou 5 mL) **Purposes / Utilités**

Dextromethorphan hydrobromide 7.5 mg / Bromhydrate de dextrométhorphane à 7,5 mg ..... Cough suppressant / Antitussif
Pseudoephedrine Hydrochloride 15 mg / Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 15 mg ..... Nasal decongestant / Décongestionnant nasal

Uses / Usages Temporarily relieves the following symptoms due to cold: • dry cough • nasal congestion and stuffiness / Soulagement temporaire des symptômes suivants dus au rhume : • toux sèche • congestion nasale (nez bouché)

Warnings / Mises en garde

Do not use / Ne pas utiliser •with other cough and cold drugs •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), or other drugs for depression, psychiatric or emotional conditions, or Parkinson's disease, or for 2 weeks after stopping the drug. •if child is allergic to any of the ingredients / • avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume • avec un inhibiteur de la monoamine-oxydase (IMAO), un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (ISRS), ou avec d'autres médicaments employés pour traiter la dépression, les troubles psychiatriques ou émotionnels, ou la maladie de Parkinson, ni dans les 2 semaines suivant l'arrêt du médicament. • si l'enfant est allergique à l'un ou l'autre des ingrédients

Ask a doctor or pharmacist before use if you / Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous have a child that has/is •chronic cough •a cough with excessive mucus •difficulty breathing •chronic lung disease (i.e. asthma or emphysema). These could be signs of a serious condition •heart or thyroid disease •high blood pressure •diabetes •glaucoma •decreased kidney function •any other serious medical conditions •taking any other medication including natural health products, prescription drugs or nonprescription drugs / avez un enfant qui a/est • une toux chronique • une toux avec production excessive de mucus