



LOT
EXP

Contient Acetaminophène and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

NEOCITRAN

HALLEON



EXTRA STRENGTH EXTRA FORT
RHUME ET SINUS
LEMON / CITRON

• Sinus & nasal congestion
• Sore throat pain & headache
• Runny nose & sneezing
• Congestion nasale et sinuiale
• Maux de gorge et maux de tête
• Écoulement nasal et éternuements

**SO YOU CAN REST
POUR QUE VOUS PUISIEZ VOUS REPOSER**
10 TABLETS (BOITES) POWERFUL 10 TABLETS (BOITES) POUSSIERE

Drug Facts (continued)
Show use and ask a doctor if
Lasts more than 3 days. • Fever (high temperature) that is not getting better after 3 days.
• Rash or hives that is not getting better after 3 days.
• Vomiting or diarrhea that lasts for more than 3 days.
• Stomach pain or discomfort that lasts for more than 3 days.
• Dizziness or lightheadedness that lasts for more than 3 days.
• Severe headache that lasts for more than 3 days.
• Severe sore throat that lasts for more than 3 days.
• Severe cough that lasts for more than 3 days.
• Severe sneezing that lasts for more than 3 days.
• Severe runny nose that lasts for more than 3 days.
• Severe nasal congestion that lasts for more than 3 days.
• Severe sinus pain that lasts for more than 3 days.
• Severe facial pain that lasts for more than 3 days.
• Severe eye pain that lasts for more than 3 days.
• Severe ear pain that lasts for more than 3 days.
• Severe throat pain that lasts for more than 3 days.
• Severe chest pain that lasts for more than 3 days.
• Severe abdominal pain that lasts for more than 3 days.
• Severe back pain that lasts for more than 3 days.
• Severe joint pain that lasts for more than 3 days.
• Severe muscle pain that lasts for more than 3 days.
• Severe fatigue that lasts for more than 3 days.
• Severe weakness that lasts for more than 3 days.
• Severe loss of appetite that lasts for more than 3 days.
• Severe nausea that lasts for more than 3 days.
• Severe vomiting that lasts for more than 3 days.
• Severe diarrhea that lasts for more than 3 days.
• Severe constipation that lasts for more than 3 days.
• Severe bloating that lasts for more than 3 days.
• Severe gas that lasts for more than 3 days.
• Severe indigestion that lasts for more than 3 days.
• Severe heartburn that lasts for more than 3 days.
• Severe acid reflux that lasts for more than 3 days.
• Severe allergic reactions that last longer than 3 days or are worse than the first reaction.
• Severe allergic reactions that occur more than once.
• Severe allergic reactions that are life-threatening or require medical attention.
• Severe allergic reactions that cause difficulty breathing or swallowing.
• Severe allergic reactions that cause hives or a rash.
• Severe allergic reactions that cause swelling of the face, lips, or tongue.
• Severe allergic reactions that cause dizziness or lightheadedness.
• Severe allergic reactions that cause fainting or loss of consciousness.
• Severe allergic reactions that cause seizures.
• Severe allergic reactions that cause other serious medical conditions.
• Severe allergic reactions that cause death.

Informations (suite)
Indications • Les symptômes graves qui durent plus de 3 jours.
• Fièvre (forte température) qui ne s'améliore pas après 3 jours.
• Éruption cutanée ou boutons qui ne s'améliorent pas après 3 jours.
• Vomitifs ou diarrhées qui durent plus de 3 jours.
• Douleurs d'estomac ou inconfort qui durent plus de 3 jours.
• Vertiges ou étourdissements qui durent plus de 3 jours.
• Forte douleur de tête qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur de gorge qui dure plus de 3 jours.
• Forte toux qui dure plus de 3 jours.
• Forte éternuements qui durent plus de 3 jours.
• Forte rhinite qui dure plus de 3 jours.
• Forte congestion nasale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur sinuiale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur faciale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur oculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur auriculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur de la gorge qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur thoracique qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur abdominale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur au dos qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur articulaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur musculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte fatigue qui dure plus de 3 jours.
• Forte faiblesse qui dure plus de 3 jours.
• Forte perte d'appétit qui dure plus de 3 jours.
• Forte nausée qui dure plus de 3 jours.
• Forte vomissements qui durent plus de 3 jours.
• Forte diarrhée qui dure plus de 3 jours.
• Forte constipation qui dure plus de 3 jours.
• Forte ballonnements qui durent plus de 3 jours.
• Forte gaz qui dure plus de 3 jours.
• Forte indigestion qui dure plus de 3 jours.
• Forte brûlures d'estomac qui durent plus de 3 jours.
• Forte reflux acide qui dure plus de 3 jours.
• Forte réactions allergiques qui durent plus de 3 jours ou qui sont plus graves que la première réaction.
• Forte réactions allergiques qui surviennent plus d'une fois.
• Forte réactions allergiques qui sont graves ou menacent la vie.
• Forte réactions allergiques qui causent des difficultés à respirer ou à avaler.
• Forte réactions allergiques qui causent des démangeaisons ou des rougeurs.
• Forte réactions allergiques qui causent des étourdissements ou des vertiges.
• Forte réactions allergiques qui causent des syncopes ou des perte de conscience.
• Forte réactions allergiques qui causent des convulsions.
• Forte réactions allergiques qui causent d'autres conditions médicales graves.

Autres renseignements
• Gardez le boîtier à l'abri de la lumière et de l'humidité.
• Gardez le boîtier à l'abri de la chaleur.
• Gardez le boîtier à l'abri des enfants et des animaux.
• Évitez l'usage de médicaments contenant du paracétamol pendant le traitement.
• Évitez l'usage de médicaments contenant du paracétamol pendant le traitement.

Informations importantes
Indications • Les symptômes graves qui durent plus de 3 jours.
• Fièvre (forte température) qui ne s'améliore pas après 3 jours.
• Éruption cutanée ou boutons qui ne s'améliorent pas après 3 jours.
• Vomitifs ou diarrhées qui durent plus de 3 jours.
• Douleurs d'estomac ou inconfort qui durent plus de 3 jours.
• Vertiges ou étourdissements qui durent plus de 3 jours.
• Forte douleur de tête qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur de gorge qui dure plus de 3 jours.
• Forte toux qui dure plus de 3 jours.
• Forte éternuements qui durent plus de 3 jours.
• Forte rhinite qui dure plus de 3 jours.
• Forte congestion nasale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur sinuiale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur faciale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur oculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur auriculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur de la gorge qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur thoracique qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur abdominale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur au dos qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur articulaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur musculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte fatigue qui dure plus de 3 jours.
• Forte faiblesse qui dure plus de 3 jours.
• Forte perte d'appétit qui dure plus de 3 jours.
• Forte nausée qui dure plus de 3 jours.
• Forte vomissements qui durent plus de 3 jours.
• Forte diarrhée qui dure plus de 3 jours.
• Forte constipation qui dure plus de 3 jours.
• Forte ballonnements qui durent plus de 3 jours.
• Forte gaz qui dure plus de 3 jours.
• Forte indigestion qui dure plus de 3 jours.
• Forte brûlures d'estomac qui durent plus de 3 jours.
• Forte reflux acide qui dure plus de 3 jours.
• Forte réactions allergiques qui durent plus de 3 jours ou qui sont plus graves que la première réaction.
• Forte réactions allergiques qui surviennent plus d'une fois.
• Forte réactions allergiques qui sont graves ou menacent la vie.
• Forte réactions allergiques qui causent des difficultés à respirer ou à avaler.
• Forte réactions allergiques qui causent des démangeaisons ou des rougeurs.
• Forte réactions allergiques qui causent des étourdissements ou des vertiges.
• Forte réactions allergiques qui causent des syncopes ou des perte de conscience.
• Forte réactions allergiques qui causent des convulsions.
• Forte réactions allergiques qui causent d'autres conditions médicales graves.



Informations importantes
Indications • Les symptômes graves qui durent plus de 3 jours.
• Fièvre (forte température) qui ne s'améliore pas après 3 jours.
• Éruption cutanée ou boutons qui ne s'améliorent pas après 3 jours.
• Vomitifs ou diarrhées qui durent plus de 3 jours.
• Douleurs d'estomac ou inconfort qui durent plus de 3 jours.
• Vertiges ou étourdissements qui durent plus de 3 jours.
• Forte douleur de tête qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur de gorge qui dure plus de 3 jours.
• Forte toux qui dure plus de 3 jours.
• Forte éternuements qui durent plus de 3 jours.
• Forte rhinite qui dure plus de 3 jours.
• Forte congestion nasale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur sinuiale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur faciale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur oculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur auriculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur de la gorge qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur thoracique qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur abdominale qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur au dos qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur articulaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte douleur musculaire qui dure plus de 3 jours.
• Forte fatigue qui dure plus de 3 jours.
• Forte faiblesse qui dure plus de 3 jours.
• Forte perte d'appétit qui dure plus de 3 jours.
• Forte nausée qui dure plus de 3 jours.
• Forte vomissements qui durent plus de 3 jours.
• Forte diarrhée qui dure plus de 3 jours.
• Forte constipation qui dure plus de 3 jours.
• Forte ballonnements qui durent plus de 3 jours.
• Forte gaz qui dure plus de 3 jours.
• Forte indigestion qui dure plus de 3 jours.
• Forte brûlures d'estomac qui durent plus de 3 jours.
• Forte reflux acide qui dure plus de 3 jours.
• Forte réactions allergiques qui durent plus de 3 jours ou qui sont plus graves que la première réaction.
• Forte réactions allergiques qui surviennent plus d'une fois.
• Forte réactions allergiques qui sont graves ou menacent la vie.
• Forte réactions allergiques qui causent des difficultés à respirer ou à avaler.
• Forte réactions allergiques qui causent des démangeaisons ou des rougeurs.
• Forte réactions allergiques qui causent des étourdissements ou des vertiges.
• Forte réactions allergiques qui causent des syncopes ou des perte de conscience.
• Forte réactions allergiques qui causent des convulsions.
• Forte réactions allergiques qui causent d'autres conditions médicales graves.

127.5M45.131

DES0816M4CA-130



Drug Facts (continued)

Stop use and ask a doctor if you have a fever that lasts more than 3 days, a sore throat that lasts more than 3 days, or if you have a cough that lasts more than 3 weeks. If you have a sore throat, you should see a doctor if you do not see any signs of improvement.

Keep out of reach of children. This package contains enough drug to treat your symptoms for 14 days. Do not use this product for more than 14 days.

Directions: Adults and children 12 years and over: Take 2 tablets every 4 hours, as directed in the contents of 1 packet (10 tablets) for a total of 14 doses. Do not take more than 14 doses. Children under 12: Do not take.

Other Information: Keep out of reach of children. Store at room temperature 15-25°C (59-77°F). See the back of the box for more information.

Active Ingredients: Acetaminophen, Pseudoephedrine HCl, Lorazepam, Diphenhydramine HCl, Guaifenesin.

Questions? Call 1-800-521-4742. www.haleon.ca

Contient Acétaminophène et d'autres ingrédients / Contient l'acétaminophène et d'autres ingrédients

HALEON

NEOCITRAN

EXTRA STRENGTH EXTRA FORT
COLD & SINUS
RHUME ET SINUS

- / Sinus & nasal congestion
- / Sore throat pain & headache
- / Runny nose & sneezing
- / Congestion nasale et sinusale
- / Maux de gorge et maux de tête
- / Écoulement nasal et éternuements

SO YOU CAN REST
POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS REPOSER

10 TABLETS (PACKETS) POUSSETTES / 10 SACHE-SACHÈTES (POUSSETTES)

Lemon / Citron



Informations (français)

Arrêtez l'utilisation de ce médicament si vous avez une fièvre qui dure plus de 3 jours, une toux qui dure plus de 3 semaines, ou si vous avez une gorge qui ne s'améliore pas après 7 jours. Consultez votre médecin si vous avez une toux qui dure plus de 3 semaines.

Conservez ce médicament hors de la portée des enfants. Ce médicament contient du lorazépam, un médicament qui agit sur le système nerveux central.

Un cas de surdité, accompagné avec une perte auditive temporaire, a été rapporté chez un patient prenant ce médicament. Si vous avez une surdité, arrêtez d'utiliser ce médicament et consultez votre médecin.

Ne prenez pas plus de 12 sachets par jour. Ne prenez pas plus de 12 sachets par jour. Ne prenez pas plus de 12 sachets par jour.

Autres renseignements: Gardez le boîtier afin de connaître les ingrédients et les précautions d'emploi.

Composition: Acetaminophen, Pseudoephedrine HCl, Lorazepam, Diphenhydramine HCl, Guaifenesin.

Questions? Appelez le 1-800-521-4742.

www.neocitran.ca

127.5461531

LOT EXP

Informations (anglais)

Stop use and ask a doctor if you have a fever that lasts more than 3 days, a sore throat that lasts more than 3 days, or if you have a cough that lasts more than 3 weeks. If you have a sore throat, you should see a doctor if you do not see any signs of improvement.

Keep out of reach of children. This package contains enough drug to treat your symptoms for 14 days. Do not use this product for more than 14 days.

Directions: Adults and children 12 years and over: Take 2 tablets every 4 hours, as directed in the contents of 1 packet (10 tablets) for a total of 14 doses. Do not take more than 14 doses. Children under 12: Do not take.

Other Information: Keep out of reach of children. Store at room temperature 15-25°C (59-77°F). See the back of the box for more information.

Active Ingredients: Acetaminophen, Pseudoephedrine HCl, Lorazepam, Diphenhydramine HCl, Guaifenesin.

Questions? Call 1-800-521-4742. www.neocitran.ca

127.5461531



0 58478 05103 1

This medicine was developed by the Bayer Group of companies. Les médicaments développés par le Bayer Group of companies. © 2020 Bayer Group of companies or the Bayer Group / Groupe de sociétés Bayer et ses sociétés de Bayer.