

EXP
LOT

Drug Facts	Purposes
Active ingredients (in each pouch of 9.8 g powder) Acetaminophen 1000 mgPain reliever, fever reducer Dextromethorphan hydrobromide 30 mg.....Cough suppressant Pseudoephedrine hydrochloride 60 mg.....Nasal decongestant Chlorpheniramine maleate 4 mg.....Antihistamine	Uses •Temporarily relieves cough, cold and flu symptoms: •fever •minor body aches and pain •sore throat pain •headache •dry cough •nasal and sinus congestion •runny nose •sneezing •itchy, watery eyes
Warnings Liver warning Acetaminophen may cause severe or possibly fatal liver damage if you take •more than the recommended dose in 24 hours •with other drugs containing acetaminophen •while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include •yellow skin or eyes •dark urine •sweating •nausea •vomiting •stomach pain •unusual tiredness •loss of appetite	Info-médicament Utilités Ingrédients actifs (dans chaque sachet contenant 9,8 g de poudre) Acétaminophène à 1000 mgAnalgésique et antipyrétique Bromhydrate de dextrométhorphane à 30 mg.....Antitussif Chlorhydrate de pseudoéphédrine à 60 mg...Décongestionnant nasal Maléate de chlorphéniramine à 4 mg.....Antihistaminique
Allergy alert Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include: •skin reddening •blisters •rash. If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.	Usages •Soulagement temporaire de la toux et des symptômes suivants causés par le rhume et la grippe : •fièvre •douleurs et courbatures légères •maux de gorge •maux de tête •toux sèche •congestion nasale et sinusale •éternuements •écoulement nasal •larmoiement et picotement des yeux.
Do not use •with any other drug containing acetaminophen or any other cough and cold product •if you are allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. •with a monoamine oxidase inhibitor (MAOI) (drugs for depression or Parkinson's disease) or for 2 weeks after stopping the MAOI drug.	Mises en garde Avertissement - foie L'acétaminophène peut causer de graves lésions au foie pouvant entraîner la mort si vous prenez ce médicament : •à une dose supérieure à la dose recommandée sur une période de 24 heures •avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène •avec 3 boissons alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de lésions au foie peuvent comprendre : •jaunissement de la peau ou des yeux •urines foncées •transpiration •nausées •vomissements •douleur à l'estomac •fatigue inhabituelle •perte d'appétit.
When using this product •drowsiness may occur •alcohol, sedatives and tranquilizers may increase drowsiness •do not drive or engage in activities requiring alertness •avoid alcoholic drinks •excitability may occur, especially in children	Alerte aux allergies L'acétaminophène peut provoquer des réactions cutanées graves. Les symptômes peuvent comprendre : •rougeur de la peau •cloques •éruption cutanée. Si l'un ou l'autre de ces symptômes apparaît, cessez de prendre ce produit et obtenez des soins médicaux immédiatement.
	Ne pas utiliser •avec un autre médicament contenant de l'acétaminophène ou tout autre médicament contre la toux et le rhume •si vous êtes allergique à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient de ce produit. Si vous ignorez si un médicament contient ou non de l'acétaminophène, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. •avec des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (MAO) (médicaments employés pour traiter la dépression ou la maladie de Parkinson) ni pendant 2 semaines qui suivent la fin d'un tel traitement.
	Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous •avez •une toux persistante comme celle associée au tabagisme, à l'asthme ou à l'emphysème •une toux accompagnée d'une quantité excessive de mucosités •de la difficulté à respirer ou une autre maladie pulmonaire chronique (ces symptômes pourraient indiquer un problème grave) •une maladie du foie, des reins, du cœur ou de la thyroïde •une pression artérielle élevée ou un autre problème de santé grave •de la difficulté à uriner •des troubles convulsifs •êtes •atteint de diabète ou de glaucome •enceinte ou allaitez •prenez •de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) •des sédatifs ou des tranquillisants •des médicaments pour surveiller votre poids •tout autre médicament ou produit de santé naturel.
	Lorsque vous utilisez ce produit •vous pourriez éprouver de la somnolence •la consommation d'alcool, de sédatifs et de tranquillisants peut accroître la somnolence •abstenez-vous de

Info-médicament (suite)
conduire un véhicule ou d'entreprendre des activités exigeant de la vigilance •évitiez les boissons alcoolisées •il existe un risque d'excitabilité, en particulier chez les enfants Cessez d'utiliser et consultez un médecin si •les douleurs persistent plus de 5 jours •la fièvre dure plus de 3 jours •les maux de gorge durent plus de 2 jours •les symptômes s'aggravent ou persistent plus de 7 jours •vous avez de la fièvre (> 38 °C), une éruption cutanée, un mal de tête qui persiste, un mal de tête sévère, de la confusion ou des changements dans la vision •vous êtes nerveux, étourdi ou incapable de dormir •vous avez de la difficulté ou des douleurs lorsque vous urinez •tout autre nouveau symptôme se manifeste. ● Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. En cas de surdose, communiquer avec un centre antipoison ou obtenir des soins médicaux immédiatement. Il est crucial de consulter rapidement un médecin, même en l'absence de signes ou de symptômes.
Mode d'emploi Adultes et enfants de 12 ans et plus : •Dissoudre le contenu de 1 sachet dans 225 mL (1 tasse) d'eau bouillante. •Prendre toutes les 6 heures, au besoin. •Ne pas prendre plus de 4 sachets en 24 heures. •Enfants de moins de 12 ans : Ne pas utiliser. •Ne pas dépasser la quantité indiquée (voir Avertissement - foie). •N'utiliser que sur l'indication d'un médecin. •Il s'agit d'une unité posologique non standard.
Autres renseignements • Garder la boîte afin de consulter les renseignements importants qui y figurent avant chaque utilisation. • Conserver les sachets inviolables à l'épreuve des enfants à la température ambiante (15-25 °C).
Ingrédients inactifs Acésulfame de potassium, acide citrique, arômes (contient du soya), aspartame (contient de la phénylalanine), citrate de sodium dihydraté, dioxyde de silicium, jaune n° 10 (D&C), maltodextrine, phosphate tricalcique, saccharose.
Questions? Composer le 1-888-788-8181 www.neocitran.ca

Contains Acetaminophen and other ingredients / Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

NEW! NOUVEAU!

DIN 0255549

HALEON

NEOCITRAN

ULTRA STRENGTH COMPLETE COLD
ULTRA FORT RHUME COMPLET



- / Sinus & nasal congestion
- / Runny nose & sneezing
- / Sore throat pain & headache
- / Dry cough
- / Congestion nasale et sinusale
- / Écoulement nasal et éternuements
- / Maux de gorge et maux de tête
- / Toux sèche

SO YOU CAN REST
POUR QUE VOUS PUISSIEZ VOUS REPOSER

10 SINGLE DOSE POUCHES (POWDER) / 10 SACHETS À DOSE UNIQUE (POUDRE)



Lemon / Citron

Drug Facts (continued)
Stop use and ask a doctor if •pain lasts for more than 5 days •fever lasts more than 3 days •sore throat pain lasts more than 2 days •symptoms worsen or last for more than 7 days •you develop a fever (>38°C), rash, headache that won't go away, severe headache, confusion or visual changes •are nervous, dizzy, can't sleep •have difficulty or pain when urinating •any new symptoms appear ● Keep out of each of children. This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a poison control centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.
Directions Adults and children 12 years and over: •Dissolve the contents of 1 pouch into 225 mL (one cup) of boiling water. •May be taken every 6 hours. •Do not take more than 4 pouches in 24 hours. •Children under 12: Do not use. •Do not take more than directed (see liver warnings). •Use only on the advice of a doctor. •This is not a standard dosage unit.
Other information • Keep and consult carton for important information before each use • Store tamper evident, child-resistant pouches at room temperature 15 - 25°C
Inactive ingredients Acésulfame potassium, aspartame (contains phenylalanine), citric acid, D&C Yellow No. 10, flavour (contains soy), maltodextrin, silicon dioxide, sodium citrate dihydrate, sucrose, tricalcium phosphate
Questions? Call 1-888-788-8181 www.neocitran.ca

Haleon Canada ULC/SRI, Mississauga, ON L5R 4B2
 Trademarks are owned by or licensed to the Haleon group of companies. / Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés Haleon.
 ©2025 Haleon group of companies or its licensor. / Groupe de sociétés Haleon ou son concédant de licence.

