



Info-médicament

Ingrédients actifs	Utilité
(dans 1 cuillère à thé [5 mL])	
15 mg de bromhydrate de dextrométhorphan (DM) Antitussif	
200 mg de guaifénésine (extra fort) Expectorant	

Mises en garde
Ne prenez pas avec d'autres médicaments contre la toux et le rhume • pendant la prise d'un inhibiteur de la monoamine oxydase (MAOI), d'un inhibiteur sélectif du recaptage de la sérotonine (SSRI) ou d'autres médicaments contre la toux et le rhume • une psychiatrique, un trouble de l'humeur ou la maladie de Parkinson, ainsi que dans les 2 semaines suivant l'arrêt d'un de ces médicaments • en cas d'allergie à dextrométhorphan ou à l'un des autres ingrédients du produit.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant d'utiliser si vous : • souffrez de toux chronique (comme la toux des fumeurs) • une toux accompagnée d'une production excessive de sécrétions (mucus) • d'une autre maladie pulmonaire chronique • une toux qui ne s'arrête pas • avec de la difficile à respirer; ces signes pourraient indiquer un problème grave • êtes enceinte ou allaitez • avec de la fièvre • avec de la douleur dans le bas de votre ventre • prenez des médicaments pour perdre du poids • souffrez de toute autre maladie grave.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si : • les symptômes durent plus de 7 jours • si vos symptômes s'aggravent ou si vous avez des symptômes supplémentaires • ils sont accompagnés d'une forte fièvre (>38 °C) • de la fièvre, une éruption cutanée, des maux de tête persistants ou d'épisodes expectoratifs (crachats) douloureux ou douloureux.

Garder hors de la portée des enfants. En cas de surdosage, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

Mode d'emploi • Adultes (12 ans et plus) : 2 c. à thé (10 mL) • Prenez toutes les 6 heures • Ne pas prendre plus de 8 doses par jour • Enfants de moins de 12 ans : ne pas utiliser.

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C). Ne pas utiliser si le rabat encollé est brisé.

Ingrédients inactifs Acide citrique, arôme, benzoate de sodium, carbonylméthylcellulose sodique, eau, gomme de guar, glycerol, huile d'olive, huile de propolis, glycérol, rouge n° 40 FD&C, saccharine sodique, sirop de maïs et sorbitol.

Questions? 1-888-275-9938 www.robitussin.ca

Robitussin

EXTRA STRENGTH/EXTRA FORT

**COUGH CONTROL
CONTROLE DE LA TOUX**

Robitussin

EXTRA STRENGTH

**COUGH
CONTROL**



**Alcohol Free
250 mL Syrup**

DIN 02142775

Cherry Flavour



PAA169240

Drug Facts

Active ingredients	Purpose
(in 1 teaspoon or 5 mL)	
Dextromethorphan	
Hydrobromide (DM) 15 mg Cough Suppressant	
Guaifenesin 200 mg (extra strength) Expectorant	

Warnings
Do not use with • other cough and cold drugs • a monoamine oxidase inhibitor (MAOI), a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI), or other drugs for depression, psychosis, or mania • monoamine oxidase inhibitors for 2 weeks after stopping these drugs, if you have an allergy to dextromethorphan or any of the listed ingredients.

Ask a doctor or pharmacist before using if you have: • a heart condition • a seizure disorder with smoking • a cough with excessive mucus • difficulty breathing • other chronic lung disease (e.g., asthma or emphysema) • a history of heartburn or a serious condition • pregnant or breastfeeding • difficulty or pain when urinating • taking medication for weight control • any other serious medical condition.

Stop using and call a doctor if symptoms worsen, last more than 7 days, or are accompanied by a high fever (>38°C) • a fever, rash, persistent headache or thick yellow or green mucus is present.

Keep out of reach of children. In case of overdose, call a Poison Control Centre or doctor right away.

Directions • Adults (12 years & over): 2 tsp. (10 mL)

• Take every 6 hours • Do not exceed maximum 4 doses/day • Children under 12 years: do not use.

Other information Store at room temperature (15°C - 30°C). If glued carton end flap is broken, do not use.

Inactive ingredients Citric acid, corn syrup, FD&C Red No. 40, flavor, glycerin, maltitol, polyethylene glycol, propylene glycol, sodium carbonate, sodium carboxymethylcellulose, sodium saccharin, sorbitol and water.

Questions? 1-888-275-9938 www.robitussin.ca

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ULC,

Mississauga, ON L5R 4B2
Trademarks are owned by or licensed to the GSK group of companies. Les marques sont détenues ou utilisées par la GSK group of companies ou ses licenciés.

©2021 GSK group of Companies or its licensee.

Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.