

6200000077233
0622

Kontraindikasi :

Penderita yang hipersensitif terhadap Paracetamol dan bahan lainnya dalam obat ini. Penderita dengan gangguan fungsi hati.

Peringatan dan Perhatian :

Bila rasa sakit bertahan lebih dari 3 hari, dan demam tidak menurun selama 2 hari, atau bila ada kemerahan pada kulit, segera hubungi dokter. Hati-hati pemberian obat ini pada penderita penyakit ginjal. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Tidak dianjurkan penggunaan secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung paracetamol. Hubungi dokter sebelum menggunakan obat ini bersamaan dengan warfarin atau obat antikoagulan lainnya. Jika anda mengidap infeksi akut, dapat meningkatkan resiko terjadinya metabolik asidosis. Gejala-gejala metabolik asidosis dapat berupa pemapasan yang cepat dan dalam, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Segera hubungi dokter jika anda mengalami salah satu dari gejala tersebut. Segera hubungi dokter jika menggunakan obat melebihi dosis yang dianjurkan.

Efek Samping :

Penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Efek samping yang lain yaitu reaksi hipersensitivitas, seperti: kemerahan atau gatal pada kulit; kulit terkelupas; kadang-kadang gangguan pemapasan (termasuk gangguan pemapasan yang disebabkan oleh aspirin dan NSAID) atau bengkak pada bibir, lidah, tenggorokan, wajah; sariawan; malar; demam; pendarahan. Namun, reaksi efek samping jarang terjadi. Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping.

No. Reg. DBL7624501537A1

SIMPAN DALAM WADAH TERTUTUP RAPAT
DAN DIBAWAH 30°C. JAUHKAN DARI
JANGKAUAN ANAK-ANAK.

Diproduksi oleh:

PT Sterling Products Indonesia, Jakarta, Indonesia

Trade Marks are owned by or licensed to the

Halson group of companies

©2024 Halson group of companies or its licensee.

BPOM RI



Panadol
Anak-anak
Paracetamol

HALSON

Panadol
Anak-anak
Paracetamol



Relief of:
Fever ✓
Pain ✓



ALCOHOL FREE

SYRUP

Raspberry Flavour

netto 60 mL

Panadol
Anak-anak



Komposisi :

Setiap 5mL mengandung Paracetamol 160 mg.

Bentuk sediaan : Larutan jernih berwarna merah

Zat tambahan: Saccharin Sodium, Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sorbitol, Hydrochloric acid, PEG 1450, Propylene Glycol, Glycerin, Allura Red, Raspberry Flv, Water

Cara Kerja Obat :

Sebagai analgesik dan antipiretik.

Indikasi :

Untuk meredakan rasa sakit, seperti: sakit kepala, sakit gigi dan menurunkan demam yang menyertai flu dan demam sesudah vaksinasi.

Panadol Sirup untuk anak di atas 1 tahun.

Dosis :

Umur	Dosis
Di bawah 1 tahun	Gunakan Panadol Anak-anak Drops
1 – 2 tahun	0 – 1 tahun
2 – 3 tahun	3,75 mL
4 – 5 tahun	5 mL
Di atas 5 tahun	7,5 mL
5 tahun	Gunakan Panadol Anak-anak tablet kunyah
5 tahun	2-12 tahun atau suspension 6 tahun ke atas

Panadol Anak-anak Syrup tidak dianjurkan untuk anak dibawah 2 bulan.

Aturan Pakai : 3 - 4 kali sehari. Boleh diberikan langsung atau dicampur dengan air/sari buah. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam dan tidak melebihi 4 kali dalam 24 jam. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan atau menurut aturan dokter.



8 992695 132130

HALSON

Panadol
Anak-anak
Paracetamol



Meredakan:
Demam ✓
Nyeri ✓



TANPA ALKOHO

SYRUP

Rasa Raspberry

netto 60 mL

6200000077233 0622

0.71

0.5

13A

BN
MFD
EXP
HET

PHARMA CODE REF. IS:
2 4 8

DISETUJUI OLEH BPOM : 03/09/2024

ID : EREG1002731240