HET, No. Bets, Tanggal Produksi, dan Batas Kedaluwarsa lihat di blister

Panadol

Komposisi : Setiap kaplet mengandung 500 mg Paracetamol.

Indikasi : Untuk meredakan rasa sakit, seperti sakit kepala, sakit gigi, sakit pada otot, dan menurunkan demam yang menyertai flu/influenza dan demam sesudah vaksinasi.

Kontraindikasi : Penderita yang hipersensitif terhadap Paracetamol dan bahan lain dalam obat ini, penderita dengan gangguan fungsi hati.

Dosis dan Aturan Pakai :
Dewasa & anak-anak ≥12 tahun : 1-2 kaplet, 3-4 kali sehari. Tidak melebihi 8 kaplet dalam 24 jam. Anak-anak 6-11 tahun : ½-1 kaplet, 3-4 kali sehari. Tidak melebihi 4 kaplet dalam 24 jam. Tidak dianjurkan penggunaan pada anak <6 tahun. Minimum interval penggunaan dosis adalah 4 jam. Jangan melebihi dosis yang dianjurkan, atau menurut aturan dokter.

Peringatan dan Perhatian :
- Bila rasa sakit bertahan lebih dari 3 hari, dan demam tidak menurun selama 2 hari atau bila ada kemerahan pada kulit, segera berkonsultasi dengan dokter.
- Hati-hati pemberian obat ini pada penderita penyakit ginjal.
- Penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.
- Penggunaan obat ini pada penderita yang mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati.
- Tidak dianjurkan penggunaan secara bersamaan dengan obat lain yang mengandung Paracetamol.
- Hubungi dokter sebelum menggunakan obat ini bersamaan dengan Warfarin atau obat antikoagulan lainya.
- Jika Anda mengidap infeksi akut, dapat meningkatkan resiko terjadinya metabolik asidosis.

Meredakan sakit kepala, nyeri, dan demam

- Gejala-gejala metabolik asidosis dapat berupa : Pernapasan yang cepat dan dalam, mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Segera hubungi dokter jika Anda mengalami salah satu dari gejala tersebut.
- Segera hubungi dokter jika menggunakan obat melebihi dosis yang dianjurkan.
- Jika Anda hamil, berkonsultasilah ke dokter sebelum Anda mengonsumsi Paracetamol. Pertimbangkan untuk memulai dosis efektif terendah untuk jangka waktu terpendek.

Efek Samping:
Penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Efek samping yang lain yaitu reaksi hipersensitivitas, seperti: kemerahan atau gatal pada kulit; kulit terkelupas; kadang-kadang gangguan pernapasan (termasuk gangguan pernapasan yang disebabkan oleh Aspirin dan NSAID) atau bengkak pada bibir, lidah, tenggorokan, wajah, sariawan, memar-memar, pendarahan. Namun, reaksi efek samping jarang terjadi. Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter jika mengalami efek samping.

No. Reg. DBL9624502804A1.

Pemerian
Kaplet elips berwarna putih dengan garis di satu sisi dan penanda PANADOL di sisi lain. Bebas dari benda asing.

Zat Tambahan
Maize Starch, Starch Pregelatinized, Povidone K-25, Potassium Sorbate, Talc, Stearic Acid, Purified Water.

Diproduksi oleh:
PT Sterling Products Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Trade Marks are owned by or licensed to the Haleon group of companies.
©2024 Haleon group of companies or its licensor.

BPOM RI

8 992695 100207

SIMPAN DALAM WADAH TERTUTUP RAPAT DAN DI BAWAH 30°C. JAUHKAN DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.

62000000210816 0224

Panadol
Paracetamol

Isi 1 blister @ 10 kaplet

LPPOM-00140087580218

HALEON

Meredakan sakit kepala, nyeri, dan demam

62000000210816 0224