

gsk
ポルタレン EX

スプレー
クールタイプ
速攻・爽快

鎮痛力

浸透力

抗炎症

有効成分

シクロフェナクナトリウム
L-メントール



ノズルを下にして
お使いください

第2類医薬品 (税) 控除対象 90g

使用前に次の説明文を必ずお読みください。
経皮鎮痛消炎剤 **第2類医薬品**
ポルタレンEXスプレー

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください。
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人(2)せんそくを起こしたことがある人(3)妊婦又は妊娠していると思われる人(4)15才未満の小児
- 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等(2)皮ふの弱い部位(顔、頭、わきの下等)(3)湿疹、かぶれ、傷口(4)みずむしやあせも又は化膿している患部
- 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しないでください。
- 長期連用しないでください。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人(2)薬などにアレルギー症状を起こしたことがある人(3)次の医薬品の投与を受けている人 ニューキノロン系抗菌剤
- 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカのような皮ふのはがれ)、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。
接触皮ふ炎、光線過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱、ただれ等の激しい皮ふ炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがる場合があります。また、日光があつた部位に症状があらわれ、悪化することがあります。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手指の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

(税) 控除対象 1910T6-46

製造販売元
同仁医薬化工株式会社
東京都中野区弥生町5-2-2

発売元
クラクソ・スミスクライン・
コンシューマーヘルスケア(株)株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

フィルム:PP
キャップ:PP
アルミ:缶

【用法・用量】1日3~4回適量を患部に順射塗布してください。ただし、塗布部位をラップフィルム等の透気性の悪いもので覆わないでください。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しないでください。

<用法・用量に関する注意>

- 定められた用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれなどの原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれなどの症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(3)1週間あたり尿量として50g(8日間で本剤1本)を超えて使用しないでください。(4)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。(5)使用部位に他の外用剤を併用しないでください。(6)顔に向けて順射しないでください。(7)大量・広範囲には使用しないでください。(8)外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、吐き気等の症状を起こすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意して使用してください。(9)使用前によく振とうし、真下に向けて順射してください。(10)患部まで約10cmの距離で順射してください。(11)同じ箇所を連続して3秒以上順射しないでください。(12)透気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしないでください。

【成分】原液100g中 シクロフェナクナトリウム…1g
L-メントール…3g

添加物:アスピリン酸ジソプロピル、乳酸、プロピレングリコール、ポリソルベート80、エタノール、DME、LPG
【保管及び取り扱い上の注意】(1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。(2)火気に近づけないでください。(3)小児の手の届かないところに保管してください。(4)合成樹脂を軟化させたり、塗料を溶かしたり、金属を変色させるおそれがあるもので付着しないよう注意してください。(5)他の容器に入れ替えないでください。(瓶用の原因により品質が変わることがあります。)(6)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

火気と高温に注意

高压ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- 炎や火気の近くで使用しないこと。
- 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- 火の中に入れないこと。
- 使い切って捨てること。

高压ガス:LPG/DME

捨てる時は、火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを抜いてください。

火気厳禁 第一石油類
エタノール 65.0mL

お客様相談室
● ☎0120-099-301
● (受付時間)8:00~17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

©2020 GSKグループ
使用期限、製造番号:缶底に記載

