

오트리빈 에스 비강분무액

일반의약품 | 수입완제품

오트리빈에스비강분무액(옥시메타졸린염산염)

[원료약품 및 그 분량] 1밀리리터 중,
 · 유효성분 : 옥시메타졸린염산염(EP) ······ 0.500mg
 · 첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물액 (50%) ······ 0.200mg
 · 기타 첨가제 : 마크로글리세롤히드록시스테아레이트, 소르비톨, 에데탄산나트륨, 알 멘톨, 염화나트륨, 유칼립투스, 인산수소나트륨십이수화물, 인산이수소나트륨이수화물, 정제수

[성상]

일정량씩 분무되는 용기에 든 무색~흰색의 액체

[효능·효과]

코감기(급성비염(코염)), 알레르기성 비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리무거움

[용법·용량]

만 12세 이상의 청소년 및 성인: 1회 1~2번씩 각 비강(코안)에
 분무, 1일 1~2회의 범위 내에서 양쪽 비강(코안)에 투여
 1일 2회를 초과하여 사용하지 않는다.
 최소 투여 간격은 8 시간이다.

이 약을 처음 사용하는 경우, 펌프를 수차례 눌러주어 약액이
 균일하게 분사되는지 확인한다. 이후 사용시에는 바로 사용할 수
 있다. 일단 사용하면, 보통 치료기간 동안 매일 사용할 수 있는
 상태가 유지된다. 사용 시에 스프레이가 제대로 분사되지 않으면
 위와 같이 다시 분사시킨다. 만약 이미 코 안으로 분사하였으나
 제대로 분사되지 않은 경우, 다시 분사하지 않는다.

[사용방법]

1. 코를 청결히 한다.
2. 두 손가락 사이에 노즐을 잡고 엄지손가락을 아래에 받치고
 병을 위로 세운다.
3. 앞으로 약간 기울여 코 안에 노즐을 넣는다.
4. 코 안에 분사 후 동시에 부드럽게 호흡한다.
5. 사용 후 뚜껑을 닫기 전 노즐을 깨끗이 하고 건조시킨다.

[사용상의주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것
 - 1) 만 7세 미만의 어린이
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이
 있는 사람
 - 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제
 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
 - 4) 뇌경질막이 노출되는 수술이나 나비뼈통과
 뇌하수체절제술을 한 사람
 - 5) 폐쇄각녹내장이 있는 사람
 - 6) 건성 비염(코염) 혹은 위축 비염(코염)이 있는 사람
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사,
 약사와 상의할 것
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염,

- 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고
 있는 사람
- 2) 지금까지 약(비염(코염)용 분무제 포함)에 의해 알레르기
 증상(예: 발열, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기),
 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 고혈압, 심장혈관계 질환, 갑상선과다증, 당뇨병,
 크롬친화세포증, 전립선(전립샘)비대증 환자
 - 4) 불면증, 어지럼증, 떨림, 심장부정맥 또는 혈압상승과 같이
 아드레날린 작용물질에 대한 강한 반응을 보이는
 환자에게는 다른 교감신경작용제와 마찬가지로 주의하여
 사용할 것
 - 5) 가역적 후두부 뇌병증 증후군(PRES)/가역적 뇌 혈관수축
 증후군(RCVS)이 교감신경흥분제 약물에서 드물게
 보고되었다. 급작스런 심한 두통, 구역, 구토 및 시각장애가
 보고된 바 있으며, 대부분의 경우 적절한 치료 후 며칠 내에
 개선되거나 해결된다. PRES/RCVS의 징후/증상이 나타나면
 옥시메타졸린 사용을 즉시 중단하고 의학적 조언을 구해야
 한다.
 - 6) 다른 국소용 혈관수축제와 마찬가지로 이 약은 7일 이상
 연속하여 사용하지 말 것: 지속적 혹은 초과 사용은
 반동출혈, 비강(코안)점막 위축 및 빠른 내성을 일으킬 수
 있다.
 - 7) 의학적 조언이 있는 경우를 제외하고 만 7세에서
 만 11세까지의 어린이에게 이 약의 사용을 권장하지 않는다.
 - 8) 삼한계 및 사한계 항 우울제와 병용투여 하는 경우
 혈압상승을 유발할 수 있음.
 - 9) 임부: 생식독성에 대한 동물실험은 불충분함. 이 약의
 잠재적 전신 혈관수축 작용을 고려하여, 임신 중 사용은
 권장하지 않음
 - 10) 수유부: 옥시메타졸린이 모유로 분비되는지 알려진 바
 없으므로, 이 약은 의사, 약사, 치과의사의 지시·감독 하에
 사용해야 한다.
 - 11) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 12) 다음과 같은 기침이 있는 사람
 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는
 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·
 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사,
 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를
 소지할 것.
- 1) 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 자극감, 가려움
 - 2) 3일간 사용하더라도 증상이 좋아지지 않을 경우
 - 3) 아래에 이상반응 목록은 기관계 분류와 빈도를 기준으로 한다.
 빈도: 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게 (≥ 1/100, < 1/10),
 흔하지 않게(≥ 1/1,000, < 1/100), 드물게(≥ 1/10,000,
 < 1/1,000), 매우 드물게(< 1/10,000), 빈도 불명(이용 가능
 자료에서 평가 불가)
 가. 면역계 장애
 드물게: 두통, 불면증, 진정, 불안, 과민증
 매우 드물게: 안절부절, 졸림
 나. 심장계 장애
 드물게: 고혈압, 불규칙한 심박수, 심박수 증가



다. 호흡기, 동맥 및 종격(세로칸) 장애
 흔하게: 비강(코안)건조, 비강(코안)의 불편함, 재채기
 흔하지 않게: 입 안 건조, 입안염, 마른 목구멍, 목구멍 자극
 라. 위장 장애
 드물게: 구역
 마. 전신장애 및 적용부위 상태
 매우 드물게: 피로

4. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
- 3) 이 약은 비염(코염)용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
- 4) 오염을 방지하기 위해 가능한 한 공동으로 사용하지 말 것.
- 5) 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
- 6) 효과를 보기 위한 최소 용량을 최단의 치료기간 동안 사용해야 한다.
- 7) 사용 시에는 음주하지 말 것.
- 8) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 사용할 것.
- 9) 이 약은 운전이나 기계 사용 능력에 영향을 미치지 않는다.
- 10) 중등도에서 심한 정도의 과량투여 시, 산동(동공확대), 청색증, 발열, 연속(수축과 이완), 빈맥(빠른맥), 부정맥, 심장정지, 고혈압, 폐부종, 호흡곤란, 정신장애 같은 증상이 유발될 수 있다. 또한, 기면, 체온저하, 서맥(느린맥), 저혈압과 같은 쇼크, 무호흡 및 의식 상실과 같은 중추신경계 기능의 억제도 나타날 수 있다.
- 11) 과량투여시의 처치: 펜톨아민(Phentolamine)과 같은 비선택성 알파-아드레날린 억제제는 높아진 혈압을 조절하는데 도움을 줄 수 있다. 추가적인 관리는 임상적 증상에 따르며, 혈압강하제는 사용하지 말아야 한다.
- 12) 이 약은 벤잘코늄염화물을 함유하고 있어 기관지 경련을 일으킬 수 있으며, 특히 장기간 사용 시 비강 내 자극이나 충창(부기), 비강 점막의 부종을 유발할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 뒤틀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 10 밀리리터/병

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[제조사] Haleon CH SARL

Route de l'Etraz, 1260 Nyon, 스위스

[수입자] 헤일리온코리아주식회사


서울특별시 용산구 한강대로 92 (한강로2가)

고객센터(수신자 요금부담) : 080-530-4100

다음과 같이 사용하십시오.

맨 처음 사용 전 그림1과 같이 액이 제대로 분무될 때까지 수차례 누릅니다. 그림2와 같이 노즐을 비강(코안) 내에 삽입 후 위 아래로 누릅니다. 다른 쪽도 그림2와 같이 반복한 후 뚜껑을 닫아 보관합니다.

제대로 작동하지 않거나 7일 이상 제품을 사용하지 않은 경우, 위와 같이 제대로 분무될 때까지 수차례 분무 후 사용합니다.



Do not cut

※ 개정연월일: 2024년 4월 1일

- * 이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 참조
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품을 구입한 경우에는 약국, 도매상, 병의원을 통하여 즉시 교환하여 드립니다.
- * 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- * 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- * 제품을 사용하기 전 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관합니다.
- * 본사 제품 사용 중 문의사항이나 이상사례(부작용)가 있을 경우 당사 고객센터 (Tel. 080-530-4100) 또는 mystory.kr@haleon.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
- * 부작용 보고 및 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

Trade Marks owned or licensed by Haleon.

©2023 Haleon or licensor.