

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Sperti Preparation H, aambeienzepillen voor rectaal gebruik

Per zetpil: 23 mg levende gist extract en 69 mg haaienlevertraan

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.

Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Sperti Preparation H, aambeienzepillen, zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

In deze bijsluiter:

1. Wat zijn Sperti Preparation H, aambeienzepillen en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT ZIJN SPERTI PREPARATION H, AAMBEIENZETPILLEN EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud

Sperti Preparation H, aambeienzepillen zijn zetpillen die rectaal (in de anus) worden ingebracht en zijn in een kunststof PVC/PE strip verpakt in doosjes met 12 of 24 zetpillen.

Geneesmiddelen groep

Sperti Preparation H, aambeienzepillen behoren tot de aambeienpreparaten.

Therapeutische indicaties

Te gebruiken bij behandeling van klachten ten gevolge van aambeien, zoals jeuk, vochtafscheiding, bloedinkjes, pijn, of een combinatie van deze verschijnselen.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Kinderen

Er is geen of zeer beperkte informatie over de behandeling van aambeien bij kinderen, het gebruik is derhalve niet aanbevolen bij kinderen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn tot op heden géén meldingen geweest van wisselwerking met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding

Sperti Preparation H, aambeienzepillen kunnen - voor zover bekend - zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend hebben Sperti Preparation H, aambeienzepillen géén invloed op de rijvaardigheid of het vermogen machines te gebruiken.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zopals uw arts, of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Breng bij klachten 's-morgens en 's-avonds en na elke stoelgang één zepil in de anus. Reinig de anale opening na elke stoelgang eerst met zacht toiletpapier en dan met een washandje en lauw water. Droog daarna voorzichtig of, beter nog, dep voorzichtig droog met een zachte handdoek.

Duur van de behandeling

U mag het product niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen. Raadpleeg bovendien uw arts, indien de klachten aanhouden of terugkeren, en bij pijnlijke en bloedende aambeien.

In geval u bemerkt dat Sperti Preparation H, aambeienzepillen te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel Sperti Preparation H, aambeienzepillen heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact opnemen met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Aandoeningen van huid of onderhuid

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) kunnen overgevoeligheidsreacties ontstaan, die na staken van de behandeling weer verdwijnen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook

rechstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Niet bewaren boven 25 °C. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter 'Niet te gebruiken na' of op de zetpilstrip achter 'exp'.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Sperti Preparation H, aambeienzetpillen

- De werkzame stoffen in dit middel zijn:
Per zetpil: 23 mg levende gist extract en 69 mg haaienlevertraan
- De andere hulpstoffen in dit middel zijn:
Glycerol (E 422), Lunacera M, cacao boter, witepsol W35 en polyethyleenglycol 600 dilauraat

Hoe zien Sperti Preparation H, aambeienzetpillen er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zetpillen verpakt in een kunststof PVC/PE strip in doosjes met 12 of 24 zetpillen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder

Haleon Netherlands B.V., Van Asch van Wijckstraat 55G, 3811 LP Amersfoort, Nederland

Fabrikant

Haupt Pharma Livron
Rue Compté de Sinard, 26250 Livron sur drome
Frankrijk

Doppel Farmaceutici S.r.l.
Via Martiri Delle Foibe 1
29016 – Cortemaggiore (PC)
Italië

Dit middel is in het register ingeschreven onder RVG 02883

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in Feb 2023

Algemene voorzorgsmaatregelen bij aambeien en het gebruik van Sperti Preparation H, aambeienzetpillen:

- Aambeien zijn uitgezette bloedvaatjes, die soms zichtbaar zijn als knobbels rond de anusopening (uitwendige aambeien). Soms zitten ze binnen de anus en zijn ze onzichtbaar (inwendige aambeien). Vaak zijn aambeien het gevolg van overmatige druk op de bloedvaatjes rond de anus, bv. bij moeilijke stoelgang of zwangerschap.

- Probeer de stoelgang te bevorderen, door voedingsmiddelen zoals rogge- of volkorenbrood, zilvervliesrijst, verse groente en fruit (pruimen) te eten, en door voldoende aan lichaamsbeweging te doen.
- Wacht niet te lang en neem alle tijd om naar het toilet te gaan.
- Zorg voor goede hygiëne, zoals het zorgvuldig wassen van de anusstreek.
- Verwijder irriterend materiaal. Dit kan helpen de symptomen van aambeien te verlichten.