



Indicação:

Antiácido. **Composição:** carbonato de cálcio 750 mg. **Posologia:** 2 a 4 comprimidos ao dia. **Advertência:** Uso adulto. **Contraindicação:** Deve ser usado com cautela por pessoas com pedras nos rins, mulheres grávidas ou que estão amamentando. Não deve ser usado por portadores de hipercalcemia (alta concentração de cálcio no sangue). **Reações adversas:** alteração no paladar, efeito rebote ácido (piora dos sintomas), devido à estimulação da gastrina. No uso prolongado (acima de 2 semanas) exige acompanhamento médico. **Interação medicamentosa:** Interfere na absorção de medicamentos, por esse motivo, deve ser administrado 2 horas antes ou depois do uso de outros medicamentos. **Atenção:** Contém os corantes amarelo de TARTRAZINA, amarelo crepúsculo, vermelho allura 129, azul brilhante 133 que podem, eventualmente, causar reações alérgicas. Este produto contém amarelo de TARTRAZINA, que pode causar reações alérgicas, como a asma, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. **Atenção:** Contém 1 g de sacarose/comprimido mastigável. Deve ser usado com cautela por portadores de Diabetes. MEDICAMENTO NOTIFICADO. SAC 0800 021 1529

7



**Armazenar em
temperatura
ambiente (de
15°C a 30°C).**

Lote: Fab:
Vet:

00210142